

經效產寶

056307

60J
5042



咎殷著

經
效
產
寶

光緒十四年重校刊

經 效 產 寶

書號: 1744

開本: 787×1092/18

印張: 2 $\frac{2}{3}$

管 殷 著

人 民 衛 生 出 版 社 影 印

(北京書刊出版業營業許可證出字第〇四六號)

·北京崇文區縱子胡同三十六號·

北京市印刷四廠印刷·新華書店發行

1955年6月第1版—第1次印刷

印數: 1—7,000 (北京版) 定價: 0.45 元

出版者的話

我國固有醫學文獻極為豐富，它是祖國寶貴文化遺產的一個重要組成部分，是我們祖先以卓越的智慧將歷代積累的經驗總結出來的成果，直到現在它還有很大的實用價值。我們必須繼承和發揚這份文化遺產，認真學習和研究它的學理和實踐經驗，用科學方法加以整理總結，以提高它的學術水平，不僅有助於我國人民保健醫療事業的發展，並且能豐富現代世界醫學的內容。

爲了配合學習和研究祖國醫學的需要，本社特選印一部分古典醫學原著，其內容均係依據古本原樣未加改動。由於著者在寫作當時受歷史條件的限制，缺乏系統的科學論證，而且由於長期的封建社會和近百年來封建半殖民地社會的束縛，因而也就限制了它的發展和提高。這類文獻如能全面加以整理，使之成爲更好的科學讀物，當然是最理想的。但這些工作還不是短時期內所能做到的。因此希望讀者以正確對待文化遺產的態度，來學習和研究祖國醫學，吸取其合理部分，去掉其不合理部分，並加以繼續改進和提高，則我們祖國這一寶貴的文化遺產定可發揚光大，定可更有效地爲人民服務。

經效產寶目錄

卷之上

妊娠安胎方論第一 凡拾壹道

妊娠食諸物忌方論第二 凡五道

益氣滑胎令易產方論第三 凡壹道

妊娠惡蕕嘔吐不食方論第四 凡四道

胎動不安方論第五 凡十八道

妊娠漏胞下血方論第六 凡六道

妊娠心腹腰痛方論第七 凡十一道

妊娠傷寒熱病防損胎方論第八 凡五道

妊娠患淋小便不和方論第九 凡二道

妊娠下痢黃水赤白方論第十 凡七道

治妊娠水氣身腫腹脹方論第十一 凡四道

妊娠千金易產方論第十二 凡六道

治產難諸疾方論第十三 凡十二道

難產死生方論第十四 凡八道

難產令易產方論第十五 凡七道

胎死胞衣不出方論第十六 凡十八道

卷之中

產後心驚中風方論第十七 凡七道

產後餘血奔心煩悶方論第十八 凡十五道

產後渴不止方論第十九 凡二道

產後淋病諸方論第二十 凡六道

產後虛羸下痢方論第二十一 凡三道

產後腰痛羸瘦補益玉門不開方論第二十二 凡七道

產後中風方論第二十三 凡十五道

產後餘血上搶心痛方論第二十四 凡六道

產後汗不止方論第二十五 凡五道

產後冷熱痢方論第二十六 凡二道

產後虛羸方論第二十七 凡三道

產後煩渴方論第二十八 凡二道

產後煩悶虛熱方論第二十九 凡六道

產後血瘕方論第三十 凡四道

產後餘疾痢膿血方論第三十一 凡八道

產後小便赤方論第三十二 凡二道

卷之下

產後小便遺血方論第三十三 凡四道

產後大小便不通方論第三十四 凡四道

產後寒熱方論第三十五 凡四道

產後咳嗽方論第三十六 凡三道

產後氣痢方論第三十七 凡六道

產後血暈悶絕方論第三十八 凡十道

產後乳無汁方論第三十九 凡五道

產後乳結癰方論第四十 凡九道

產後乳汁自出方論第四十一 凡三道

續編

周頊傳授濟急方論 凡四道

濮陽李師聖施郭稽中論 十九證方十四道

產後十八論方 凡六道

經效產寶卷之上

節度隨軍叅議撰集

相國白帑家藏善本

○妊娠安胎方論第一凡拾壹道

療妊娠三四月腹痛時時下血

續斷捌分艾葉陸分炒當歸陸分

竹茹肆分于地黃陸分阿膠肆分炙

雞蘇肆分

右以水壹升煎取陸合去滓空心再服隔日

更服

治妊娠六七月忽胎動下血腸痛不可忍

芎藭捌分桑寄生肆分當歸拾貳分

右以水壹升半煎取捌合下清酒半升同煎

取玖合分作叁服如人行五六里再溫服

治妊娠下血時時漏血血盡子死

生地黃合汁叁清酒叁合

右相和煎三四沸空腹分溫溫服

治妊娠心頭妨滿兩脇脹不下食

檳榔叁分人參肆分柴胡伍分

枳殼肆分炙肉豆蔻貳分生薑貳分

桑寄生肆分

右以水貳升煎取陸合分溫參服

治妊娠身傷寒頭痛壯熱肢節煩痛

前胡陸分石膏拾貳分大青肆分

子苓伍分知母肆分山梔肆分

葱白柒莖甜竹如叁分

右水貳升煎取捌合食後分溫三服

治妊娠胎動腰痛及下血安胎

當歸肆分芎藭肆分葱白貳七莖

艾葉貳分茅根陸分鹿角膠陸分炙

右水貳升煎取捌合空心熱喫三服

治妊娠損動安胎

鯉魚壹斤粳米壹升

右作臠食之佳

治妊娠嘔吐不食兼吐痰水

生芦根拾分橘皮肆分生薑陸分

檳榔貳分

右以水貳升煎取柒合空腹熱服

治妊娠脇滿腹脹心胃煩見飢即吐漸加羸瘦

赤茯苓叁分前胡各肆分小半夏湯肆分

生薑叁分白朮壹分大腹子伍分

麥門冬陸分檳榔伍枚紫蘇肆分

右水貳升煎取捌合空心分溫參服

治妊娠常苦煩悶此是子煩宜服此方

伏苓 捌分 防風 陸分 知母 陸分

竹瀝 溫合 生門冬 拾貳分

右水貳升。煎取柒合。下竹瀝。食後作兩服。

治妊娠胎動不安煩悶。

當歸 肆分 芎藭 叁分 阿膠 貳分 時入

葱白 拾肆莖 豉 捌合 桑寄生 肆分

右水貳升。煎取捌合。下阿膠。空腹分兩服。

○妊娠食諸物忌方論第二 凡五道

食雞肉與糯米共食。令子生白蟲。

食鯉魚及鷄子。令子多疳。

食羊肝。令子多厄。

食鴨子。令子倒生。

食鬼肉犬肉。令子缺唇。無音聲。

○益氣滑胎令易產方論第三 凡壹道

潤胎益氣。令子易生。訶子丸。

檳榔 捌分 芫薺 貳分 吳茱萸 叁分

訶子皮 叁分 蒸

右為細末。煉蜜為丸。如綠豆大。空心酒下十

九九。二十九。自七八個月服至分解。

○妊娠惡菹嘔吐不食方論第四 凡四道

論曰。夫菹病之候。心中潰潰。頭眩眼眩。四肢沉

重。懈怠。惡聞食氣。好喫酸鹹果實。多卧少起。三

月四月多嘔逆。肢節不得自舉者。以此治之。

人參 捌分 厚朴 陸分 炙 茯苓 拾叁分

葛根 捌分 白朮 拾貳分 橘皮 陸分

生薑 拾壹分 切

右水柒升。煮貳合。分溫叁服。忌桃李醋等物。

治妊娠三四月嘔吐。惡聞食氣。

橘皮 青竹如 生薑

伏苓 白朮 各貳兩

右水陸升。煎貳升。分溫叁服。忌同前。

治妊娠菹病。心中潰悶。見食嘔吐。憎聞食氣。肢

節煩疼。身躰沉重。多卧嗜睡。黃瘦方。

人參 橘皮 各捌分 茯苓 拾貳分

生薑 拾貳分 甘草 拾貳分 大棗 拾貳枚

生麥門冬子 貳拾分

右水伍升。煎取貳升。分溫叁服。忌菸菜醋等。

凡妊娠惡食者。以所思食。任意食之。必愈。

○胎動不安方論第五 凡十八道

論曰。安胎有二法。因母病以動胎。但療母疾。其

胎自安。又緣胎有不堅。故致動以病母。但療胎

則母差。其理甚效。不可違也。胎不動。不知子死

生者。但看母唇口青者。兒死。母活。口中青沫出

者。子母俱死。口舌赤青沫者。母死子活也。

療胎數落而不結實。或冷或熱。

甘草參兩 黃耆 人參

白朮 芎藭 乾地黄

吳茱萸各貳兩

右為末。空腹酒調貳錢。忌菰菜醋等物。

治胎動不安。

好銀煮取水

右着葱白作羹。食之佳。

治胎動下血。心腹絞痛。兒在腹死活未分。服此藥。死即下。活即安。極妙。

當歸參兩 芎藭陸兩

右水四升。酒參升。煮取參升。為三服。

治妊娠三二月。及七八月。胎動不安。或腰肚痛。有血下。

芎藭 當歸各肆兩 艾葉貳兩

甘草壹兩

阿膠貳兩 艾葉貳兩

右水五升。煮取二升。分溫三服。古方无艾葉。

治妊娠搶心。下血不止。腰腹痛不可忍。

上銀壹斤 水壹斗 煎取米升 芎藭肆兩

當歸肆兩 阿膠參兩 生地黄伍兩

右以前銀水。煮取二升。分三服。

治妊娠无故。胎動不安。腹內絞痛。

葱白切壹升 阿膠叁兩 當歸四兩

川芎四兩 桑寄生

右取銀水柒升。煮藥取貳升半。分三服。

治妊娠五六月。胎猶不安。不常處。

白朮叁兩 厚朴貳兩 旋復花壹兩

黃芩貳兩 伏苓叁兩 生薑貳兩

枳殼貳兩 芍藥貳兩 炙令黃色

右以水柒升。煮取貳升半。食後。分溫五服。

治胎動不安。

熟艾貳兩 葱白切壹升 阿膠貳兩

右水肆升。煮取壹升半。分溫兩服。

又方

芎藭貳兩 葱白切壹升

右水柒升。煮取貳升半。分溫三服。

治妊娠冷熱。腹內不調。致胎不安。

當歸叁兩 乾姜叁兩 芎藭肆兩

艾葉貳兩

右水肆升。煎取貳升。分為四服。

治妊娠經八九个月。或胎動不安。因用力勞乏。

心腹痛。面目青。冷汗出。氣息欲絕。由勞動驚胎之所致也。

釣藤貳兩 伏神 人參各貳兩

當歸 貳兩

桔梗 叁兩

寄生 壹兩

右水伍升。煎取貳升。分爲三服。忌猪肉菘菜。若煩熱加石膏伍兩。臨月加桂心貳兩。

治妊娠因夫所動困絕。

右取竹瀝飲壹升。立愈。

療妊娠被驚惱。胎向下不安。小腹疼痛連腰下血。

當歸

芍藥 各捌分

阿膠 陸分

人參 陸分

艾葉 肆分

大棗 拾貳枚

茯苓 拾分

右水肆升。煮取貳升。分爲三服。

治墮胎忽倒地。舉動擎促。損腹中不安。及子死腹中不出。

腹中不出。

芍藥 壹兩

右爲末。服寸匕。須臾三服。立出。

治胎動衝心。煩悶欲死。安胎止痛。

甘草 炙

當歸

芍藥

人參

阿膠 各貳兩

葱白 切壹升

右以水柒升。煎取貳升。分爲三服。

療妊娠忽黃汁下如膠。或如小豆汁。

粳米 伍升

黃耆 伍兩

右以水柒升。煎取貳升。分爲四服。

治妊娠胎動欲落。肚痛不可忍。

上銀 壹斤

茅根 去黑皮切貳升

右以水九升。煮銀取貳升。入清酒壹升。同煎茅根取貳升。分爲三服。立安。

療妊娠腹內冷痛。忽胎動。

薤白 切壹升 當歸 四兩

右以水五升。煎取貳升。作三服。

○妊娠漏胞下血。方論第六

療漏胎下血不止。胞干即死。宜急治之。

生地黃汁 壹升

酒 伍合

右同煎三五沸。分三服。頻喫。差。

治妊娠下血不止。血盡子死。

生于地黃 爲細末

右酒服方寸匕。日三服。夜一服。即愈。

治妊娠下血不止。及腹內冷者。

生地黃 干姜

右兩味等分。同煎服。

治妊娠無故卒下血出不絕。

阿膠 叁兩 炙

右清酒壹升半。煎取壹升。頓服。

又方

生地黃 捌兩

右搗碎。以酒浸。絞去滓。分兩服。以止爲度。

療妊娠下血如月信來。若胞干則損子傷母。

干地黄 伍兩 干姜 伍兩

右以水六升。煎取二升。下蜜少許。更煎兩沸。分二服。

人○妊娠心腹腰痛方論第七凡十一道

治妊娠二三月。腹痛腰痛。

當歸 叁兩 阿膠 炙 甘草 各貳兩

葱白 切壹升

右水柒升。煮取二升。分三服。忌猪肉松菜醋等物。

治妊娠三五月已來。忽心腹絞痛。

大棗 拾肆枚燒令焦

右取小便調服之。

治妊娠心腹痛。不可忍。

鹽 壹斤燒令赤

右以兩拍取一撮酒調服之。

治妊娠遍身痛。或衝心欲死。不能飲食。

白朮 伍兩 黃芩 貳兩 芍藥 肆兩炙

右以水六升。煮取二升半。為三服。緣胎有水。

致痛兼易產。

治妊娠卒心痛。氣欲絕。

芎藭 當歸 茯苓 各叁兩

厚朴 叁兩炙

右水陸升。煎取貳升。分為兩服。忌食如前。

治妊娠腰背痛。反覆不得。

鹿角 壹枚長五六寸燒令赤酒中碎之令又燒之更碎以角碎為度

右取酒飲之作散服。鹿角亦得。

療妊娠先患冷氣。忽衝心腹痛如刀刺。

芎藭 人參 茯苓

吳茱萸 桔梗 當歸 各叁兩

厚朴 炙 芍藥 炙各貳兩

右水玖升。煎取叁升。分三服。氣下即瘥。

治妊娠患腹痛。并胎動不安。

葱白 切壹升 人參 厚朴 炙

阿膠 炙 芎藭 各貳兩 當歸 叁兩

右水柒升。煎取叁升。分作三服。

治妊娠疼痛。不可忍。或連胯痛。先服此散。

杜仲 肆兩 五加皮 阿膠 炙

狗脊 防風 川芎

細辛 芍藥 各叁兩 萆薢 叁兩

杏仁 捌拾枚去尖

右水玖升。煮取貳升。去滓。下膠。作三服。

治妊娠三兩月。腰痛不可忍者。先服前散。

續斷 杜仲 各拾分 芎藭 叁兩

獨活參兩

狗脊

五加皮

草薢

芍藥

薯藥

呵子已上各捌兩

右為末。蜜和為丸。吾同子大。空心酒下四十丸。日再服。

治觸動胎。以致腰痛背痛。

杜仲

五加皮

當歸

芍藥

芍藥

人參

革薢各參兩

右以水柒升。煎取貳升半。分溫三服。

△○姙娠傷寒熱病。防損胎方論第八。凡五道

論曰。非即之氣。傷折姙婦。熱毒之氣。侵損胞胎。遂有墮胎漏血。俱害子母之命。

治姙娠傷寒。骨節疼痛。壯熱不急治。則胎落。

葱白切壹升

前胡

葛根

石膏各拾分

青黛陸分

升麻捌分

梔子仁拾貳分

右以水柒升。煮取貳升半。分三服。

治姙娠頭痛壯熱。嘔吐不下。食心煩熱。

青竹如

葛根

知母各參兩

芦根壹升

生麥門冬肆兩去心

右水柒升。煎取參升。分三服。

治姙娠時氣。頭痛腰背強壯熱。

升麻

黛青

前胡

黃芩

山梔各貳兩

葛根參兩

石膏捌分

右水五升。煎取參升半。分為三服。

治姙娠婦六七月。傷寒熱入腹。大小便秘結不通。蒸熱。

前胡拾分

大黃

石膏各貳拾分

梔子仁拾枚

知母

黃芩

伏苓

生薑各捌分

右水捌升。煎取貳升半。後下大黃。更煎三五沸。分作三服。

治姙娠傷寒。苦熱不止。身上斑出。忽赤忽黑。小便如赤血。氣欲絕。胎欲落。

梔子仁

升麻各肆兩

黛青貳兩

石膏捌兩

葱白切壹升

生地黃貳拾分

黃芩參兩

右水玖升。煎取參升。作三服。忌熱物。

△○姙娠患淋。小便不和。方論第九。凡二道

治姙娠患淋。小便澀不利。小腹水道熱痛。

冬葵子壹升

芍藥貳兩

黃芩

伏苓

車錢子略三

右以水柒升煎取貳升分溫三服。

○姙娠下痢黃水赤白方論第十凡七道

論曰姙娠下痢皆因誤食生冷肥膩冷即色白熱即黃赤氣不和赤白相兼境刺疼痛脾胃不調之所致也。

治姙娠患痢膿血狀如魚髓小腹絞痛難忍。

薤白切壹升 地榆 醋榴皮

黃蓮各參兩 阿膠貳兩炙

右水柒升煎取貳升半分三服忌生冷肥膩

治姙娠痢白膿腹內冷。

乾姜肆兩 赤石脂陸兩 粳米壹升炒令黃色

右水柒升煎取貳升分三服忌如前。

療姙娠腹痛下痢不止。

黃連 石榴皮 當歸各參兩

阿膠貳兩炙 艾壹兩半

右水陸升煎至貳升分爲三服忌如前。

療姙娠下痢腹內痛膿血不止。

黃連捌分 厚朴炙 阿膠炙

當歸各陸分 艾葉 黃蘗各肆分

干姜伍分

右爲末空心米飲調下壹匙日進三服。

療姙娠膝下刺痛大便白晝夜三五十行。

根黃厚者塗蜜炙令焦 大蒜炮令爛熟

右大蒜去皮研如膏和根黃末爲丸如梧桐子大空心粥飲下三十丸日進三服妙。

療姙娠痢黃水不絕。

厚朴參兩炙 黃連貳兩 豆蔻五枚連皮

右水貳升煮取壹升頻服忌如前。

治姙娠忽被驚奔走墮胎下血不止兼痛。

乾地黃肆兩 當歸 艾葉各貳兩

阿膠炙 芎各參兩

右水柒升煮取貳升半分作三服痛加杜仲五加皮各參兩。

○治姙娠水氣身腫腹脹方論第十一凡四道

論曰臟氣本弱因產重虛土不尅水血散入四肢遂致腹脹手足面目皆浮腫小便祕澀。

治姙娠身腫有水氣心腹脹滿小便少。

茯苓肆兩 杏仁去尖 檳榔仁參兩

旋復花 郁李仁各壹兩

右水陸升煮取貳升分溫溫服小便通即差。

治姙娠四肢皮肉拘急及腫。

桑白皮切貳升 樟桂根壹兩 赤小豆貳升

右水壹斗貳升煮二味取柒升下小豆煮令熟先食豆候渴即飲其汁小便利即差。

治妊娠遍身洪腫方。

亭薤子 拾分 白朮 貳拾分 伏苓 貳兩

桑白皮 貳兩 郁李仁 捌分

右水陸升煎取貳升作兩服小便利即差。

又方

澤瀉 叁兩 亭薤子 叁兩 白朮 陸兩

枳殼 貳 伏苓 各陸兩

右制度服食如前。

○妊娠千金易產方論第十二 凡六道

論曰。夫婦人特將產至重者胞衣也。凡胞衣不出者。世謂之息胞。由產時用力過度已產而躰已瘦頓不能更用氣。經停之間而外冷氣乘之。則血溢逆否。故令胞衣不出。則不得斷臍浴沐。冷氣傷兒則成病也。

舊方。胞衣不損兒者。依法截臍。而以物繫其帶一頭。所有產時看生人。不用意謹護而率挽胞系。斷其胞。上掩心而天命也。凡欲產時。必先脫常所着衣裳以籠竈神驗。胞衣不出方。

竈下土 壹大寸研碎

右用好醋調令相和。內於臍中。續取生甘草湯三四合服。

又方

槐子 拾四枚 蒲黃 壹合

右酒煎溫服。須臾未效。更進一服。

又方

生地黃汁 伍合 生姜汁 半大合

右煎三四沸頓服之。

又方

槐子 槐枝切壹升最好 蘆麥 捌分

牛膝 捌分 通草 拾貳分 白榆 切壹大升

冬麻仁 壹大升研

右水伍升煎貳大升。去滓。下麻仁。分三服。

小品顏服散。令易產。母疾病。未生一月已前。

服過三十日。行步不覺兒生。

甘草 捌分 粳米 壹合 大豆黃沙

黃芩 乾姜 桂心

吳茱萸 冬麻仁 研如泥各貳分

右為末。空腹。煖酒服方寸匕。忌生冷肥膩。

又易產方。

飛生鳥 壹隻燒 槐子 拾四枚 故箭羽 拾四片

右為末。蜜為丸。○梧子大。覺痛服三十九。未產須臾再服之。

○治產難諸疾方論第十三 凡十二道

易產方。

榆白皮拾四分通草拾貳分葵子叁合

滑石各捌分 蘘麥各捌分

右水貳升煎取捌合分溫三服。

又方

羚羊角壹枚燒刮取末

右以酒調方寸匕服。

又方

滑石捌分葵子壹合榆皮拾貳分

牛膝陸分

右水壹升捌合煎取陸合再服。

又方

含醋嚥面悶即嚥之。

又方

吞槐子柒枚即下。

又方

吞鷄子白兩枚即產。

又方

兩手各把一石燕立產。

又方

兔皮和毛燒灰研

右以酒調兩錢匕即產衣不下服之即下。

又方

大麻根叁叁

右水壹升煎取半升頓服立產衣不下服之即下。

又方

弓弩絃燒灰

右為末酒調方寸匕服之即下。

又方

銅弩牙

右燒赤投於醋三合內良久頓服立產。

又方

麝香壹錢

右研水調服之立產。

〇難產死生方論第十四 凡八道

療胎死腹中不出母氣欲絕。

水銀貳兩

右頓吞之兒立出。

治產橫倒不出。

右令夫唾口中二七遍立出。

療產經數日不出或子死腹。

蘘麥陸兩

通草叁兩

桂心叁兩

榆白皮切壹升

右水玖升。煎取三升。分三服。
又方

麴麥

右水煮取濃汁服之佳。

療子死腹中不出。

伏龍肝為末冬錢

右酒調服之。土當兒頂上戴出妙。

又方

朱砂壹兩

右水煎數沸。然後取酒和服之。

又方

水銀貳兩

右水煮二三十沸。服之立產。

滑胎易產。

白蜜

苦酒

猪脂各壹升

右相和。煎三四沸。臨腹痛時。以熱酒調下三

四錢匕。不過五六服。即出。

○難產令易產方論第十五凡七道

論曰。夫產難者。內宜用藥。外宜用法。蓋多門救

療。以取其安也。

療產難坐草數日。困乏不能生。此為母先有病

經絡俱閉。所然。

赤小豆貳升 膠叁升

右水玖升。煎令熟。去豆內膠。洋令清服之。須
臾更一服。

又方

右令夫從外含水。吐着產婦口中即出。

療難產。疑胎在腹已死。

當歸肆分

芎藭陸分

右水陸升。煎取貳升。分作兩服。便安。胎死即

出。酒煎亦得。神驗。

治難產。困乏。腹痛有所見。兒及衣不出。

蒺藜子肆兩 貝母肆兩

右為末。每服壹匙。酒調服之。時再服。以出為

度。熱水調下亦得。

治難產。

箭壹隻燒為末

右以水調服之。

又方

鼈甲燒為末

右服方寸匕。立出。未生更服。

治療落胎腹痛。

芎藭

當歸

牛膝

麴麥各伍分

桂心

芎藭各肆分

右以水壹升柒合煎取捌合空心溫服。

○胎死胞衣不出方論第十六凡十八道

療姙娠經五六月胎死腹中或胞衣不出。

生地黃伍兩牛膝

杜心各捌分芳藟

朴消各捌分大黃各陸分

蒲黃伍分

右水貳升煎取捌合入蒲黃空心作二服。

療子死腹中不出。

雄鷄糞貳拾壹枚

右水貳升煎取伍合以米作粥食胎即出。

治姙娠經六七月子死腹中不出。

黑豆叁合

右醋壹升煎取捌合空心分溫三服。

治子死腹中母悶絕。

水銀拾貳分

右取井底土如雞子黃水研服之。

又方

赤小豆

右生吞七枚出若是女即二十七枚出。

經效理胎衣不出令爛。

牛膝

嬰麥各肆兩

滑石研捌分

當歸貳兩

通草陸兩

葵子壹升

右水伍升煎取貳升分三服溫服。

竈突土叁撮

右和煖水服之。

崔氏治胎胞不出。

大豆壹升

右苦酒伍升煮取叁升分為三服。

又方

右吞雞子兩三隻解髮刺喉中令嘔若因熱

以水煮螻蛄壹枚三四沸瀉口中汁下即出。

又方

大麥小豆

右等分相和煮取濃汁飲之出。

又方

赤朱壹兩

右研為粉以苦酒和服之即出。

又方

皂夾

右為末着鼻中一兩度自出。

療胞衣久不出腹滿即殺人服此方即爛。

桂心

牛膝

通草各叁兩

滑石貳兩

葵子壹升

嬰麥肆兩