

臨床處方手冊

連 潔 羣 編 著

新 醫 書 局 發 行

•



臨床處方手冊

書號：0235

編 著 連 潔 羣
 出 版 新 醫 書 局
 發 行 新 醫 書 局
 杭州馬市街醬園弄四號
 上海漢口路六二七號
 北京宣內大街八五號

印 刷 新 醫 印 刷 廠
 杭州肅儀巷二四號



一九四九年十二月初版
 一九五二年十月七版
 19,001—22,000
 定價人民幣一萬六千元



序

一九四六年冬，余增訂已故李定教授所編常用處方集歲事，深覺此書對於臨床醫師確有不少便益。翌年付梓以後，初版一千冊於短短數月中售罄，遂益信目前臨床醫界對於此類書籍之迫切需要。但私意認為以藥品作用分類之處方集，在臨床參考時尚嫌不便，當時擬再繼續編寫一本以疾病分類的處方集，但因診務以及冗雜所縲，未能如願。

今春新醫書局主人韓學川先生一再敦促，遂利用閒暇著手編寫，歷時六個月始行告成。本書惟一之特點在使讀者不但學習了處方，抑且是一本各科兼容的治療學。對於每一處方之末尾，均加以註釋（例如強心用，退熱用，殺菌用，消炎用等等）；一部份處方因其藥物應用方法較為特殊者，更加以簡單之說明；對於某數疾病之需要外科手術，或其他物理治療者，亦予提及。

全書包括八種科別，二百五十種疾病，幾乎涉及全部臨床治療科目，故難免有錯誤或遺漏之處，敬希讀者多多賜正，不勝企盼！

一九四八年十月

連潔羣識

臨床處方手冊

目 錄

第一章 內科病處方

第一節 急性傳染病…… 1

傷寒…………… 1

痢疾…………… 7

霍亂…………… 9

瘧疾…………… 13

斑疹傷寒…………… 15

猩紅熱…………… 15

麻疹風疹水痘…………… 18

白喉…………… 19

鼠疫…………… 21

天花…………… 22

流行性腮腺炎…………… 23

流行性感胃…………… 23

回歸熱…………… 28

Weil 氏病…………… 29

黑熱病…………… 29

膜膜炎…………… 30

流行性腦炎…………… 33

波動熱…………… 34

登革熱…………… 35

洛磯山斑疹熱…………… 35

戰慄熱…………… 35

鼠咬熱…………… 35

黃熱病…………… 36

麻風…………… 36

狂犬病…………… 37

恙虫病…………… 38

第二節 呼吸系統病

氣管支炎…………… 38

枝氣管擴張…………… 41

枝氣管哮喘…………… 42

肺氣腫…………… 45

肺炎…………… 45

肺結核…………… 47

肺水腫…………… 52

肺瓜仁虫病…………… 53

肺壞疽…………… 53

肺癆…………… 55

肋膜炎…………… 55

第三節 消化系統病

口內炎…………… 57

口頰壞疽…………… 59

食道炎…………… 60

食道痙攣…………… 61

食道麻痺…………… 61

胃酸過多症…………… 62

胃酸缺乏症…………… 64

胃炎…………… 66

胃潰瘍…………… 67

胃癌…………… 69

胃下垂症	70	萎黃病	104
胃弛緩症	71	溶血性黃疸	105
胃擴張症	72	白血病	105
十二指腸潰瘍	73	何杰金氏病	105
消化不良症	73	顆粒性白血球缺乏 病	051
腸炎	74	血友病	106
腸結核	77	紫斑病	107
闌尾炎	77	心內膜炎	108
常習性便秘	79	心臟瓣膜病	109
腸出血	81	心肌炎	111
腸穿孔	83	心絞痛	112
腸疝痛	83	心包炎	113
腸梗阻	84	雷諾氏病	114
斯潑盧	85	動脈硬化症	115
痔核	86	高血壓症	117
蛔虫病	87	低血壓症	119
鉤虫病	88	動脈瘤	119
蟯虫病	89	靜脈炎	120
薑片虫病	89	第五節 泌尿生殖系統病	
肝炎	90	腎炎	120
肝硬變	91	腎結核	122
黃疸	92	腎盂炎	123
胆管炎	94	膀胱炎	124
胆囊炎	95	尿毒症	126
胆石症	95	遺尿症	127
日本住血吸蟲病	96	湯萎早洩症	127
胰腺炎	97	遺精症	128
腹水	97	第六節 內分泌腺疾病	
腹膜炎	98	巴錫陀氏病	129
第四節 血液及循環系統 病		粘液性水腫	130
貧血	99	克汀病	131

- | | | | |
|------------|-----|-----------|-----|
| 手足搖蕩症 | 131 | 軟骨病 | 155 |
| 阿狄森氏病 | 132 | 結膜乾燥症 | 155 |
| 膝端肥大症 | 132 | 夜盲症 | 156 |
| 侏儒症 | 132 | 培拉格拉 | 156 |
| 去勢病 | 132 | 第十節 運動器疾病 | |
| 第七節 新陳代謝病 | | 肌肉痲痺質斯 | 157 |
| 糖尿病 | 134 | 肌炎 | 157 |
| 尿崩症 | 134 | 關節痲痺質斯 | 158 |
| 痛風 | 135 | 關節炎 | 159 |
| 肥胖症 | 135 | 第二章 外科及皮膚 | |
| 第八節 神經系統病 | | 科處方 | |
| 神經衰弱症 | 136 | 外用消炎劑 | 161 |
| 希司忒利亞症 | 138 | 外用消毒劑 | 162 |
| 偏頭痛及頭痛 | 139 | 外用止血劑 | 161 |
| 腦充血 | 141 | 外用止痛劑 | 163 |
| 腦貧血 | 141 | 全身麻醉劑 | 163 |
| 中風 | 142 | 局部麻醉劑 | 163 |
| 脊髓癆 | 133 | 腐蝕劑 | 163 |
| 舞蹈病 | 145 | 火傷燙傷劑 | 163 |
| 暈船病 | 146 | 凍傷劑 | 171 |
| 潛水夫病 | 147 | 蛇咬症 | 173 |
| 神經炎及多發性神 | | 潰瘍處方 | 171 |
| 經炎 | 147 | 痔瘡處方 | 175 |
| 三叉神經痛 | 148 | 休克及虛脫 | 173 |
| 肋間神經痛 | 150 | 丹毒 | 177 |
| 坐骨神經痛 | 150 | 癰及癤 | 178 |
| 神經麻痺 | 151 | 敗血症及膿毒症 | 179 |
| 癱瘓 | 151 | 破傷風 | 189 |
| 第九節 維生素缺乏病 | | 脾脫疽 | 181 |
| 腳氣病 | 152 | 氣性壞疽 | 182 |
| 壞血病 | 153 | 淋巴腺結核 | 184 |
| 佝僂病 | 154 | | |

骨結核..... 185

濕疹..... 185

帶狀瘡疹..... 187

膿疱病..... 188

疥瘡..... 189

頭虱及陰虱..... 191

牛皮癬..... 191

白癬..... 193

黃癬..... 194

癩瘡..... 195

酒渣鼻..... 197

天疱瘡..... 197

尋麻疹..... 198

癩疹..... 199

香港足..... 200

毛囊炎..... 201

鬚瘡..... 202

橡皮腫..... 203

狼瘡..... 203

鵝眼..... 204

胼胝..... 204

雀斑..... 205

禿髮..... 205

白髮..... 207

多汗症..... 208

第三章 花柳科處方

梅毒下疳..... 208

梅毒橫痃..... 209

第二期梅毒..... 210

第三期梅毒..... 211

先天梅毒..... 212

淋病..... 213

軟性下疳..... 217

鼠蹊淋巴肉芽腫..... 218

花柳性肉芽腫..... 219

第四章 婦產科處方

妊娠嘔吐..... 219

子癲..... 221

產褥熱..... 222

催乳..... 222

產後貧血..... 223

子宮弛緩症..... 223

陣痛微弱..... 223

乳腺炎..... 224

月經過多..... 225

月經過少..... 225

子宮頸膏卡他及陰道
道段藥爛..... 226

子宮內膜炎..... 227

子宮癌..... 228

痛經..... 228

白帶..... 229

第五章 小兒科處方

腹瀉..... 229

脫水及酸中毒..... 232

嘔吐..... 233

便秘與腹痛..... 234

生齒困難..... 235

佝僂病..... 235

手足搖擻症..... 235

嬰兒潮氣..... 236

嬰兒壞血病..... 236

新生兒眼炎..... 236

新生兒膿炎.....	237	衄血.....	249
新生兒葷皮症.....	238	卡他性鼻炎.....	250
新生兒丹毒.....	238	肥厚性鼻炎.....	252
天花.....	238	萎縮性鼻炎.....	252
麻疹.....	238	嗅覺障礙.....	253
白喉.....	239	上頰齦炎.....	254
破傷風.....	239	齦齦炎.....	254
百日咳.....	240	奮森氏口峽炎.....	255
腦膜炎.....	241	舌炎.....	255
痢疾.....	241	齒槽膿腫.....	256
結核病.....	242	水瘡.....	256
肺炎.....	242	扁桃體炎.....	256
鵝口瘡.....	242	咽喉炎.....	257
腸套疊.....	243	咽喉結核.....	259
腸寄生虫病.....	243	咽喉梅毒.....	258
腎盂炎.....	243	附 錄	
驚厥.....	243	A. 常用拉英簡字	
遺尿.....	244	釋義.....	260
第六章 耳鼻咽喉科		B. 處方要點及舉	
外耳道炎.....	245	例.....	261
疔瘰癧.....	246	C. 藥用衡量制.....	263
鼓膜炎.....	246	D. 配合禁忌.....	269
中耳炎.....	246	E. 小兒劑量計算	
乳突炎.....	248	法.....	271
內耳炎.....	248	F. 極量表.....	278
聽神經炎.....	249	G. 常用磺胺類藥	
		物劑量表.....	288

醫師必備

臨床處方手冊

第一章 內科病處方

第一節 急性傳染病

傷寒 *Typhoid Fever*

1. Chloromycetin 2.5 氯黴素 ✓

上為一次內服量。傷寒患者第一次每公斤體重服50公絲，五十公斤體重患者則第一次服2.5公分，以後每隔二小時服一次，每次0.25公分，迄熱度降至常溫後之首五日，改為每三至四小時服一次。每病者平均服用總量為19.1公分，平均服藥8.1日。本品為傷寒之最新特效藥，根據臨床實驗報告頗為滿意。

2. Sulfathiazole 6.0 磺胺噻唑 ✓

Sulfaguanidine 6.0 磺胺胍 ✓

上分六包，每四小時服一包。（腸消毒用，兼對體內毒素有控制作用）。

3. 0.05 Digitalis tab. 4片 毛地黃片 ✓

上每四小時服一片（強心用）

4. Elben 10.0 愛而邦

上為十包，一日三四包。（退熱用）

5. Sodii salicylate 2.0 水楊酸鈉 ✓

上為一包頓服（高熱達二週仍不下降，而恐體力不

支者用之)

6. **Chinine Hcl** 0.1—0.5 鹽酸奎寧 ✓
 上爲一包頓服(同上)
7. **Antipyrin** 1.5 安替匹林 ✓
Sacch lact 1.5 乳糖
 上分三包，一日三次分服(同上)
8. **Pyranidon** 0.6 正拉米洞 ✓
Aq. dest 100.0 溜水
 每日三次，一日分服(同上)
9. **Gryogenine** 1.5 克利金
Sacch lact 1.5 乳糖
 上分三包，一日分服(同上)
- 10 **Bonyrin Quinine Tab.** 六片 達秘靈奎寧片
 上每日三次，每次二片。(同上)
- 11 **Fchnon Tab.** 九片 福白龍片
 上每日三次，每次二片(同上)
- 12 **Acid Hydrochloride Dilut** 1.0 稀鹽酸 ✓
Tet. Aurant 3.0 橙皮酊
Simple Syrup. 10.0 單糖漿
Aq. dest 100.0 溜水
 上每兩小時服一食匙(解渴用)
- 13 **Acid Hydrochloride Dilut** 1.0 稀鹽酸
Rot Wein 5.0 赤葡萄酒
Sirup Auranti corticis 10.0 橙皮糖漿
Aq. dest 100.0 溜水
 上每二小時服一食匙(解渴用，兼有興奮作用)
- 14 **Digalen** 1.5 狄茄令

	Urotropin	1.5	接洛昆品 ✓
	Tet. Amarae	2.0	苦味酊
	Simple Sirup	10.0	單糖漿
	Aq. dest.	100.0	餾水
	上一日三次分服(預防心臟衰弱及尿路殺菌劑)		
13	Coramine liq.	2.0	可提明液 ✓
	Vitamin B. Complex	10.0	維他命B複劑 ✓
	Syrup. Aurant	10.0	橙皮糖漿
	上一日三次分服(心臟衰弱用亦作為預防心臟衰弱用)		
16	Tet. Digitalis	1.5	毛地黃酊
	Rot Wein	10.0	赤酒
	Aq. dest.	100.0	餾水
	一日三次分服(同上)		
17	Cardiazol Tab.	四片	卡代柴而片
	一日四次分服(同上)		
18	Cadechol Tab	六片	科德孝片
	一日三次,每次二片(同上)		
19	Pandigal Liq.	1.5	勞的加液
	Caffeine S. B.	0.3	安息香酸鈉咖啡因 ✓
	S. S.	10.0	糖漿
	Aq. dest.	100.0	餾水
	一日三次分服(同上)		
20	Digifolin Liq.	2.0	地麥福林液
	Tet. Strychinine	1.0	士的年酊
	S. S.	10.0	糖漿

- | | | | | |
|----|-----------------------------|-------|--------|---|
| | Ag. dest | 100.0 | 餾水 | |
| | 一日三次分服(同上,兼有激呼吸作用) | | | |
| 21 | Digitamin Liq. | 1.5 | 地荖他命液 | |
| | Tct. Scilla | 2.0 | 海葱酊 | |
| | S. S. | 10.0 | 糖漿 | |
| | Aq. dest | 100.0 | 餾水 | |
| | 一日三次分服(心臟衰弱用) | | | |
| 22 | Cardase | 3.0 | 卡狄司 | |
| | Tct. Digitalis | 1.5 | 毛地黃酊 | |
| | S. Aurant | 10.0 | 橙皮糖漿 | |
| | Aq. dest. | 100.0 | 餾水 | |
| | 一日三次分服(同上) | | | |
| 23 | Coagulen Liq | 5.0 | 可阿古連液 | |
| | S. S. | 10.0 | 糖漿 | |
| | Aq. dest | 100.0 | 餾水 | |
| | 上每次一食匙,一日三次(腸出血用) | | | |
| 24 | Stypticin Tab. | 六片 | 斯替普替新片 | |
| | 上每日三次,每次二片。(同上) | | | |
| 25 | Clauden Tab. | 六片 | 克羅甸片 | |
| | 上每日三次,每次二片。(同上) | | | |
| 26 | Tct. Opium | 1.0 | 阿片酊 | ✓ |
| | Tct. Belladonna | 1.0 | 顛茄酊 | ✓ |
| | Tct. Amarae | 2.0 | 苦味酊 | ✓ |
| | Ag. dest | 100.0 | 餾水 | |
| | 一日三次分服(同上,須密切注意是否有鼓腸之發生或加重) | | | |
| 27 | Gelatine alba. | 20.0 | 白阿膠 | |

- | | | | |
|----|---------------------------------|---------|---------------|
| | S. S. | 10.0 | 糖漿 |
| | Aq. dest. | 100.0 | 餾水 |
| | 一日三次分服(同上) | | |
| 28 | Carbo. Animal | 3.0 | 骨炭末 |
| | Bismuth. Subnit | 1.5 | 次蒼 |
| | 一日三次分服(腹部氣脹用) | | |
| 29 | Tannalbia | 2.0 | 單那而並 |
| | Dover's Powder | 1.0 | 陀氏散 ✓ |
| | 一日三次分服(腹瀉頗劇時用之) | | |
| 30 | Tet. Camphor & Opium | 3.0 | 複方樟鴉酒 ✓ |
| | S. S. | 10.0 | 糖漿 |
| | Aq. dest | 60.0 | 餾水 |
| | 一日三次分服(同上) | | |
| 31 | Sedobrol Liq | 12.0 | 色多波液 |
| | Aq. dest | 100.0 | 餾水 |
| | 一日三次分服(不眠或驚厥用之) | | |
| 32 | Chloral Hydrat | 2.0 | 抱水克羅拉兒 |
| | Pot. Bromide | 2.0 | 溴化鉀 ✓ |
| | Aq. dest | 100.0 | 餾水 |
| | 一日三次分服(同上) | | |
| 33 | Glucose A. B. C. D. | 100.0 | 四維葡萄糖 ✓ |
| | 一日數次, 每次一二食匙, 沖開水服(營養目的) | | |
| 34 | Ascorbic Acid | 0.5 | 抗酸血酸(丙種維生素) ✓ |
| | 一日數次分服, 沖開水服(同上, 兼有預防併發病及腸出血之用) | | |
| 35 | Thiamine Hydro chloride | 5—10mg. | ✓ |
| | 一日數次, 沖開水分服(同上, 兼有預防腳氣病之用) | | |

傷寒注射藥

- (A) 退熱：Omnadin 握得那丁，Erstin 愛而斯丁，Panadin 百乃定，Bagnon 巴苦諾恩，Febnon 福白龍，Fiberung 沸李翁，Anti-Typhoid Serum 傷寒血清，Streptomycin 鏈黴素等。
- (B) 強心：Camphonasin 康福那星，Camphosin 康福星，Caffeine sodii Benzoate 安納咖針，Digalen 狄茄令，Digitolin 狄吉安靈，Strychnine Nitrat 番木鱉鹼，Coramine 可拉明，50% Glucose Solution 高張葡萄糖液，Cardiazol 卡代紫而等。
- (C) 驅出血：Caagulen 可阿古連，Claudea 克羅甸，Thrombogen 得羅保根，Gelatin Solution 白阿膠注射液，Ringers Solution 林格爾氏液，Sodium chloride solution Strong 濃厚食鹽水，Koago 可阿哥，Agrimonine 仙鶴草素，Redoxon 力度伸等。
- (D) 營養：50% Glucose Solution, 50% 葡萄糖液，Calcium Sandoz 山德氏鈣，Calcium Gluconate 葡萄糖酸鈣，Cebion 西皮恩，Cetasin 西他新，cevalin 西維令，Redoxon 力度伸，ceetomin 西多命，Benerva 秉乃維，Vibemin 維皮命等。

痢疾 *Dysentery*

1. Sulfaguanidine 6.0 磺胺脒 ✓
Sodii bicarb onate 6.0 重曹
上分六包，先服二包，以後每隔四小時服一包。(桿菌痢疾)
2. Sulfasuxidine 6.0 琥珀酸磺胺噻唑
Sodium bicarbonate 6.0 重曹
上分六包，先服二包，以後每隔四小時服一包。(同上)
3. Sulfathalidine 6.0 噻噻磺胺噻唑
Sodium bicarbonate 6.0 重曹
上分六包，先服二包，以後每隔四小時服一包(同上)
4. Yatren 1.0 藥特靈 ✓
上分四包，一日分服(桿菌痢疾及阿米巴痢疾)
3. Vioform 0.75 慰歐仿
上分三包，裝入膠囊，一日分服(阿米巴痢疾)
6. Diodoquin tab. 3片 雙碘喹啉片
一日三次分服——每片含0.21gm。(阿米巴痢疾)
7. 0.25gm. Carbarsone cap. 3個 卡巴生膠囊 ✓
一日三次分服(同上)
8. 0.25 Acetarsona tab 3片 阿西他生片
一日三次分服(同上)
9. Magnesium sulphate 20.0 硫酸鎂 ✓
Tct. amarae 2.0 苦味酞 ✓
Aq. dest. 100.0 餾水
一日三次分服(各型痢疾早期用)

- | | | | | |
|----|-----------------------|-------|-------|---|
| 10 | Sodium Sulphate | 20.0 | 硫酸鈉 | ✓ |
| | Hcl. dilut | 1.0 | 稀鹽酸 | |
| | Tct. amarae | 2.0 | 苦味酊 | |
| | Aq. dest | 100.0 | 餾水 | |
| | 一日三次分服(同上) | | | |
| 11 | Castol oil | 25.0 | 蓖麻油 | ✓ |
| | 空腹一次頓服(同上) | | | |
| 12 | Calomel | 0.3 | 甘汞 | |
| | Sacch lact | 0.5 | 乳糖 | |
| | 空腹一次頓服(同上) | | | |
| 13 | Bismuth Subnit | 2.0 | 次蒼 | |
| | Tannalbin | 2.0 | 單那而並 | |
| | Salol | 1.5 | 薩羅身 | |
| | 一日三次分服(泄瀉太厲時用) | | | |
| 14 | Dover's powder | 1.2 | 陀氏散 | ✓ |
| | Calomel | 0.05 | 甘汞 | |
| | 一日三次分服(同上,兼有腸消毒作用) | | | |
| 15 | Agisicol | 3.0 | 矽炭銀 | |
| | 一日三次分服(同上,兼有腸消毒及吸着作用) | | | |
| 16 | Activated carbon | 6.0 | 活性炭 | ✓ |
| | 一日三次分服(本劑具有毒素吸着作用) | | | |
| 17 | Opium powder | 0.05 | | ✓ |
| | Ex. scopolia 10% | 0.7 | | |
| | 一日三次分服(對泄瀉太甚及有劇痛者用之) | | | |
| 18 | Rivanolettes | 六粒 | 雷佛奴粒吞 | |
| | 一日三次分服(桿菌痢疾殺菌用) | | | |
| 19 | Entro-vioform | 六片 | 腸用慰歐仿 | |

- 一日三次，每次一或二片。(阿米巴痢疾用)
- 20 Emetine bismuth iodide 三片 碘化吐根素銻 ✓
一日三次，每次一片(同上)
- 21 0.5% Silver nitrat solution 500.0 硝酸銀液 ✓
上為一次灌腸料(各型痢疾)
- 22 0.5% Entro-vioform solution 200.0 腸用慰歐仿液
上為一次灌腸料(阿米巴痢疾)
- 23 1% Yatren Solution 200.0 藥特靈液
上為一次灌腸料(各型痢疾)
- 24 0.5% Rivanal solution 200.0 雷佛奴兒液
上為一次灌腸料(同上)
- 25 1% Sodium chloride solution 500.0 食鹽水 ✓
上為一次灌腸料
- 26 5% Rimaon solution 250.0 麗茅恩液
上為一次灌腸料
痢疾注射藥
- 0.03—0.06 Emetine hydrochloride 鹽酸吐根素 ✓
• anti-dysentery serum 赤痢血清, mylysin 滅痢
仁, Streptomycin 鏈黴素(細菌性), 磺胺脲鈉 Solu-th-
iazon 聖露消治龍等。

霍亂 *Cholera*

1. Sulfathalidine 6.0 硫噻磺胺噻唑
Sodium bicarb 6.0 重曹
上分六包，先服二包，以後每隔四小時服一包。
2. Sulfasuxidine 6.0 琥珀噻磺胺噻唑
Sodium Bicarb 6.0 重曹