

605
20969

056346

中医临床丛书之二

中医妇科临床手册

中医临床叢书之二

中医妇科临床手册

成都中医院院編

四川人民出版社

一九五九年·成都

中医临床从書之二

中医妇科临床手册

成都中医学院編

四川人民出版社出版
四川省新华書店發行 成都印制厂印刷

850×1168毫米1/2·印張2½·字數49,000
1959年12月第一版 1959年12月第一次印刷
印數1—10,000

統一書號：14118·4A
定 价（5）0.25元

前 言

在党的中医政策的光輝照耀下，全国医藥衛生工作者掀起了繼承和發揚祖国医学的热潮，积极地响应了党的号召，組織起来學習中医，广大中西医务人员團結在一起，共同为創造我国新医学而努力。为了帮助初学中医者更好地理論联系实际，迅速掌握临床技术，从而加强医疗力量，以适应社会主义建設全面繼續躍进的需要，我院妇科教研組在党的总路綫的光輝照耀下，在学院党委的領導和鼓 励下，鼓足干勁，編写了这本“中医妇科临床手册”，供西医学習中医的讀者和中医学院、校的学生以及中医开业医师在實習或临床上的参考。以便共同为解除妇女疾病威胁，保护妇女健康，發揮妇女的積極性，更好地进行社会主义建設，作出应有的貢獻。

这本手册，是根据我院教師的临床經驗編写而成的，內容共分六章。第一章扼要地介紹妇科疾病的診斷特点。第二至六章，按經、帶、胎、产及妇女杂病分类，每类为一章，每章分列若干病，每病分概說、証治两部分。概說部分簡述了病名、病因、病理及治疗方法；証治部分分列这一个病的若干証型，每症下分症状、治法和处方，方后附加減法。这样基本体现了中医“辨証論治”的精神和理、法、方、藥的具体运用及其灵活变化的規律。

本書共載41病，123症，186方。因系供臨床參考，目的在介紹妇科常見疾病的辨証治疗方法，故理論談得少一些。为了尽量符合适用，所选方剂以临症有效的驗方为主，其剂量是一般常用的剂量，用时可以斟酌加減。

由于我們編寫的時間比較匆忙，可能有些地方考慮還不周密，疏漏和不妥善的地方在所難免，歡迎讀者隨時提出意見，以便再版時補充和修訂。

成都中醫學院

1959年国庆节

目 录

第一章 妇科疾病的診斷方法	(1)
一 望診.....	(1)
二 聞診.....	(2)
三 問診.....	(2)
四 切診.....	(4)
第二章 月經疾病.....	(6)
一 月經不調.....	(6)
(一) 月經先期	(6)
(二) 月經后期	(8)
(三) 月經先后無定期.....	(11)
(四) 月經过多	(14)
(五) 月經過少	(15)
(六) 經行吐衄	(17)
(七) 經行發熱	(18)
二 痛經.....	(19)
三 經閉.....	(21)
四 崩漏.....	(26)
第三章 帶下.....	(29)
一 白帶.....	(29)

二 黃帶	(30)
三 赤帶	(30)
四 黑帶	(31)

第四章 妊娠疾病 (33)

一 惡阻	(33)
二 胎動不安	(35)
三 胎漏	(36)
四 轉胞	(38)
五 子淋	(39)
六 子肿	(40)
七 子癟	(42)
八 子瘡	(44)
九 妊娠腹痛	(45)
一〇 死胎不下	(47)
一一 難產	(48)

第五章 产后疾病 (50)

一 胎衣不下	(50)
二 产后血量	(51)
三 惡露不下	(52)
四 惡露不淨	(53)
五 产后血崩	(55)
六 产后發熱	(57)
七 产后發癰	(58)

八 产后腹痛.....	(60)
九 乳汁不行.....	(61)
一〇 乳汁自出.....	(62)
一一 乳結.....	(63)
第六章 妇人杂病.....	(65)
一 瘢痕.....	(65)
二 脏燥.....	(67)
三 陰挺.....	(68)
四 陰痒.....	(69)
五 不孕証.....	(70)

第一章 妇科疾病的診斷方法

一 望 診

(一) 望面色：面色青为肝郁或气滞，常見于月經先后無定期、痛經等症；面色黃为湿郁，黃而黯为寒湿，多見于白帶，黃如橙色为湿热，常見于帶下日久而色黃；面色赤屬热，滿面俱赤为实热，常見于因血热而引起的月經先期、过多等症；兩顴紅为虛热，常見于月經后期、血枯經閉等症；面色白为气虛或亡血，如白而光亮为气虛，常見于气虛帶下，蒼白为亡血，多見于崩漏；面色灰黑而黯，为腎虛或陽氣衰弱，多見于虛寒帶下；面色紫而黯多为血瘀，常見于經閉、痛經等症。

(二) 望舌質：舌質淡紅为虛为寒，深紅为血热，絳紅为热甚，紫黯而干燥或見紫点为有瘀血，舌絳無苔为陰虛，舌淡而潤如浸水状者为陽虛。（各色常見于何病，可參看上段）

(三) 望苔色：苔白为寒，常見于因寒滞而引起的月經后期、痛經、白帶等症；舌厚膩为湿滞，白膩为寒湿，常見于白帶，黃膩为湿热，多見于黃帶；苔滑为停痰，黃滑为热，白滑为寒，均常見于帶下稠粘之症；苔黃而燥为热甚伤津，常見于血热崩漏。

二 聽

(一) 辨声音：声音清朗为正气尚充，其病尚浅，如病未久而语音不續，为中气本虛，常見于因气虛而引起的带下或月經过多；語言懶怯，先輕后重，为內伤元气，常見于久崩久漏或虛勞經閉；时时嘆息或噯氣为气郁，常見于肝郁或气滞的月經不調或痛經等症；形瘦声哑为劳瘵，可見于經閉；独言独語不知首尾为思慮伤脾或月經將絕的先兆。

(二) 辨臭味

1. 辨口臭：一般以腐臭为食积，可見于妊娠或产后的伤食腹痛；腥臭为血热，多見于倒經或吐衄；孕时口有恶臭而舌青者，则为胎死腹中之象。

2. 辨月經及白帶臭：月經腥臭或带下腥臭兼夹血液，均为血热；带下恶臭特甚，其色或灰或黃，或如膿痂，或如糞便，或如紫汁，为有瘀血。（常見于子宮部分的癌症）

三 問

(一) 問月經：主要了解月經周期的先后、經量的多少、顏色的深淺、濃度的稠粘或稀薄，以及行經时有無腹痛等，根据这些情况，分辨寒热虛实。

1. 周期：正常月經大約是二十八天一次（从上次月經的第一天算到下次月經的第一天），如提前七天以上为月經先期，退后七天以上为月經后期（以連續二三月为准，偶尔一次者不以先后期論），或先或后無常度的为月經先后無

定期。一般以先期多热，后期多寒，先后無定期多为气滞。
(必須結合四診論斷，下同)

2. 經量：量是指行經時經水的多少而言。如經水超過常量为多，不及常量为少，一般以量多为热为有余，量少为寒为不足。

3. 經色：色是指經水的顏色。正常月經的顏色是开始較淡，繼而加深，終又淡紅，不稀不稠，不凝結，無臭味。若色呈鮮紅为血热或劳伤，紫紅为热甚，淡紅为血虛，开始極淡逐漸轉紅为气虛，淡紅如水为气血俱虛，色淡而稠粘为夾痰湿，沉黑如黑豆汁为寒。

4. 濃度：稠粘为热为实，稀薄为虛为寒，凝結成塊为血瘀或气滞。

5. 腹痛：一般是指行經時小腹疼痛。大體經前疼痛为气滞为血瘀，經后疼痛为气血虛弱，脹多于痛为气滞，痛甚于脹为血瘀，痛而喜按为虛，拒按为实，喜得热熨为寒，得热益痛为热，刺痛多热，絞痛多寒，隐痛多虛，持續疼痛多为血积，时痛时止多为气滞。

(二) 間白帶：主要是了解白帶的顏色、濃度、臭味等。一般以带下色白而清稀者为虛为寒，稠粘为痰湿，兼有血液为血热，色黃为湿热，色黑而清稀为腎虛，無臭而稠粘为实，清稀为寒，臭秽特甚、五色杂下为血瘀敗膿为患（常見于子宮部分的癌症）。

(三) 間胎产：主要了解曾受孕否，生过几胎，是否順产，有無小产，最后一次月經的时间，过去有無經閉等情

况。如受孕后容易小产的多屬腎虛；生产多次而身体較弱的多为气血虛弱；生产时曾發生过难产的多有冲任損傷；以往月經正常，無經閉情况，忽然停經两月，有思酸作嘔，胃納不佳，肢体疲怠等症状者为早期妊娠；若是新产当問其有無寒热、恶露多少、有無腹痛等，如有寒热多屬外感，潮热多屬血虛，恶露多而不净多为气虛，恶露少而不净、兼見小腹疼痛拒按的多为血瘀，痛在大腹、不喜按的多为食积。

四 切 診

切診以診脉为主，妇科病多見浮沉迟数弦芤滑濶等脉，一般主病如下：

浮脉：浮而無力，無外感症状为气虛，多見于带下、陰挺等症；浮数有力，見于右寸为月經将至或正值經期之象。

沉脉：沉而有力为实，多見于癥瘕或血瘀；沉而無力为虛，多見于腎虛或寒湿带下。

迟脉：迟主寒，迟而兼沉，常見于寒性痛經。

数脉：数为热，細数为虛热，常見于月經先期或崩漏。

弦脉：弦主氣滞肝郁，弦数为肝热，常見于肝郁的月經先期或先后無定期；弦迟为寒，常見于痛經。

芤脉：芤主失血，常見于暴崩下血，若崩止而脉仍芤，将有繼續出血之虞。

滑脉：滑主痰，常見于痰湿带下；若左寸浮滑如豆，尺脉按之不絕，多主有孕。

濶脉：濶主血少气滞，常見于因血虛或气滞引起的經

少、經閉等症。

此外在临产时脉见浮数散乱（六至以上，散乱无根）或沉细而滑，称为离经脉，为欲产之兆。

第二章 月經疾病

一 月經不調

月經不調，是指月經周期、經量、經色等發生異常現象。常見的有：月經先期，月經后期，月經先后無定期，月經過多，月經過少，經行吐衄，經行發熱等類型。

(一) 月經先期

〔概說〕 月經先期又叫經水先期或經早，一般指月經在二十二天左右即來，并伴有其它不適症狀。有的由於血熱，多因平素熱盛、喜食辛辣或陰虛火旺；有的由於氣虛，多因素稟不足、心脾氣虛、不能聚血；有的由於肝郁，多因情志不調或性情急躁；有的由於血瘀，多因瘀血阻滯、新血不得歸經。一般以先期多熱、多虛，治宜涼血、扶氣為主，慎用補血、行血、耗氣之藥。其中也有屬寒、屬實的，雖宜溫寒或行血，但亦不可過用。

〔証治〕

1 血熱証

症狀：色紅量多，無血塊，腹不痛，頭暈，手心發熱，面潮紅，口干，舌紅苔薄黃，脈數；熱盛則色紫有塊，時有腹痛，二便不暢，喜涼口渴，舌深紅或絳，苔黃燥，脈

数有力。

治法：宜养陰清热凉血，用加减清經湯。

处方：生地四錢 丹皮三錢 地骨皮三錢 白芍三錢 焦艾三錢 澤兰三錢 益母草三錢水煎服。

加减法：热盛加黃柏三錢、知母四錢；量过多加炒蒲黃三錢、烏賊骨八錢。

2 气虛証

症状：經來先淡后紅，量不太多，時有血塊，腰脹腹不痛，神倦氣短，舌淡苔常，脈濡；兼寒則色暗而薄、量少，腹痛喜按，得熱則減，口淡胃納不佳，舌淡苔白而潤，脈沉迟；兼熱則量多，色紅無塊，無腰腹脹痛，頭暈心煩，舌淡苔薄黃，脈浮大而數。

治法：宜補氣養血，用加味四君子湯；兼熱宜補氣清熱，用補氣清熱湯；兼寒宜補气温經，用益气温經湯。

处方：（1）加味四君子湯

党参五錢 白朮三錢 茯苓三錢 甘草二錢 当归二錢 酒芍三錢水煎、空腹溫服。

加减法：量过多加黃芪三錢、烏賊骨八錢。

（2）补气清热湯

泡参六錢 黃芪三錢 生地炭三錢 茅根四錢 旱蓮草四錢 益母草四錢 焦艾叶二錢水煎服。

（3）益气温經湯

泡参五錢 白朮三錢 当归三錢 川芎一錢半 香附三錢 焦艾三錢 延胡索二錢 盐小茴一錢水煎，溫服。

3 肝郁証

症狀：經來量多色紅，少腹及兩肋脹痛，心煩善怒，舌紅苔薄黃，脈弦數。

治法：宜平肝解郁，清熱止血，用加減丹梔逍遙散

處方：丹皮二錢 山梔仁三錢 柴胡二錢 白芍三錢 当归一錢 白朮二錢 益母草三錢 烏賊骨五錢 甘草二錢

4 血瘀証

症狀：經來色紫稠粘，中夾血塊，腹痛拒按，舌質帶紫，苔黃而干，脈沉實。

治法：宜行血逐瘀，用桃紅四物湯。

處方：生地四錢 归尾二錢 赤芍三錢 川芎一錢 桃仁一錢 紅花一錢 丹皮三錢 五靈脂二錢

(二) 月經後期

〔概說〕 月經後期又叫做經遲或退后，一般指月經過期七天(也有延遲到十天以上的)并伴有全身不適症狀者。其原因：有的由於血寒，多因陽氣不足，寒从中生而生化失權；有的由於血虛或陰虛血熱而液少，以致運行遲緩；有的由於氣郁、痰濕或瘀血而發生阻滯，不能按时而下。其中以血寒為多見，其次是血虛，治宜溫經、補血、調氣，慎用涼血清熱及補氣破血之藥；其余如血熱以滋水為主，血瘀、痰阻以溫化為要。

〔証治〕

1 血寒証

症状：經色黯紅，量多有塊，少腹冷痛，舌淡苔薄白，脈遲緩；兼氣血兩虛的則色淡量多，喜熱畏寒，精神疲倦，小便清長，大便溏薄，舌淡口和，脈細而遲；兼氣滯的則色黯量少，腰腹脹甚而痛，喜熱熨，有時欲嘔，苔白脈遲。

治法：血寒的宜溫經攝血，用加減溫經攝血湯；兼氣血俱虛的宜溫補氣血，用加味十全大補湯；兼氣滯的宜調氣溫經，用加味蒼莎飲。

处方：（1）加減溫經攝血湯

熟地五錢 当归三錢 炒白芍三錢 純斷三錢 蕺艾三錢 白朮三錢 炮姜炭一錢

（2）加味十全大補湯

党参五錢 黃芪五錢 肉桂五分 白朮三錢 茯神四錢
当归二錢 川芎一錢 熟地三錢 白芍三錢 蕺艾三錢
阿胶二錢 甘草二錢

（3）加味蒼莎飲

蒼朮二錢 茯苓三錢 香附四錢 台烏二錢 炮姜一錢
当归二錢 川芎一錢 血木通二錢 紅澤兰四錢

2 血虛証

症状：經行後期，量少、色淡而薄，精神欠佳、頭暈心悸、腰痠腿軟，苔薄舌淡，脈沉弱。

治法：宜補血為主、佐以益氣；用歸地滋血湯。

处方：當歸首四錢 熟地四錢 枸杞三錢 莪肉三錢
鹿角霜三錢 泡參四錢 白朮三錢 香附三錢