


二十世紀

農業世界
實用果樹園藝學

編

吳縣潘繼文編著



新學會出版社
上海

中華民國五年六月初版發行
中華民國十一年十一月改正再版

(定價大洋八角)

實用
果樹園藝學後編

譯著者 吳縣潘繼文

訂正者 奉化吳化

校正者 奉化江起鯤
印刷者 中新印書局

新
版權
所有

總發行所 上海模盤街交通路新學會
分發行所 寧波日新街
代售處 北京奉天科學儀器館
南京共和書局
各省大書坊

山西晉新書社
廣東共和書局

實用果樹園藝學後編目次

各論

第一章 莢果

第一節 品質及種類

第二節 氣候及土質

第三節 苗木之養成及其管理

第四節 繁殖

第五節 接後之管理

第六節 整地及耕耘

第七節 栽植

第八節 剪定

第九節 整枝

第十節 肥培

第十一節 摘果及樹齡接替

第十二節 收穫

第十三節 病害

第十四節 蟲害

第二章 梨

第一節 品質及種類

第二節 氣候及土質

第三節 樹形及栽植之距離

第四節 繁殖

第五節 剪定

第六節 肥培

第七節 收穫及貯藏

第八節 病害

第九節 蟲害

第三章 柿

第一節 柿之位置及種類

第二節 氣候及土質

第三節 苗木

第四節 繁殖

第五節 樹形及栽植之距離

第六節 剪定

第七節 肥培

第八節 落果之原因

第九節 摘果及樹齡接替

第十節 收穫

第十一節 病害

第十二節 蟲害

第四章 柑橘

第一節 品質及種類

第二節 氣候及土質

第三節 苗木

第四節 栽植之時期及苗木之管理

第五節 繁殖

第六節 剪定

第七節 肥培

第八節 摘果

第九節 樹齡及接替

第十節 收穫及貯藏

第十一節 病害

第十二節 蟲害

第五章 檻桲

第一節 用途及種類

第二節 繁殖管理及採收

第六章 石榴

第一節 品質及種類

第二節 栽培

第七章 枇杷

第一節 品質及種類

第二節 氣候及土質

第三節 苗木

第四節 繁殖

第五節 剪定

第六節 肥培

第七節 採收及貯藏

第八章 桃

第一節 品質及種類

第二節 氣候及土質

第三節 苗木及栽植

第四節 枝之特性及樹形

第五節 繁殖

第六節 剪定

第七節 肥培

第八節 摘果及果實之保護

第九節 收穫

第十節 病害

第十一節 蟲害

第九章 杏

第一節 產地及種類

第二節 氣候及土質

第三節 繁殖

第四節 栽植及管理

第五節 採收及貯藏

第十章 李

第一節 品質及種類

第二節 栽植及剪定

第三節 肥培及摘果

第四節 病害及蟲害

第十一章 梅

第一節 位置及種類

第二節 氣候及土質

第三節 繁殖

第四節 栽植及樹形

第五節 剪定

第六節 肥培

第七節 採收

第八節 病害

第九節 蟲害

第十二章 橄欖

第一節 產地及種類

第二節 氣候及土質

第三節 繁殖及剪定採收

第十三章 櫻桃

第一節 品質及種類

第二節 氣候及土質

第三節 繁殖及栽植

第四節 剪定及肥培

第十四章 葡萄

第一節 品質及種類

第二節 氣候及土質

第三節 苗木之管理

第四節 繁殖

第五節 間作及壟作法

第六節 剪定及整枝

第七節 肥培

第八節 摘果及收穫

第九節 病害

第十節 蟲害

第十五章 無花果

第一節 性狀及種類

第二節 栽培

第三節 採收乾燥及貯藏

第十六章 樹莓

第一節 性狀氣候土質及種類

第二節 栽植

第十七章 須具利

第一節 位置及種類

第二節 氣候及土質

第三節 栽植

第十八章 草莓

第一節 品質及土質

第二節 栽植

第三節 收穫與收穫後之手續及株之更新法

第十九章 栗

第一節 位置及種類

第二節 氣候及土質

第三節 栽植

第四節 剪定及採收

第五節 病害

第六節 蟲害

實用果樹園藝學後編目次終



實用果樹園藝學後編

吳縣潘繼文編著

各論

第一章 蘋果

第一節 品質及種類

蘋果爲果中之王。以其不僅有艷麗之色澤。暨豐美之形狀。而足以壯其外觀。抑且富滋養之物質。及芬馥之香味。而更可裨益於人身。歐美諸國。推爲高等果品。故需要頗多。而栽培亦衆。應用交配新法。而品種因之愈多。注意栽培管理。而果質以之愈佳。研究不遺餘力。管理務求精密。誠駿駿乎。有一日千里之概也。迴顧吾國。則種植徒守習慣。栽培任諸粗放。即有二三優等種類。亦逐漸衰退。而將次淘汰矣。以彼之盛。較吾之衰。能不觸然而生感慨哉。然而我國天津所產之蘋果。以其色澤論。不亞於外國種之紅魁紅玉也。至以其品質而論。則誠有過之無不及。苟能應用學理而改良之。繁殖之。則吾知不數年來。必可駕各國而上之。况品質優良。則消路必暢。故苟能行合理的栽培。獲利必非淺渺也。(攷日本行合理的栽培。一畝六分地。

(即日本)
(一反步)可獲利二百圓云)

種類

吾國無論何事何物從未有精確之調查及詳細之報告者。區區果實更何論哉。況種類一事尤屬最難。往往以各地之方言不同。遂致異名而同種。或同名而異種也。現今由市場上所習見者。亦僅有一二種之普通種類耳。烏足稱道哉。竊謂他山之石可以攻錯。用特以東西洋之優等者略舉數種於後。

一、紅魁 (Red Astrachan) 樹性強健。枝條開展。果實扁圓形。表皮平滑光澤。呈濃紅色。數有白粉。肉質緻密。稍帶酸味。漿汁既多。甘芳又盛。且熟期甚早。七八月間已完熟而可採收矣。

二、初笑 (Duches of aldenburg)

樹性樹形均與前種相似。果實不大。稍呈橢圓形。色淡綠而帶紅。熟後則布滿白粉。變為深紫色。七八月間成熟。屬早熟種也。

三、黃金丸 (Early Harvest) 果中等而扁圓。表皮呈黃金色。甘味甚濃。漿液亦多。成熟期亦在七八月間。

四、紅絞 (Fameuse) 本種為美國加州有名之種類。果形圓而畧扁。全體黃綠色。有淡赤色。