

中央人民政府衛生部  
衛生教材編審委員會初審試用  
護士·助產學校合用教本

# 皮膚病及性病學

編著者 章 崔 燕 諒  
審查者 胡 傳 生  
馮 義 人

商務印書館

# 皮膚病及性病學

論生揆元人  
燕儔傳光義  
章崔胡于馮  
著者  
編者  
審查者  
審

商務印書館

護士·助產學校合用教本

# 皮膚病及性病專

章燕詒 崔備生編著

★版權所有★

商務印書館出版

上海河南中路二一一號

新華書店發行

商務印書館上海版印刷

\* (84200·2)

1953年9月初版 版面字數 101,000

印數 1—10,000 定價 ¥7,800

上海市書刊出版業營業許可證出○二五號

## 中級衛生教材序

中央人民政府衛生部在1950年8月召開第一屆全國衛生會議，確定以面向工農兵、預防為主、和團結中西醫為新中國人民衛生工作的三大原則。根據這些原則，決定實行三級制的醫學教育，並認為目前應以中級醫學教育為主。在中級醫學教育中，應以培養大量醫士為主。其次是培養助產士、護士、藥劑士、技術員等。根據此一原則和需要，在本部成立了衛生教材編審委員會，主要任務為編審醫學各科教材，審訂醫學名詞，編纂醫學辭典；並將目前編審工作的重心，放在編審中級醫學教育教材上。當即就學科性質，分成小組，分別進行編寫工作。

我們是以貫徹新民主主義文化教育政策，適合新中國廣大人民的需要，理論與實際密切聯繫，為編審方針。在具體內容上，着重預防，注意重點，要配合新學制規定的教學時數，並注意啓發學生的研究興趣。

教材中所用學術名詞，在本會名詞統一工作未完成以前，暫採用中華醫學會的醫學辭彙中的名詞；正常標準，統計數字，儘可能用中國資料；數目字在十數以上的，一律用阿剌伯數字；度量衡名稱，從中國物理學會所定。

這些教材的編者，多係各該科專門學者，根據本會所擬之教材提綱編寫，所編書稿，先由各專科學組整理後再經本會指定二人審查，然後提交編委會討論決定。這一任務是很艱鉅的。又因時間限制，需要迫切，多數編者對於新中國的中級醫學教育的經驗還不很多，故編寫教材，雖有編審方針及新定課程表可作軌範，然內容是否切合實際需要，深淺是否相宜，分量是否合度？此外，一本書有由多人執筆者，名詞及語句容有未能一致；教學計劃因更改至再，內容與課程表或不盡相符。至盼教者學者，隨時提供意見，以便再版時修訂改進，使這套教材漸臻完善。

現在這一套中級衛生教材，承各科教授於百忙中次第編寫完成，並承聘定專家詳細審查，提供意見，經最後修訂後，先後出版。各位教授，對新中國醫學教育的熱心，是值得感佩的。

圖1 敷濕敷料時所需的材料：

上：軟布，可隨意剪裁和摺疊，浸溶液後敷用；  
 碗中盛着藥水，為浸軟布之用；用以噴藥水於軟布上的  
 注射器；用以製備和計量藥水的量器；用以敷蓋軟  
 布敷料的油綢或玻璃紙；紗布繩帶。

下：用“濕閉法”敷濕敷料於前臂上手掌大的  
 患處。由皮膚向外敷算，計有摺疊浸濕的軟布、油綢  
 繡繞的紗布、繩帶三層。



圖2 患者自家刷第一層搖動劑於其右臂上。一層或者夠用，有時需二、三層。  
 細心地一處一處地照樣塗敷，直待整個患處為搖動劑覆蓋為止。



圖3 敷軟膏的方法：

上：第一步將軟膏攤於患處皮上，第二步以膏  
 刮把軟膏攤在前裁大小合宜的軟布上待敷。

下：第三步以紗布繩帶將攤軟膏的軟布仔細  
 地固定於患處。



圖4 敷“面具式”敷料的方法：

上左、上右：示第一步手續。

中：示第二步手續。

下：示第三步手續——把敷料用繩帶固定於患處。注意面具下緣的切口，可使敷料緊緊貼於胸上部之上。




圖 5 敷糊劑條於腋窩的方法。注意在條邊剪的許多小口，為的是儘量避免摺疊，好讓糊劑條緊緊的貼於皮膚之上。



圖 6 敷糊劑的軟布條於手背或拍上的方法。注意敷於指間的布條和敷於手背的布條完全是分開的。



圖7 敷棉劑條於軀幹前後兩面(包括兩臂、生殖器部、股上端)的方法。



圖8 敷棉劑條於軀幹的“游泳褲”部位。取適合此部外形的前後兩塊敷布，敷於患處，使在兩軟腰部、股上端及股內側三處彼此重疊着。





圖 9 日光晒傷(治療前): 面部水腫(眼瞼、下巴、兩頰尤顯)。



圖 10 足部接觸性皮炎: 成羣的水皰。



圖 11 神經性皮炎(新神凡納明)的皮膚剝脫。



圖 12 面部和額部呈多數性痛。膿稠，流不出來。



圖 13 頸後癰，俗名“斫頭瘡”，膿液很多，並有大塊腐組織正在腐爛。



圖 14 面部瘤型麻風：浸潤、彌散和潰爛(右鼻前孔內)。



圖 15 趾甲癆：甲呈鈎形，稱鈎甲。



圖 16 疥瘡：癰疽感染，呈膿起（身體後面）。



圖 17 臂帶狀疱疹：繼新腫凡納明發生的。



圖 18 背部呈典型接觸傳染性軟疣損害。



圖 19 維生素A缺乏症：大腿下端呈棘狀毛囊性丘疹。



圖 20 核黃素缺乏引起的陰囊皮膚角化狀。



圖 21 下肢環狀牛皮癬。



圖 22 蕁麻疹：典型風團。



圖 23 面部濕疹(結痂性)。



圖 24 毛色痣：背上部左側。





圖 25 酒渣鼻。



圖 26 頰部的母雅司,因搔抓關係,形成多數性帶菌的乳頭瘤狀損害。