

SHIYONG ZHONGCAOYAO YUANSE TUPU

实用中草药

原色图谱

(二)

花类及种子果实类

肖培根

杨世林

主编



中国农业出版社

S567-64
9044-2:2



河南农大0631574

实用中草药原色图谱(二)

花类及种子果实类



肖培根 杨世林 主编



中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

实用中草药原色图谱. 2. 花类及种子果实类 / 肖培根, 杨世林主编. — 北京: 中国农业出版社, 2001.8

ISBN 7-109-06908-7

I. 实... II. ①肖... ②杨... III. 中草药-图谱
IV. R282-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 037533 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

出版人: 沈镇昭

责任编辑 赵立山 朱朝伟

北京日邦印刷有限公司印刷 新华书店北京发行所发行

2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm × 1168mm 1/32 印张: 11.375

字数: 210 千字 印数: 1 ~ 6 000 册

定价: 56.80 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

主 编 肖培根 杨世林
副主编 连文琰 刘玉琇
编 者 连文琰 刘玉琇
林余霖 李葆莉
潘瑞乐
摄 影 刘玉琇 林余霖
顾志平 张效杰
郭绍荣 彭治章
吴光弟 郑汉臣
李延辉 高士贤
严仲铠 巫金华





序

中医中药是中华民族优秀的文化遗产，在长期实践中，形成自己独特的理论体系和诊治方法，特别是对人体的病理状态和亚健康状态能发挥出多层次、多靶点的整体治疗和调整作用，也就是通常所说的“有病治病，无病防病”的医疗防治作用。由于其疗效确切，正确使用不具或很少具有毒、副作用，因而，在“人类要回归大自然”思潮的影响下，愈来愈受到国际上的重视和青睐。

中草药则是中医用来防治疾病和医疗保健的物质基础，是中华民族几千年来与自然和疾病作斗争、经过亿万人的亲身体验所精选出来的有效武器，是一个伟大的宝库。对这个伟大宝库，一方面要很好地开发利用，另一方面又要很好地加以保护，做到资源的可持续利用。其中最为基本的，首先是要正确地去认识这些中草药，《实用中草药原色图谱》（1~4册）便是为了这个目的应运而生的。

《实用中草药原色图谱》是我们多年来对中草药进行实地调查研究的成果。全书4册，收集常用中草药总计632种。前3册主要是常用中药，《中华人民共和国药典》中的种类，基本上均已收集在内，第四册则是常用的草药180种。每种均分品名、来源、原植物、采收加工、药材性状、性味功能、主治用法以及附方等简要地叙述。

本书所收集的
的图片,真实可靠,大都均
是在产地拍摄,如实地反映了这
些中草药的生态环境,药材照片均选自
正名,具有一定的代表性。本书取名为《实
用中草药原色图谱》,希望能对读者在中草药的
利用和保护方面发挥应有的作用。同时也要严肃
地指出:在中草药的临床使用方面,必须要在医生的
指导下进行,以免产生不良后果。

总之,本书对从事中药及生物资源的生产、科研、教
学、经营的专业人员,甚至对这方面有业余爱好的人员均
是一部很好的参考书。

衷心希望广大读者对本书不吝指正。

中国工程院院士
中国医学科学院
药用植物研究所 名誉所长
世界卫生组织传
统医学合作中心 主 任

肖培根 教授

2001年2月5日



编写说明

《实用中草药

原色图谱》(以下简称《图

谱》),全书收载植物药632种,为了

鉴别和比较,全书共分四册。第一册为根及

根茎类(144种),第二册为花类及种子果实类(166

种),第三册为全草类、叶类、皮类、藤本类、树脂类、

藻菌类及其他类(142种),第四册为草药类(180种)。每

种中草药除文字描述外,均附上植物和药材彩色照片(草药除

外)。书后附有药材、原植物的药名、植物名及植物拉丁学名索引。

1.《图谱》中每种中草药均按正名(以药材名为主,个别草药则以植物名为正名)及汉字拼音,文字描述按来源、原植物、采收加工、药材性状、性味功能、主治用法、附方等项的顺序编写。

2.来源:记载该中草药所属的科名(包括科的拉丁学名)及该中草药的原植物名称或多来源的原植物名称和药用部分,如中药淫羊藿,其原植物来源有心叶淫羊藿、箭叶淫羊藿、柔毛淫羊藿、巫山淫羊藿等的全草。

3.原植物:由于植物图片及《图谱》篇幅的原因,不能全部收载;该中草药若有2种以上的多来源原植物,也只收载1~2种,如上述中药淫羊藿有4种原植物,仅收载心叶淫羊藿和箭叶淫羊藿等2种植物。

原植物项下包括原植物名称、别名、植物拉丁学名、植物形态、生境分布等内容。

植物名称:以中草药常用的原植物名称为准,如中药广豆根,原植物为越南槐。

别名:全国各地的地方名称较多,只记载常见的别名,并注明其省(区),以示不同省(区)的不同名称,对应用中草药有所帮助。

拉丁学名:除植物拉丁学名的正名外,如有常用拉丁学名的异名,则在正名后用括号或方括号加以注明。

植物形态:主要描述中草药原植物的形态特征(包括药用部分),如有并列品种,则重点记

述其与前种形态上的主要区别点。形态描述的高度、长度、宽度均采用m(米),cm(厘米),mm(毫米)。

生境分布:生境是指植物在野生状态的生长环境。了解和掌握其植物生长环境,对采集中草药有所帮助。分布也是指野生植物的自然分布区域或注明是否为栽培植物。

4.采收加工:重点记载该中草药的采收季节、采收和加工方法,以及野生品和栽培品的不同采收时间,并对某些药材简要地介绍其炮制的方法,以保证其药材质量或减轻其毒性。

5.药材性状:简要记述该中草药药用部分的外部形态特征、形状、大小、色泽、质地、断面、气味等内容的药材特征。

6.性味功能:此为中医用药的准则,先写味,后写性。功能只写该药本身的主要作用,不写与其他药物配伍后的效用。对某些有毒中草药,在此项下内,按毒性大小,写明有毒、小毒、大毒等,以便在利用时引起注意。

7.主治用法:主治一般只记载该中草药所治的主要病症,但中医治病多采用复方,故也包括某些以该药为主与其他药物配伍后的主要病症。用法:除浸酒服、研粉吞服、冲服、入胶囊吞服或入片剂服或鲜品捣汁服,以及外用鲜品捣烂外敷或干品研末撒敷或水煎熏洗等加以写明外,其余未写明用法的均为水煎服。用量是指该中草药(干品)成人每日的常用量,附方中的用量亦是如此,但不限于此量,要根据具体的病情,酌情增减。对某些中草药有其特殊作用的,也注明不宜与甘草同用,并写明孕妇及体虚寒者忌用。剂量单位:采用g(克),mg(毫克),kg(千克),或采用ml(毫升),时间单位:采用h(小时),min(分钟)。

8.附方:主要征集广大群众和医务工作者从临床实践中总结出来的简验的方药,也收载中医临床常用的方剂及有关中草药书籍。附方主治病症,中西医病名均予采用。在临床选用时,一定要结合患者病情的轻重等不同情况作为辨证论治的依据。



目 录

序

编写说明

一、花 类

1 丁香	12	16 厚朴花	42
2 木槿花	14	17 洋金花	44
3 月季花	16	18 扁豆花	46
4 西红花	18	19 莲须(附: 莲房)	48
5 合欢花	20	20 夏枯草	50
6 红花	22	21 凌霄花	52
7 茺花	24	22 梅花	54
8 谷精草	26	23 菊花	56
9 辛夷	28	24 野菊花	58
10 鸡冠花	30	25 旋覆花	60
11 玫瑰花	32	26 密蒙花	62
12 松花粉	34	27 款冬花	64
13 金莲花	36	28 葛花	66
14 金银花	38	29 槐花	68
15 闹羊花	40	30 蒲黄	70

二、种子、果实类

31 八角茴香	72	34 大风子	78
32 刀豆	74	35 大豆黄卷	80
33 大枣	76	36 山楂	82



37 山茱萸	84	61 龙眼肉	134
38 千金子	86	62 白果	136
39 川楝子	88	63 白豆蔻	138
40 广枣	90	64 白芥子	140
41 女贞子	92	65 白扁豆	142
42 小茴香	94	66 白花菜子	144
43 马钱子	96	67 瓜蒌(附: 瓜蒌皮、 瓜蒌子)	146
44 马兜铃	98	68 冬瓜子(附: 冬瓜皮)	148
45 马蔺子	100	69 冬葵果	150
46 王不留行	102	70 丝瓜络	152
47 天仙子	104	71 地肤子	154
48 木瓜	106	72 亚麻子	156
49 木蝴蝶	108	73 西瓜翠	158
50 木鳖子	110	74 肉豆蔻	160
51 五味子	112	75 肉桂子	162
52 车前子	114	76 决明子	164
53 牛蒡子	118	77 红豆蔻	166
54 化橘红	120	78 麦芽	168
55 乌梅	122	79 莞荑子	170
56 火麻仁	124	80 芸薹子	172
57 巴豆	126	81 花椒	174
58 水杨梅	128	82 苍耳子	176
59 水红花子	130		
60 石榴皮	132		





83 芡实	178	107 枳实	228
84 赤小豆	180	108 枳椇子	230
85 连翘	184	109 柏子仁	232
86 吴茱萸	186	110 枸杞子	234
87 佛手	188	111 柿蒂	236
88 余甘子	190	112 胡椒	238
89 谷芽	192	113 葫芦巴	240
90 沙棘	194	114 胡桃仁	242
91 沙苑子	196	115 南鹤虱	244
92 诃子	198	116 葶苈	246
93 补骨脂	200	117 葶澄茄(澄茄子)	248
94 陈皮	202	118 草果	250
95 青皮	204	119 草豆蔻	252
96 青果	206	120 茺蔚子	254
97 青箱子	208	121 荔枝核	256
98 刺蒺藜	210	122 砂仁	258
99 苦杏仁	212	123 牵牛子	262
100 苘麻子	214	124 鸦胆子	266
101 郁李仁	216	125 韭菜子	268
102 罗汉果	218	126 香橼	270
103 使君子	220	127 胖大海	272
104 金樱子	222	128 急性子	274
105 相思子	224	129 桃仁	276
106 枳壳	226	130 莱菔子	278

131 莲子(附: 莲心、 石莲子)	280	148 紫苏子	316
132 浮小麦	282	149 黑芝麻	318
133 益智	284	150 黑种草子	320
134 娑罗子	286	151 槐角	322
135 预知子	288	152 蓖麻子	324
136 桑椹	292	153 路路通	326
137 梧桐子	294	154 锦灯笼	328
138 梔子	296	155 榧子	330
139 菟丝子	298	156 槟榔(附: 大腹皮)	332
140 黄荆子	300	157 酸枣仁	334
141 蛇床子	302	158 蔓荆子	336
142 甜瓜蒂(附: 甜瓜子)	304	159 罂粟壳	338
143 猪牙皂(附: 大皂角)	306	160 樱桃核	340
144 楮实子	308	161 蕤仁	342
145 棕榈子	310	162 稻芽	344
146 葱子	312	163 鹤虱	346
147 葶苈子	314	164 橘红(附: 橘络、 橘核)	348
		165 薏苡仁	350
		166 覆盆子	352
药名、植物名索引	354		
拉丁学名索引	359		
参考文献	362		



1 丁香 *Dingxiang*

一、花 类

来 源 本品为桃金娘科 (Myrtaceae) 植物丁香的花蕾。

原 植 物

丁香 别名：母丁香、公丁香（通称），西里（藏语），高勒图（蒙语）。

Eugenia caryophyllata Thunb.

常绿乔木，高达10m。叶对生，叶柄长1~2cm，两侧常有下延叶基；叶长圆状卵形或长圆状倒卵形，长5~10cm，宽2.5~5cm，先端渐尖或急尖，基部渐狭至叶柄，全缘，两面光滑无毛。聚伞状圆锥花序顶生，花直径约6mm，花芳香，浓烈；花萼肥厚，绿色后转淡紫色，长管状，先端4裂，三角形；花冠白色稍带淡紫，短管状，裂片4；雄蕊多数，花丝纤细，花药纵裂；子房下位，与萼管合生，花柱粗厚，柱头不明显。浆果红棕色，长方椭圆形，长1~1.5cm，直径5~8mm，先端宿存花萼裂片肥厚，有香气。种子长方形，与果皮分离。花期6~7月。果期8~9月。

生于温暖潮湿的热带地区。

我国海南、广东、广西、云南等省、自治区有栽培。

采收加工 在9月至次年3月间，花蕾由青转为鲜红时采摘，除去花梗、杂质，晒干。

药材性状 花蕾似短棒状，长1~2cm，直径3~5mm，红棕色或暗棕色。上部花蕾球形，下部花托圆柱形，稍扁，稍显纵棱。萼筒圆柱形，有的稍弯曲，长0.7~1.4cm，直径0.3~0.6cm，红棕色或棕褐色。萼片4，肥厚。质坚实，花冠4裂，雄蕊多数；子房3室，位于花托上部。气芳香浓烈，味辛辣、有麻舌感。投入水中，花托部垂直向下（未去油）。

性味功能 味辛，性温。有温中降逆，补肾助阳，下气止痛的功能。

主治用法 用于脾胃虚寒，呃逆呕吐，食少吐泻，心腹冷痛，肾虚阳痿，小儿吐乳，腰膝酸痛，阴冷等症。用量1~3g。

附 方

- ①胃痛：丁香6g，肉桂、木香、乌药各12g。共研细粉，每日3次，每次2g。
- ②心气不足，崩漏不止，小腹寒冷、白带多：丁香、川芎各4g，熟地、白芍各3g，阿胶6g（烊化），艾叶10g，当归12g。水煎服。
- ③消化不良，急性胃肠炎而有腹痛及吐泻者：丁香、砂仁、白术、党参、陈皮、生姜。水煎服。



④慢性胃炎呃吐：丁香 3g，柿蒂 3g，党参 12g，生姜 6g。水煎服。

⑤胃寒呕逆：丁香 3g，柿蒂 6g。水煎服。

⑥小儿吐逆：丁香、半夏（生用）各 30g。同研为细末，姜汁和丸，如绿豆大。姜汤下 3~20 丸。

⑦久心痛不止：丁香 15g，桂心 30g。捣细，为散，每于食前，以热酒调下 3g。

⑧脾胃虚寒，食少吐泻：丁香、白术、砂仁。水煎服。

木槿花

Mujinhua

来源 本品为锦葵科 (Malvaceae) 植物木槿的花。

原植物

木槿 别名：木棉（河北），白槿花、苦松花（江苏、福建），朝天子（浙江），芙蓉树（广西）。

Hibiscus syriacus L.

落叶灌木，高3~4m。茎多分枝，灰褐色，嫩枝有绒毛。叶互生，叶柄长1~2.5cm；托叶线形，早落；叶菱状卵圆形，长4~7cm，宽2~4cm，通常为深浅不同的3裂，先端渐尖，基部宽楔形，边缘有不规则粗疏齿，脉三出，两面均有疏星状毛。花单生于叶腋，直径5~8cm；小苞片6~7，线形，有星状毛；花萼钟形，萼齿5，外有星状毛；花冠钟形，花瓣5或重瓣，淡紫色、白色或红色，基部与雄蕊合生，密生长柔毛；雄蕊多数，花丝连合成筒状；子房5室，花柱5，5分枝，伸出花丝筒外。蒴果卵圆形或长卵形，长约2cm，密生星状毛。种子稍扁，黑色，有白色长柔毛。花期7~10月。果期9~12月。

全国各地地区多有栽培。

采收加工 夏秋季待花初开时采摘，摊开晒干。

药材性状 花多皱缩成团或不规则形状，长2~4cm，宽1~2cm，全体有毛。花萼钟形，黄绿色或黄色，先端5裂，裂片三角形，萼筒外方有苞片6~7，线形，萼筒下常有花梗，长3~7mm，花萼、苞片、花梗均密生细毛及星状毛；花瓣5或重瓣，黄白色或黄棕色，基部与雄蕊合生，并密生白色长柔毛，花丝基部连合成筒状，包围花柱，柱头5分歧，伸出花丝筒外。质轻脆，气微香，味淡。

性味功能 味甘、淡，性凉。有清热利湿，凉血止血的功能。

主治用法 用于痢疾，腹泻，痔疮出血，白带；外用于脓肿。用量3~9g。外用鲜品适量，捣烂敷患处。

附 方

①痢疾，肠炎：a. 木槿花9~15g，水煎或研成粉服；或用植物油微炒，再加水、盐烧熟，当菜吃；晒干研粉，每日2次，每次3~9g，温开水送服。b. 木槿花6g，白头翁30g，黄柏9g。水煎服。c. 木槿花6g，生姜30g，红糖适量。水煎服。

②痔疮出血：a. 木槿花15g。水煎服。b. 木槿花、槐花炭各15g，地榆炭9g。水煎服。

③湿热白带：木槿花30g，瘦猪肉200g，加水炖，食肉喝汤。



④ 疮疖：鲜木槿花适量，捣烂敷患处，干则更换。

⑤ 烫伤：木槿花适量研粉，用植物油调敷患处。

⑥ 反胃吐食：木槿花 8g，研末，糯米汤送服。每日 2 次。

月季花

Yuejihua

来源 本品为蔷薇科 (Rosaceae) 植物月季花的花蕾或初开放的花。

原植物

月季 别名：月月花（贵州、福建），月月红（山东、江苏、浙江、上海），七月开（四川），四季春（福建），勒泡（湖南）。

Rosa chinensis Jacq.

常绿或半常绿小灌木，高0.5~1.5m。茎直立或披散，圆柱形，有粗壮稍钩状皮刺。单数羽状复叶，互生，小叶3~5，稀有7片，叶柄上生腺毛和皮刺，基部附生1枚披针形托叶，边缘有腺毛；小叶宽卵形至卵状长椭圆形，长2~7cm，宽1~4cm，先端尖，基部宽楔形或近圆形，边缘有尖锯齿；花数朵簇生；花梗长2~3cm，疏生短腺毛；总苞2，披针形，先端长尾状，有毛，边缘有腺毛；花萼5，向下反卷，羽状裂；花冠红色或玫瑰红色，重瓣，倒卵形，覆瓦状排列；雄蕊多数，生于萼筒边缘花盘上；雌蕊多数，包于壶状花托的底部，子房上位，有毛。聚合果卵圆形或梨形，直径约2cm，熟时红色。花期5~9月。果期8~11月。

生于山坡、路旁。现多为栽培。

分布于河北、陕西、山东、江苏、安徽、河南、湖北、湖南、广东、台湾及西南等地区。

采收加工 夏、秋季于晴天采摘花蕾或半开放花朵，及时摊放晾干或微火烘干（不易暴晒）。

药材性状 花蕾卵圆形或近球形，花朵圆球形，直径1.5~2.5cm，杂有散碎花瓣。花托长圆形，棕紫色，有花梗。花萼5裂，暗绿色；花瓣5，或重瓣，覆瓦状排列，长2~2.5cm，宽1~2.5cm，紫红色或淡紫红色；雄蕊多数，黄棕色，卷曲，着生花萼筒上。体轻，质脆，易碎。气清香，味淡、微苦。

性味功能 味甘，性温。有活血调经，散毒消肿的功能。

主治用法 用于月经不调，痛经，癰疽肿毒，淋巴结结核（未溃破）等；外用于跌打瘀肿，癰肿瘰癧。用量3~6g。孕妇忌服。

附方

①月经不调：鲜月季花每次15~21g。开水泡服，连服数次。

②月经不调，痛经：月季花、益母草各9g。水煎服。

③闭经：月季花30g，益母草30g，母鸡1只，把药放入鸡腹内，煮熟吃鸡喝汤，加食盐少许，连服3个月。