

臨床處方手冊

連潔羣編著

新醫書局印行

修 訂 版

臨床處方手冊

連 潔 羣 編 著

新 醫 書 局 印 行

1 9 5 3

版 權 所 有

臨床處方手冊(修訂版) 書號 0235

編著者	連 潔 羣
出版者	新 醫 書 局
發行	杭州馬市街營園弄四號
	上海漢口路六二七號
	北京宣內大街八五號
印刷者	新 醫 印 刷 廠
	杭州蕭儀巷二四號

書刊出版業營業許可證 出字第002號

1—2,000 一九五三年四月修訂初版

定價人民幣二萬四千元

凡 例

1. 本書內容包括內科、外科等八種科別，二百五十餘種重要而常見的疾病，對一般臨床醫生、中醫師及醫士可供參考之用。
2. 本書在每一疾病項下，先舉述治療要則，然後爲處方舉例，故不僅使讀者學習了處方，而且能明悉這兩百餘種疾病的治療概要。
3. 本書對於蘇聯之先進醫學經驗，亦在各該疾病之治療要則中選擇介紹；例如在胃潰瘍病下簡述了睡眠療法及封閉療法；高血壓症下簡述了溶血療法；在附錄項下介紹了組織療法等等。
4. 本書對於多種新藥（如雷米封等）在處方項下均加以說明，使讀者能進一步掌握該種藥物的應用法則。
5. 本書卷末之附錄，如配合禁忌、處方簡字釋義……等有關處方的一般智識，對讀者參考時或有幫助。
6. 本書病名藥名全部用中文，俾使絕大部份的讀者在參考時不會感到困難；但有些讀者對中文藥名恐還不夠熟悉，因此處方中的藥名仍用中外（拉丁或英文）對照。

7. 本書藥物名稱盡可能根據中華人民共和國藥典草案，藥典以外的藥物則根據通用者為標準。
8. 本書度量衡一概採用中國科學院公佈之統一名稱，在卷首又另印一頁度量衡名稱對照表，以便讀者在不夠熟悉該項統一名稱時可以根據對照。
9. 本書度量衡未註明者，液劑以毫升(c.c.)為單位，粉劑以克(gm.)為單位。例如洋地黃酞 3.0，即表示3毫升；重碳酸鈉 3.0，即表示3克。
10. 本書參考中外醫藥書籍雜誌文獻極多，難以備載，敬向原作者致謝。
11. 本書內容幾乎涉及全部臨床科目，如有錯誤，敬希讀者不吝指正。

連 潔 羣 1953.3.

度量衡名稱對照表

統一名稱		略 號	舊 名
長 度	微 米	μ	秒
	毫 米	mm	耗；公釐
	厘 米	cm	厘；公分
	分 米	dm	粉；公寸
	米；公尺	m	尺；公尺
容 量	毫 升	c.c. ml; ccm;	西西；立方公分；立 方厘；公撮；耗
	厘 升	cl.	公勺；厘
	分 升	dl.	公合；吩
	升	L ; cdm	公升；妍；立
重 量	微 克	μ g; γ (Gam- ma)	微公分；尅
	毫 克	mg.	公絲；耗
	厘 克	cg.	公毫；厘
	分 克	dg.	公釐；尅
	克	gm; g.	公分；瓦；克
	公斤；千 克	kg. ; kgm.	鈞；公斤

簡 明 等 量

1 公斤=1,000 克 (gm.)

1 升(立)=1,000 毫升 (c.c.)

1 食匙(湯匙)=15 毫升

1 茶匙=4 毫升

1 滴=0.06 毫升

目 錄

第一章 內科病處方

第一節 急性傳染

病.....1

傷寒..... 1

痢疾..... 7

霍亂.....11

瘧疾.....15

斑疹傷寒.....20

猩紅熱.....21

麻疹、風疹、水痘.....24

白喉.....26

鼠疫.....29

天花.....30

流行性腮腺炎.....32

普通感冒.....33

流行性感胃.....34

回歸熱.....40

惠爾氏病.....41

黑熱病.....42

流行性腦脊髓膜炎.....43

流行性腦炎.....47

鼠咬熱.....49

麻風.....50

狂犬病..... 51

第二節 呼吸系統

病52

支氣管炎.....52

支氣管擴張.....57

支氣管哮喘.....58

肺氣腫.....62

肺炎.....63

肺結核.....67

肺水腫.....74

肺瓜仁蟲病.....76

肺壞疽.....76

肺癌.....78

肋膜炎.....73

第三節 消化系統

病81

口內炎.....81

口頰壞疽.....84

食道炎.....85

食道痙攣.....86

食道麻痺.....87

胃酸過多症.....87

胃酸缺乏症	90
胃炎	93
胃潰瘍	95
胃癌	99
胃下垂症	101
胃弛緩症	102
胃擴張症	103
十二指腸潰瘍	105
消化不良症	105
腸炎	108
腸結核	112
闌尾炎	113
常習性便秘	115
腸出血	120
腸穿孔	122
腸疝痛	122
腸梗阻	124
斯潑盧	125
痔核	126
蛔蟲病	128
鈎蟲病	129
蟯蟲病	130
薑片蟲病	132
肝炎	132
肝硬變	134
黃疸	136
胆管炎	139

胆囊炎	140
胆石症	140
日本住血吸蟲病	141
胰腺炎	143
腹水	143
腹膜炎	146

第四節 血液及循環

系統病

貧血	147
萎黃病	153
溶血性黃疸	153
白血病	153
何杰金氏病	154
顆粒性白血球缺乏 病	154
血友病	155
紫斑病	156
心內膜炎	157
心臟瓣膜病	159
心肌炎	161
心絞痛	163
心包炎	165
雷諾氏病	166
動脈硬化症	167
高血壓症	169
低血壓症	171

動脈瘤	172	尿崩症	194
靜脈炎	173	痛風	195
第五節 泌尿生殖 系統病.....	173	肥胖症	196
腎炎	173	第八節 神經系統 病.....	198
腎結核	176	神經衰弱	198
腎盂炎	177	希司志利症	200
膀胱炎	180	偏頭痛及頭痛	201
尿毒症	182	腦充血	205
遺尿症	184	腦貧血	205
陽萎早泄	184	中風	206
遺精症	185	脊髓癆	208
第六節 內分泌腺 疾病	187	舞蹈病	210
巴錫陀氏病	187	暈船病	212
粘液性水腫	188	潛水員病	214
克汀病	189	神經炎及多發性神 經炎	214
手足搖擻症	189	三叉神經痛	216
阿狄森氏病	191	肋間神經痛	218
肢端肥大症	191	坐骨神經痛	218
侏儒症	192	神經麻痺	218
去勢病閹人病	192	癲癇	218
第七節 新陳代謝 病.....	193	第九節 維生素缺 乏病.....	220
糖尿病	193	腳氣病	220

壞血病	222	蛇咬症方	253
佝僂病	223	潰瘍處方	254
軟骨病	225	休克及虛脫	256
結膜乾燥症	225	丹毒	257
夜盲症	226	癰及癤	258
陪拉格拉	226	敗血症及膿毒症	260
營養不良性水腫	227	破傷風	261
第十節 運動器疾		脾脫疽	263
病	227	氣性壞疽	264
肌肉僵麻質斯	227	淋巴腺結核	266
肌炎	229	骨結核	267
關節僵麻質斯	230	濕疹	267
關節炎	231	帶狀疱疹	272
第二章 外科及皮膚		膿疱病	273
科處方	234	疥瘡	275
外用消炎劑	234	頭虱及陰虱	278
外用消毒劑	235	牛皮癬	279
殺昆蟲劑	239	白癬	281
外用止血劑	241	黃癬	285
外用止痛劑	242	瘰癧	286
全身麻醉劑	242	酒皰鼻	290
局部麻醉劑	244	天疱瘡	291
腐蝕劑	246	尋麻疹	293
火傷燙傷	246	癩疹	294
凍傷劑	249	癢痒症	296
		香港足	297
		毛囊炎	299

鬚瘡	300
橡皮腫	301
狼瘡	302
鷄眼	302
胼胝	304
白癬風	305
雀斑	305
禿髮	306
白髮	310
多汗症	311

第三章 花柳科處

方.....313

梅毒下疳	313
梅毒橫痃	314
第二期梅毒	315
晚期梅毒	318
先天梅毒	319
淋病	320
軟性下疳	325
花柳性淋巴肉芽腫	326

第四章 婦產科處

方.....328

妊娠嘔吐	328
子痢	330
產褥熱	332
催乳	332

產後貧血	333
子宮弛緩症	333
陣縮微弱	334
乳腺炎	335
月經過多	336
月經過少	337
子宮頸管卡他及陰道 段癰爛	338
子宮內膜炎	340
子宮癌	341
痛經	341
白帶	342

第五章 小兒科處

方.....344

腹瀉	344
脫水及酸中毒	346
嘔吐	347
便秘與痙攣	348
生齒困難	350
佝僂病	350
手足搖擻症	350
嬰兒腳氣	352
嬰兒壞血病	352
新生兒眼炎	352
新生兒臍炎	354
新生兒韋皮症	354

新生兒丹毒	354
天花	355
麻疹	355
白喉	356
破傷風	357
百日咳	358
流行性腦脊髓膜炎	361
痢疾	361
結核病	361
肺炎	362
鵝口瘡	362
腸套疊	363
腸寄生蟲病	363
腎盂炎	364
驚厥	364
遺尿	365

第六章 耳鼻咽喉

科疾病	367
外耳道炎	367
疳疔栓	368
鼓膜炎	369
中耳炎	369
乳突炎	372
內耳炎	373
聽神經炎	373
頰血	374
卡他性鼻炎	375

肥厚性鼻炎	379
萎縮性鼻炎	380
嗅覺障礙	381
上頰竇炎	382
額竇炎	383
霍森氏咽炎	383
舌炎	385
齒槽膿腫	385
水痘	386
扁桃體炎	386
咽喉炎	388
咽結核及喉結核	388
咽梅毒及喉梅毒	389

附 錄

一、處方常用簡 字釋義	390
二、處方要點及 舉例	392
三、藥用衡量制	394
四、配伍禁忌	396
五、小兒劑量計 算法	404
六、藥物服用時 間	406
七、常用磺胺類藥 物劑量表	408
八、組織療法	410
九、常用藥物極 量表	417

修 訂 版

臨床處方手冊

第一章 內科病處方

第一節 急性傳染病

傷 寒

治療要則：

(1) 絕對臥床靜養，直至退熱後一星期始可逐漸在
床上坐起。

(2) 飲食宜擇流質而易於消化者，營養高而體積小
者，少量多次給與。一般可用稀薄粥、牛乳、藕粉、豆
乳、無油之肉汁等，並酌量添加富於維生素之菜汁、桔
子汁、番茄汁等。俟退熱後可酌給半流動體。

(3) 早期應用氯黴素或金黴素（金黴素之效力遠不
及氯黴素）。在極期前開始用強心劑。

(4) 多給飲水，每日需 3,000 毫升。

(5) 水療法及醇擦浴（75% 稀醇每天擦背及四肢
1—2 次）。

(6) 對症治療。

處方舉例：

1. 氯黴素

一瓶 Chloromycetin

服法口投。

說明：傷寒患者第一次每公斤體重服 50 毫克，五十公斤體重患者則第一次服 2.5 克，以後每隔二小時服一次，每次 0.25 克，迄熱度降至常溫後之首五日，改為每三至四小時服一次。每病者平均服用總量為 19.1 克，平均服藥 8.1 日。本品為傷寒之最新特效藥，根據臨床實驗報告頗為滿意。本品為膠囊劑，每粒含藥 0.25 克。

2. 洋地黃片 0.05 4片 Digitalis tab.

上每四小時服一片（強心用）。

3. 哇巴因 0.5—2.0 Quabain

上為一次靜脈注射。本品 0.5 毫升含有 1 毫克之哇巴因，奏效較洋地黃速（心臟衰弱）。

4. 狄吉妥克辛 0.2 Digitoxin

橙皮糖漿 10.0 Syr. aurant

餾水加至 100.0 Aq. dest.

上一日三次分服，本品開始應用第一日可用 2—3 倍之劑量（心臟衰弱）。

5. 稀鹽酸 1.0 Hcl. Dilut

橙皮酊 3.0 Tct. Aurant

單糖漿 10.0 Simple Syrup.

餾水 100.0 Aq. dest.

上每兩小時服一食匙（解渴用）。

6. 稀鹽酸 1.0 Hcl. Dilut

赤葡萄酒 5.0 Rot Wein

橙皮糖漿 10.0 Sirup. Auranti

- | | | |
|---|-------|--------------------|
| 餾水 | 100.0 | Aq. dest. |
| 上每二小時服一食匙(解渴用，兼有興奮作用)。 | | |
| 7. 狄茄令 | 1.5 | Digalen |
| 烏洛託品 | 1.5 | Urotropin |
| 苦味酊 | 2.0 | Tct. Amaræ |
| 單糖漿 | 10.0 | Simple Sirup. |
| 餾水 | 100.0 | Aq. dest. |
| 上一日三次分服(預防心臟衰弱及尿路殺菌劑)。 | | |
| 8. 可拉明液 | 2.0 | Coramine Liq. |
| 維生素乙複劑 | 10.0 | Vitamin B. Complex |
| 橙皮糖漿 | 10.0 | Syrup. Aurant |
| 餾水加至 | 100.0 | Aq. dest. |
| 上一日三次分服(預防心臟衰弱用)。 | | |
| 9. 洋地黃酊 | 1.5 | Tct. Digitalis |
| 赤酒 | 10.0 | Rot Wein |
| 餾水 | 100.0 | Aq. dest. |
| 一日三次分服(同上)。 | | |
| 10. 卡代柴而片 | 四片 | Cardiazol Tab. |
| 一日四次分服(同上)。 | | |
| 說明：卡代柴而實際對心臟血管無作用，但能興奮大腦、延髓及脊髓，故可見循環轉佳。 | | |
| 11. 旁的加液 | 1.5 | Pandigal Liq. |
| 安鈉咖 | 0.3 | Caffeine S.B. |
| 糖漿 | 10.0 | S.S. |
| 餾水 | 100.0 | Aq. dest. |
| 一日三次分服(同上)。 | | |

-
12. 地芰福林液 2.0 Digifolin Liq.
 士的甯酞 1.0 Tct. Strychnine
 糖漿 10.0 S.S.
 餾水 100.0 Aq. dest.
 一日三次分服（同上，兼有激呼吸作用）。
13. 地芰他命液 1.5 Digitamin Liq.
 海葱酞 2.0 Tct. Scilla
 糖漿 10.0 S.S.
 餾水 100.0 Aq. dest.
 一日三次分服（心臟衰弱用）。
14. 卡狄司 3.0 Cardase
 洋地黃酞 1.5 Tct. Digitalis
 橙皮糖漿 10.0 S. Aurant
 餾水 100.0 Aq. dest.
 一日三次分服（同上）。
15. 可阿古連液 5.0 Coagulen Liq.
 糖漿 10.0 S.S.
 餾水 100.0 Aq. dest.
 上每次一食匙，一日三次（腸出血用）。
16. 斯替普替新片 六片 Stypticin Tab.
 上每日三次，每次二片（同上）。
17. 阿片酞 1.0 Tct. Opium
 顛茄酞 1.0 Tct. Belladonna
 苦味酞 2.0 Tct. Amarae
 餾水 100.0 Aq. dest.
 一日三次分服（同上，須密切注意是否有鼓腸之