

肉

杏

所

藏

江蘇古籍出版社

陳氏小兒病源方論

千金寶要

嚴氏明理論

千金寶要

江蘇古籍出版社



四庫未收書提要

學經室外集卷二

千金寶要六卷提要

唐孫思邈原本宋郭思采錄刻石案舊唐書思邈本傳止載千金方三十卷葉夢得避暑錄話稱其作千金方時已百餘歲後三十年又作千金翼方郡齋讀書志書錄解題並載兩書云各三十卷今俗間傳本千金翼方九十三卷兩書淆混不復可別不知何人所定也郭思刻石在宋宣和間其所依據當是思邈原本刻石在華州公署明正統景泰間又重刻石本又有本刻本至隆慶時耀州真人祠復有石刻案酉

陽雜俎謂昆明池龍宮有仙方三十首思邈以療龍
疾得之乃著千金方三十卷每卷置一仙方信為方
書中之最可寶貴者書中稱痘瘡為小兒丹毒卽元
人奇効良方所謂痘疹也或謂此疾出自近代者殆
不可從今從石本錄副以備唐人方書之厓畧云

此書初得華州石刻舛謫最多繼得華州木刻及蜀中及郭武定木刻其謫猶華之石刻也其門類錯亂者茲皆類明拾遺一段茲皆附之各類小兒兩類併而為一為其便于檢閱也其間有字句之謬可以意會者乃敢更之中有文字高古不能讀者不敢輒易乃仍舊焉自千金論起至若有所舉重段止似欲人知所避忌也自五勞七傷有小腹急痛起至婦人新產上廁段止既無治法又無令人避忌之意自五勞段數至第二十二段中有凡是病者皆須服之之句後淋閉論末又云悉服之立驗或亦萬病玉壺各有所主也因併及之

委官李海立

生員謝沾書

祔祠鄒鳳臯刻

千金寶要目錄

婦人第一

小兒第二

中毒第三

飲食中毒第四

解百藥毒第五

蛇蝎等毒第六

喉痺金瘡第七

瘡疽癰腫第八

霍亂吐瀉第九

虎犬馬傷第十 針折入肉附

舌耳心目等大小便第十一

中風大風水氣第十二

瘧痢癰等第十三

頭風吐逆第十四

疫瘴濁淋第十五

頭面手足癰瘰瘡漏第十六

痔第十七

論

千金須知

千金寶要目錄終

千金寶要卷之一

婦人第一

妊娠難產燒車軋脂內酒中服亦治腹中痛并欬嗽
妊娠忽苦心腹痛燒鹽令赤熱三指撮酒服之立產
又方吞槐子二七箇

又方菟絲子或車前子以酒或米汁服方寸匕即生
又方水或酒服家中黑塵

子死腹中及小難橫生倒生難生者半夏白斂各二
兩末之服方寸匕亦可加代赭瞿麥各二兩佳小
難一服橫生二服倒生三服子死四服

又方榆白皮細切煮三升服之

子死衣不出上搶心者急取蟻垤土三升熬之令熱
囊盛熨心良

又方末竈突中墨三指撮水或酒服之

乳無汁者土瓜根末之一服半錢匕日三

衣不出及橫生逆生者小麥小豆煮濃汁飲立出

產三日不出者燒大刀鐶以酒一盞沃之頓服

又方燒藥杆令赤內酒中飲之救死不分挽者

產乳暈絕者製了半夏一兩末之丸如大豆內鼻孔

中愈

又方神麴末水服方寸匕

又方含醎醋嚥面

子死腹中牛屎塗母腹上立出

胎死腹中服水銀三兩立出

未足月而胎死者以苦酒濃煮大豆一服一升死胎立出

妊娠時疾子不下竈中黃土水或酒或泔清調塗臍方寸乾再上

又方酒服車轄脂

又方菹白一把水三升煮熟食菹令盡亦安胎胎死者即出

妊娠中蠱燒敗鼓皮酒服方寸匕

妊娠傷寒菹白十莖生薑二兩切水三升煮去半服

取汗

產後血不盡煩悶搗生藕取汁飲二升良

產後腹脹痛者煮黍粘根為飲一服即愈

五色帶下者煮鰾帶汁服一盃良

月水不斷灸內踝下白肉際青脉上隨年壯

又方服地黄酒良或大豆服亦佳

月水不利及無子灸四滿三十壯穴在丹田兩邊相

去各一寸半丹田在臍下二寸

漏下積年因篤者取鵲重巢燒灰末之服方寸匕日

三服三十日愈重巢者連二年鵲產其上者是

產後月水往來多少不定或不通痛小腹急腰身重

白馬尿一升服之良

逆生橫生者竈下黃土三指撮酒服立出

小兒第二

凡小兒生下不啼者取兒臍帶向身却將之仍呵之
百度亦可以菰白鞭之

浴新生兒以猪膽一箇汁入湯中令兒無瘡疥

小兒生輒死者便覷兒口中懸癰前上脣有胞者急
以指摘取頭決令潰去血勿令血入咽入咽即殺
兒慎之

小兒臍不合燒蜂房灰末傅之

小兒中風口噤雀屎如麻子丸之飲下即愈

兒生三日內朱蜜多則生陰癰朱蜜三日內通得用
三豆許朱蜜後與牛黃亦三豆許除兒百病牛黃
後可與米飲研米作厚飲如豆大與兒三豆許止
日二七日後方哺乳

小兒解顱熬蛇脫皮末之和猪頰車中髓傳頂上日
三四

小兒肚皮卒然青黑以酒和胡粉傳上若不急治須
臾便死

又方灸臍左右上下各半寸並鳩尾骨下一寸凡五
處各三壯

小兒暴脹欲死半夏隨多少微炮之為末酒丸如粟

米大日三

小兒丹毒搗慎火草絞取汁塗之

小兒赤遊腫若徧身入心腹殺人搗伏龍肝為末以雞子白和傅之乾易之

又方白豆末水和傅之勿令乾

又身赤腫起者熬米粉令黑以唾和傅之

小兒傷寒發黃搗土瓜根汁三合服之

又方搗青麥汁服之

又方搗韭根汁澄清滴兒鼻中如大豆許即出黃水差

小兒霍亂研尿滓乳上服之

又方牛涎灌口中一合

小兒客忤吞麝香大豆許立愈

又方以母月衣覆兒上大良

又方取牛鼻津服之

又方取牛口沫傅乳頭飲之

又方取熟馬屎一九絞取汁飲兒下便愈亦治嘔啼

面青腹強者

小兒誤吞針取磁石如棗核大吞之或含之其針立
出

誤吞鐵物等艾蒿一把剉以水五升煮取一升半服
之即下

誤吞髮亂髮燒灰酒服一錢

吞錢艾蒿五兩以水五升煮取一升頓服之即下

又方末火炭酒服方寸匕水服亦得

又方服蜜二升即出

吞金銀釵鏤白糖二斤一頓漸漸食之多食益佳

又方吞水銀一兩再服之

吞鏤及指強燒鴈毛二七箇末服鵞毛亦得

吞釵暴韭令萎蒸熟勿切食一束即出或生麥葉筋

縷如韭法皆可用但力意多食自消

吞銅鐵而哽燒銅弩牙令赤內酒中飲之立愈

吞釘針及箭簇等但多食脂肥肉令飽自裹出