

兒童
自然生活百科

蜻蜓



蜻蜓

蜓

中央研究院動物研究所

所長 張崑雄

中央研究院植物研究所

所長 鄭宏潘

國立臺灣大學植病系

楊平世

國立臺灣大學植物系

鄭元春

聯合審訂

聯合校訂

停在草上的蜻蜓



0000037799

803209



▲每年的四、五月時，蜻蜓就出現在池塘上或水邊。

► 在池塘上飛翔的雄蜻蜓。

雄蜻蜓在池塘和水田邊，擁有自己的地盤。牠在那個固定的地方，等候雌蜻蜓到來，如果別的雄蜻蜓闖進去，牠就會撞擊對方的翅膀，將牠趕走。牠們的地盤大小不一，通常長約三十公尺，寬十公尺。

雄蜻蜓收起長長的腳，
在池塘上，來回地巡邏著，
大眼睛骨碌碌地四處張望，
「這是『我的』地盤，可要好好地保護。」
嗯！飛來一隻雄蜻蜓了，趕快迎上去；
於是翅膀和翅膀相撞了，展開一場激烈
的空戰；最後敵人終於被趕跑了。
哼！這麼好的地盤，誰都甭想侵佔。

* 親愛的家長和老師
當你要回答子女或學生的問題，或對他們講解時，請多
利用插圖的解說。









夏天的早晨，
雄蜻蜓終於遇到雌蜻蜓；
牠彎起腹部末端，
抓住雌蜻蜓頭部的後面，
開始舉行「結婚典禮」。
連在一起的雌、雄蜻蜓，
選了株浮在池上的水草，
停了下來。雄蜻蜓抓穩草，
雌蜻蜓就將長尾巴的末端，
靜靜地放入水中，
一個、兩個、三個……，
牠在池中的水草上，
產下了很多很多的小卵。

▼蜻蜓的卵 (→)


卵被產在水草上，長約2公釐，寬0.4公釐。



◀正在產卵的蜻蜓。

雄、雌蜻蜓一連在一起，雌蜻蜓就會從腹部末端將卵產在水草的莖上。照片上前者是雄蜻蜓，後者是雌蜻蜓。

▼在那裏，蜻蜓的稚蟲形成了。再隔不久，從殼的外面，就可以看見裏面稚蟲的眼睛了(→)。



放大倍率30倍

水草上的卵，已經產下好幾天了，
蜻蜓的小寶寶，正在卵裏慢慢長大。
透過白色的卵殼，可以模糊地看到牠的眼睛。
不多久，蜻蜓的小寶寶，就要出生啦！

但是從卵裏出來的，
是一隻沒有翅膀、沒有腳、像蝦一樣的小蟲。
等再脫掉一層皮後，牠仍然沒有蜻蜓的模樣。
你看！只是一隻六隻腳的小蟲。

只要水一開始溢漾，小稚蟲就像要被沖走似的，
也好像會被大肚魚一口吃掉。



2




3

從卵孵化出來的稚蟲。

卵產下十七、八天之後，即開始孵化。當卵袋一破裂，形狀像小蝦子般的小蟲，就扭動著身體出來了。這時期稱為前稚蟲。前稚蟲從卵裡出來後，又立刻脫掉包著身體的另一層薄皮，伸出腳來，然後像游泳一樣，離開這塊脫掉的皮。稚蟲誕生的過程就是如此。(照片從國到園上)

剛出生的蜻蜓稚蟲，體長約三公釐左右，有六隻腳，形狀不像蜻蜓，看來只是一隻小蟲而已。



4



▲生活在水中的稚蟲。

圖中顯示，牠的腹部還沒有完全長成。



▲成長中，身體顏色變成稍呈棕色的稚蟲。

這時，頭部仍然很大，而且翅膀也還不顯著。

蜻蜓的稚蟲住在池塘裏，有很多小鄰居。
牠們互相吃來吃去，才能長大；蜻蜓的稚蟲長大了。
你看！牠的大眼睛，不是很像蜻蜓了嗎？
稚蟲出生後，會脫落好幾次皮，
每脫一層，身體就長大一點。
脫掉了那層繩緊的外皮，
稚蟲那白白又嫩的身體，就又長大了一些。
在夏天的池塘裏，
稚蟲已經長大得能夠將大肚魚吃掉啦！

稚蟲的脫皮

稚蟲長大後，就將身上那層繃緊的表皮脫掉，身體也跟著變得更大。一般，稚蟲必須脫皮九次，才可以成為蜻蜓（成蟲）。但是，在這段稚蟲時期，雖然能脫皮，但每次都只長大一點而已，且身體的形狀並沒有顯著的變化。

照片中是脫第七次皮的稚蟲，在已脫下皮的白稚蟲背上，可以看見小小的翅膀



水草低下，稚蟲正在等待獵物。

大肚鱂魚游過來了。

當牠靠近稚蟲身旁時，

稚蟲就向牠的尾巴噴出水，

像火箭一樣地噴出去。

並且伸出長長的下顎，

很快地向大肚鱂魚襲過去。

►正在攻擊大肚魚的稚蟲。

當獵物靠近的時候，稚蟲就將藏在頭下的長形器具


狀下顎，很快伸出，抓住獵物。稚蟲是一種肉食性

昆蟲，喜食活生生的小魚或者其他昆蟲。









稚蟲能在很短的時間內，
將獵物捉住。

牠那細長的下顎前部端
有兩支銳利的鉤子，
可以一容易地咬住大肚魚。
大肚魚跑不掉啦！稚蟲
蠕動著嘴巴，慢慢地吃。

稚蟲是在池塘裏，
吃好鄰居的壞蛋。
如果小池塘裏稚蟲太多，
食糧就不夠了。雖然，
稚蟲的技術很高明，
但是，如果沒有食物，
牠們也會餓死。

可是不用擔心，
蜻蜓爸爸已經把別的蜻蜓趕走了。
牠的爸爸怕別的蜻蜓
跑來產卵，使池塘太擠了，
所以下經常辛苦的來回巡邏。

►正在吃大肚魚的稚蟲。

稚蟲用牠那可以左右活動的下唇，正在吃
牠抓到的獵物——大肚魚。

▼正在吃泥鰌的龍蝦。


池塘裏也有龍蝦和鼓蟲；其中，龍蝦不但可以在水中游來游去，而且也能在空中飛翔。





▲龍蝨幼蟲的頭部。

牠先用銳利的人類來刺獵物，然後再吸食
獵物體內的液體。



▲抓到小魚的紅娘華。

紅娘華（蠍椿）用針狀的口器吸食獵物的
體液，牠和椿象同類。

生活在池塘裏的壞蛋，不只是蜻蜓的稚蟲而已。像「龍蝨」也常攻擊衰弱老弱的泥鰌，泥鰌往往很快就被吃掉，只剩下一堆骨頭。龍蝨藏在水草裏，用銳利的大顎刺殺獵物，然後吸取牠身體內的液體。另外，紅娘華也用牠像鎌刀般前肢，和針一樣的利嘴來襲擊獵物。在秋天的池塘裏，各式各樣的小生物們，就這樣過著你吃我、我吃你的生活。牠們必須趕在冬天來臨前，多吃一點食物好過冬。



冬天來了，
池塘的水已經結冰；
把腹末露出水面呼吸的龍蟲
和紅娘華，再也不能在這裏
生活下去了。

牠們早就在冬天來臨前，
就離開池塘，
躲進草叢裏的枯葉下，
準備度過漫長的冬天。
蜻蜓的稚蟲卻仍留在池塘，
因為牠們有從腹末吸水，
然後利用位於腹內的直腸腮呼吸的本事。
在池底的泥土裏，
住著好多的蜻蜓稚蟲。
牠們不吃任何東西，
只是靜靜地等春天降臨；
當溫暖的春風開始吹送時，
池裏的老鄰居都回來了。
這裏的春天比起原野上的
春天是要來得早些。

◆結了冰的池塘。

在水面上呼吸的龍蟲和紅娘華，一到冬天
就離開水面，鑽進枯葉或土裏冬眠。