

浮腫病中醫簡易方選

(內部資料 注意保存)

中醫研究院學術秘書處編審室 編

人民衛生出版社

編輯說明

一、本書是治療浮腫病的中醫方選編。所選各方本着簡便易行、安全有效的原則，從各種中醫藥文獻及各地資料 200 餘種中選出的。其中包括藥療與食療、熏浴、針灸、按摩等。

二、藥療與食療部分，有些方名是文獻中原有的，有些是我們擬訂的，並按照各方的藥性，大體分為平、涼、溫三類。不少原方的分量、用法、主治等記載不全，我們也根據有關文獻，結合實際經驗，予以必要的增訂。

三、煎藥的用水量，一律改用毫升為單位（每 500 毫升淨水，約重一市斤）。

四、每方之後，列有備考，說明該方的出處、藥性和應用注意事項，並附記一些類似處方和變通用法，以備參考。

五、書中引用的各本草書，一般都用了簡稱；各方的出處，有的直接寫出，有的以簡號代替（如（青 1）系《青海中醫驗方匯編》的簡號）。書末附有簡稱簡號表，可供檢索。

六、這些醫方，都比較平穩，對於病情簡單的病人，可作為通方；對於病情複雜的病人，亦可供辨症施治時，從中選加藥味。

七、本書由我院學術秘書處編審室主編，有我院中醫研究所、內外科研究所及針灸研究所參加編輯；並承北京中醫學院提供了一部分有關資料。審校人為朱顏、王雪苔。編輯人為耿鑑庭、冉小峰（藥療與食療、熏浴）、趙爾康（針灸）、盧英華、柳文儀（按摩）等。由於水平所限，難免疏漏，敬希讀者指正。

中醫研究院學術秘書處編審室

1961 年 6 月

目 录

一、药疗与食疗 1

(一)平性方类 1

1. 茯苓糕..... 1
2. 苡仁粉..... 1
3. 山丹粉..... 2
4. 荷叶散..... 2
5. 西瓜蒸大蒜..... 2
6. 苦瓠大枣丸..... 3
7. 陈瓢汤..... 4
8. 葫芦丹..... 4
9. 黄豆根茨汤..... 5
10. 甘草黑豆丸..... 6
11. 附子煮绿豆..... 7
12. 蚕豆壳茶..... 7
13. 芝麻稽汤..... 8
14. 麦芒汤..... 8
15. 蕎麦稽丸..... 8
16. 米泔汤..... 9
17. 五爪龙汤..... 9
18. 玉蜀黍须茶..... 10
19. 棕箬灯心散..... 10
20. 炒茄叶..... 10
21. 醋煮海带..... 11
22. 白朮澤泻丸..... 11
23. 猪苓粉..... 12

24. 車前菰蓉丸..... 12
 25. 篇蓄餅..... 14
 26. 沙棠果..... 14
 27. 李核仁茶..... 14
 28. 柑皮散..... 14
 29. 营实茶..... 15
 30. 桑椹酒..... 15
 31. 榆皮粥..... 16
 32. 梧桐花茶..... 16
 33. 槿花茶..... 17
 34. 郁李仁餅..... 17
 35. 金櫻子湯..... 18
 36. 兩赤羹..... 18
 37. 阿胶蛤粉丸..... 19
 38. 麻茅羹..... 20
 39. 炖慈烏..... 20
 40. 酉亥散..... 21
 41. 三骨粉..... 21
- ### (二)凉性方类 22
42. 絲竹茶..... 22
 43. 炙王瓜..... 22
 44. 蒸冬瓜..... 23
 45. 麦門冬湯..... 24
 46. 萱草散..... 25
 47. 丹溪香附丸..... 25

48. 淫羊藿湯·····	26
49. 益母汁·····	26
50. 葵子茯苓散·····	27
51. 蜀葵散·····	27
52. 苧麻根湯·····	27
53. 茅根茶·····	28
54. 鴨跖草茶·····	29
55. 薇藿羹·····	30
56. 通草茶·····	30
57. 金沙六一散·····	31
58. 桑皮赤豆湯·····	31
59. 桑葉茶·····	33
60. 柳葉茶·····	33
61. 檳皮茶·····	33
62. 楮葉膏·····	34
63. 螻蛄散·····	34
64. 蒸田螺·····	35
65. 蛙鼓湯·····	36
66. 野鷺羹·····	36
67. 鴨頭丸·····	36
(三)溫性方類·····	37
68. 紫蘇湯·····	37
69. 姜皮湯·····	38
70. 蒜皮湯·····	38
71. 蘿卜浮麥湯·····	38
72. 蒸胡蘿卜葉·····	39
73. 薯蕷糊·····	39
74. 番瓜粉·····	40
75. 棉根湯·····	40

76. 黃芪粥·····	41
77. 深師龍丸·····	41
78. 白朮紅棗丸·····	42
79. 蒼朮蕲艾煎·····	42
80. 菊芽酒·····	43
81. 馬蘭酒·····	43
82. 防己澤蘭散·····	44
83. 蓼花湯·····	45
84. 紫藤花糖茶·····	45
85. 椰子漿·····	45
86. 糖木瓜·····	46
87. 松針水·····	46
88. 柏葉饅·····	47
89. 糖拌香椿腦·····	47
90. 椒苓丸·····	48
91. 烏柏湯·····	48
92. 牡荊子粉·····	49
93. 大腹皮湯·····	49
94. 五加皮糖茶·····	50
95. 五皮丸·····	50
96. 五苓丸·····	50
97. 玄武丸·····	51
98. 參附丸·····	52
99. 濟生腎氣丸·····	52
100. 復方河車粉·····	53
101. 血余粉·····	53
附: 隨症選方·····	53
二、熏浴療法·····	58
1. 黍莖浴湯·····	58

2. 紫苏叶浴湯·····	58
3. 茅香藿香洗方·····	58
4. 排草洗方·····	59
5. 石菖蒲浴湯·····	59
6. 杏叶浴湯·····	60
7. 杉木刨花洗浴法·····	60
8. 樟木浴湯·····	60
9. 石楠叶雪洗法·····	60
10. 桐叶浴湯·····	61
11. 楓叶浴湯·····	61

12. 五枝水熏法·····	61
----------------	----

三、針灸療法·····62

(一)針灸·····62

(二)梅花針·····62

四、按摩与捏脊療法 ····63

(一)按摩·····63

(二)捏脊·····65

附：簡称簡号檢索表 ····67

一、葯疗与食疗

(一) 平性方类

1. 茯苓糕

〔处方〕 連皮茯苓一斤

〔用法〕 研末，酌加米糠粉取粘，水調，用模制成糕块，每重2錢，日服2—3块。

〔主治〕 浮腫，神疲乏力，記憶力減退，心慌易惊，夜寐不适，多梦，胸脘不暢，小便少等症。妊娠浮腫者，服之且能安胎。

〔备考〕 茯苓，甘平无毒。《本經》謂其治忧悲惊邪恐悸，利小便，可久服，能养神。《別录》謂其开心益智，止健忘，安胎。洁古謂其和中益气。《綱目》謂茯苓皮主治水腫肤脹。

亦有用帶皮茯苓一两，煎湯內服治浮腫者，据謂效果甚为滿意(蒙1)。

2. 苡仁粉

〔处方〕 薏苡仁一斤

〔用法〕 微炒至黃色，研末，每服2—3錢，溫开水調服，每日2—3次。亦可水泛为丸，或和入粥中吃。

〔主治〕 浮腫，脾肺兩虛，咳嗽，便溏，四肢拘攣，腿部沉重，麻木等症。

〔備考〕此方出于《增訂醫方易簡》卷七。《綱目》亦載有煮粥消水腫之方。《本經》謂苡仁能治筋急拘攣，不可屈伸。《別錄》謂其能消水腫。《綱目》謂其能健脾益胃，補肺，去風濕，利小便。但孕婦忌服。

3. 山 丹 粉

〔處方〕山丹一斤

〔用法〕蒸熟晒干，磨粉加糖調服。每日1—2兩，分2次服。

〔主治〕浮腫，心神不寧，或悲傷欲哭。亦可用于婦女崩中漏下。

〔備考〕此方在浦口、六合一帶，常用以治腫。

山丹即紅花百合，《別錄》謂百合能除浮腫。若用白花者更好。

4. 荷 葉 散

〔處方〕干荷葉

〔用法〕燒存性，研為細末，每用2錢，以稠米湯半碗調服，1日3次。

〔主治〕浮腫，頭暈，頭疼或有諸般出血者。

〔備考〕此方出于《証治要訣》。

荷葉，味苦性平，無毒。《綱目》謂其能消水腫，又能治諸血症。

5. 西瓜蒸大蒜

〔處方〕西瓜一個 大蒜十頭

〔用法〕西瓜在近蒂處切去一片，納入大蒜（去皮或先搗

碎),仍用原来瓜皮盖上,封好蒸熟。取熟蒜与瓜瓤同吃,其汁亦可頻飲。一瓜可服2—3日。

〔主治〕 浮肿,小便少,气悶,食欲不振,消化不良等。

〔备考〕 此系江浙一带农村常用之单方。《嘉善叶氏医話》曾有記載。

西瓜甘寒,能肃肺利尿;大蒜辛溫,能溫脾化水,二物并用,頗得制方之妙。

大蒜与瓜瓤同食之法,文献記載甚多(甘2)、(冀2)、(晋2)、(滬3)、(辽1)、(辽3)、(蒙2)。亦有在蒸时加姜片作盖者(辽3);有去瓜食蒜者(皖1)、(京8);有仅飲瓜內之汁者(閩8);有蒸后煨干为末每服三錢者(閩5);有于大蒜之外,更酌加砂仁者(冀10)、(苏3)、(苏10)、(滬1)、(滬2);尚有配合茅根者(見茅根条)。亦有用干西瓜皮一两,蒼朮五錢,研末,每服3錢,每日2次,治疗水肿者(豫2)。

《串雅內編》治水肿則单以西瓜一味,燒灰为散服之。

6. 苦瓠大棗丸

〔处方〕 苦瓠瓤(亦可連壳用)二兩 生枣肉一兩

〔用法〕 瓠瓤焙干为末,枣肉为丸。每服2錢,日服2次,用开水或粥湯送服。

〔主治〕 浮肿脾虛,小便不利,或皮肤发黄。

〔备考〕 此方出于《千金方》。《圣惠方》中不用大棗,《綱目》亦引有类似之方数則,方法大同小异。

苦瓠苦寒。《本經》謂其能治面目四肢浮肿。枣性偏溫,能益脾补气。《綱目》又有苦瓠配合葶藶子为丸之法,适于浮肿肺气壅塞者。又夏季浮肿患者,食不苦之瓠,亦大有裨益,《藤翁医稿》曾載苏北一带常用此方。

7. 陳 瓢 湯

〔处方〕 陈葫芦瓢一个

〔用法〕 每用5錢—1兩，加水600毫升，煎取200毫升，每日早、晚分2次溫服，可以連續服用，以愈为度。

〔主治〕 治浮腫而兼腹脹或兼有虫积者。

〔备考〕 此方原見(京5)，有滄县中医采用，据說效果极佳。

瓢，甘平无毒，李时珍謂其能消脹又能杀虫。

附：类似治肿三方，录以备参：

1. 陈葫芦瓢一个，炙热糯米酒浸之，再燒存性研末，每服3錢(《余居士选奇方》)。

2. 葫芦匏壳燒灰存性研末，每用2錢，酒冲服(閩4)。

3. 葫芦瓢、生姜同煎服(鄂1)。

8. 葫 蘆 丹

〔处方〕 葫芦一个(必須去蒂)

〔用法〕 焙干研末，每次1—2錢，开水吞服，日服2次，或制为丸用亦可。

〔主治〕 浮腫而有腹脹者。

〔备考〕 葫芦，甘平滑无毒。陶弘景謂其利水道。《綱目》引《簡便方》治黃胖腹脹，用亚腰葫芦、連子燒存性，每服1个，食前白湯下，能飲酒者亦可酒下，据云十余日即見效。(贛1)亦載此方，亦有再加紅糖同服者(苏3)。涿鹿县郝大夫經驗，用葫芦末开水吞服，則更簡便。

用酒送服之法，文献記載極多。《医林改錯》即有葫芦酒方，今經邢台县某保健所試用数例，均获痊愈(冀2)。其法

以黃酒煮葫蘆外壳，去渣飲酒，亦可用葫蘆研末，黃酒送服。

附：类似之法三則，录以备參：

1. 古葫蘆研末冲酒服(桂2)。
2. 葫蘆去蒂留瓢，入好酒，再将原孔盖緊，隔湯煮三、四沸，傾出，但飲其酒(閩1)。
3. 葫蘆一个，搗碎，酒一斤，浸7昼夜，随量飲(苏6)。

9. 黃豆根莢湯

〔处方〕 黃豆根 豆莢壳各二兩(切)

〔用法〕 加水 600 毫升，文火煎取 200 毫升，去滓，加紅糖五錢，烱化。每日早晚分 2 次溫服。

〔主治〕 脾虛浮腫。

〔備考〕 此方原見(閩3)，但未注明何豆。我們認為以黃豆為佳。同書尚有一方，用豆莢壳、匏壳、芥菜槁各一两，煎服，对于脾虛濕勝而尿短，肺逆氣浮而喘咳者，頗為合宜。亦有單用黃豆槁四至六兩煎服者(閩7)。

附：用豆腐諸方，录以备參(其配合梧桐叶者，參梧桐花茶条)：

1. 薺菜煎豆腐 薺菜四兩(洗淨切碎)，豆腐四块，加油同煎作菜食。治浮腫，眼目昏花作痛，胸腕不舒，胃納不佳，此方原見(魯6)。

薺菜，甘溫無毒。《別录》謂其能利肝和中，《日華》謂其能根治目痛，《綱目》謂其能明目益胃。

2. 茄秸煮豆腐，名為大豆煎(黑1)。

3. 灯心豆腐湯(閩1)。

尚有用黃豆諸方，茲不备引。如条件許可，單用作食餌疗法即可，故配合藥品者，概从略。

10. 甘草黑豆丸

〔处方〕 甘草一錢 黑豆二兩(炒熟)

〔用法〕 研末，水泛丸，1日分3次內服。或将黑豆微炒，同煎濃汁，頻頻飲服，并食其豆。

〔主治〕 浮腫而疲乏脚軟，或疫病后浮腫，或因誤食有毒的食物而起之浮腫。

〔備考〕 此方原見《夷堅志》。《綱目》亦載此方，治疫癘發腫。

河西走廊，冬春之間常有誤食有毒野菜而浮腫者，1960年本院医疗队曾用此方治療而見效。

甘草，甘平無毒，功能解毒和中。

黑大豆，甘平無毒。《別錄》謂其逐水脹，除癰去腫。《唐本草》謂煮食治溫毒水腫。陳藏器謂煮食性寒，下熱氣腫。孟詵謂煮食治筋攣，膝痛，脹滿。《綱目》謂治腎病，利水下氣。《是齋百一選方》有黑豆煮熟晒干，研末內服治腫之法。《綱目》則以之治療身面浮腫。《外台秘要》引范汪療久腫新腫方及千金大豆煎，均是用豆煮汁加酒再煮服。亦有煮后加紅糖者(閩11)。

附：類似二法，錄以備參：

1. 浮腫方 用烏豆一兩，蒜頭梗一枝，加水酒燉服(中醫研究院中藥研究所在福建南平采風所得)。

2. 治營養不調虛腫，用烏豆一兩，芝麻七錢，焙附子三錢，先將烏豆浸童便一夜，芝麻炒焦，再加附子合研為末，每日2次，早晚空腹，各服3錢(粵1)。

11. 附子煮綠豆

〔处方〕 大附子一枚 綠豆二合半(約二兩)

〔用法〕 附子去皮脐，切作两片，加水 600 毫升共煮，空心卧时食豆；次日将原附子 2 片改作 4 片，再加綠豆 2 合半，如前煮食；第三日別用附子綠豆如第一日法；第四日則如第二日法。

〔主治〕 浮腫，体本虛寒而外有浮热者。

〔备考〕 此方原出于《朱氏集驗方》，謂治十种水气。

綠豆，甘寒无毒。《开宝》謂煮食消腫下气。孟詵謂其补益元气，和調五脏。《綱目》謂其利腫脹。此方配合附子之辛热助阳，但去附食豆。另有一配合紅豆之法(詳見桑皮赤豆湯条)，則是去豆用附，均是一阴一阳，頗合机宜，使其阳中有阴，阴中有阳。此法取附子之气，綠豆之形，使其阴多于阳。赤豆方則取紅豆之气，附子之形，使其阳重于阴。

倘有大禹粥治疗水肿，用綠豆、蜂蜜、去皮大蒜各四两，先将綠豆煮烂，再入大蒜，最后放蜜，熬成稠粥服(辽 2)。

12. 蚕豆壳茶

〔处方〕 蚕豆壳五錢 紅茶叶二錢

〔用法〕 泡茶飲，或用火略煮亦可。

〔主治〕 此为江都农村常用之方，見耿光奇《勒立堂診余札記》。

附：下列三方，录供参考：

1. 蚕豆眉五錢(即蚕豆內衣上的肿脐)煎服(浙 1)。
2. 蚕豆、干葫芦、紅糖同煎服(贛 2)。
3. 蚕豆一两，陈香櫞一个，紫苏梗五錢，煎水兌紅糖服。

既能消腫，又可舒中達表(湘1)。

13. 芝 麻 結 湯

〔處方〕 芝麻結(一名油麻槁)二兩(也可逐漸加至四兩)

〔用法〕 加水 600 毫升，煎取 200 毫升，每日早、晚 2 次溫服。

〔主治〕 浮腫。

〔備考〕 此方原見(魯6)。

附：類似三法，錄以備參：

1. 干油麻根、陳旧葫蘆匏皮，同煎服(閩3)。
2. 芝麻梗、蒜頭梗、旧匏壳，同煎服(閩4)。
3. 油麻槁、茯苓皮、灯心草各一两，旧匏壳二片，紅飯豆一两，水煎服(閩7)。

14. 麥 芒 湯

〔處方〕 大麥芒二錢 白糖五錢

〔用法〕 將大麥芒焙黃，加水 300 毫升，煎三沸去滓，入白糖和勻，每日早、晚分 2 次溫服。

〔主治〕 浮腫及水脹、氣脹。

〔備考〕 此方原見(甘2)。亦有不用白糖者(蘇1)、(蘇6)。

附方：大麥糠二至三兩，用沸水一碗泡，澄清去渣，再煮一沸，服 5—7 日，一般即能消腫(蘇8)。

15. 蕎 麥 結 丸

〔處方〕 蕎麥秸一斤

〔用法〕 炒後研細，水泛為丸，每次用 2—3 錢，開水吞

服，亦可用黃酒吞服。

〔主治〕 浮腫，頭疼，胸悶氣阻，腹中作脹，女子帶下。

〔備考〕 此方原見(魯6)。

16. 米 泔 湯

〔處方〕 二道淘米水

〔用法〕 煮沸當茶喝。但須注意：在第一道(次)淘米時，只用水輕輕沖去灰塵；第二道(次)時，用手重力揉搓，將米皮搓下再淘，即用此水。

〔主治〕 浮腫，腳部尤重。

〔備考〕 此方原見(魯2)。

附：用米糠二方：

1. 甘糠粉 甘草四錢，米糠粉四兩，分4份，每日早、晚各服1份，開水調服，兩天服完。小孩按成人量減半，能治療并預防浮腫(京1)，亦有單用糠炒服者(蘇7)。

2. 二朮糕 白朮末三兩，蒼朮末二兩，紅糖三十兩，米糠六十五兩，做成糕，每塊2兩，每次吃1塊，每日2次(閩15)。

17. 五 爪 龍 湯

〔處方〕 五爪龍(即高粱根上的小岔根)一斤

〔用法〕 在高粱成熟或接近成熟時，採其根部露在土外的小分根(注意勿傷主干)，洗淨曬干貯存。切成約2厘米長的小段，鮮的加水1000毫升，煎取500毫升；干的加水2000毫升，煎取1000毫升，冷卻後，去殘渣，靜置澄清，每次服100毫升，每日3次。此藥液不能久藏，夏季不可超過兩天，秋季不可超過3天。若味有微酸時，即系變壞，不能服用。

〔主治〕 全身浮腫，腹脹，氣急，肢麻，食欲減退。

〔備考〕 此方原見(京3)，据經驗服此藥4—5天，大多數患者腫勢可消。

18. 玉蜀黍須茶

〔處方〕 玉蜀黍須新鮮者一兩(干者用五錢)

〔用法〕 加水600毫升，煎湯去滓，頻頻飲服。

〔主治〕 浮腫，或兼有血壓增高者。凡血壓過低者，以不用為妥。

〔備考〕 此法原見(閩3)。玉蜀黍須治浮腫，用法極多，計有：泡湯服(冀9)、(蘇6)、(蘇8)。泡水作飯(冀11)。水煎服(冀5)、(晉1)、(晉2)、(豫1)、(閩2)、(蘇2)、(鄂1)、(蒙3)、(京7)。水煎沖白糖服(魯1)。制成流浸膏服(晉1)。以上均系單用，分量5錢—4兩不等，大多數是用1兩。浸膏則為40—50滴。又有與絲瓜同煎之法，据謂服2—3日即能即消(粵2)。

19. 粽箬灯心散

〔處方〕 粽箬(端午節用以包粽子的)九片 灯心五束

〔用法〕 焙研為末，分2次用開水吞服，亦可制為丸劑。

〔主治〕 浮腫而脾胃不健，飲食少思，小便不利者。

〔備考〕 此方原見(閩5)。

20. 炒茄葉

〔處方〕 茄子葉半斤

〔用法〕 洗淨切碎，加油及醋炒食。

〔主治〕 浮腫。

〔備考〕 此方原見(魯6)。茄甘寒，醋苦溫，配合炒食味

甚美。《綱目》曾有茄叶能消肿之記載。

21. 醋 煮 海 帶

〔处方〕 海帶六兩

〔用法〕 加醋煮吃。

〔主治〕 浮腫，或兼有瘰癧、瘰癧等症。

〔備考〕 此方原見（魯6）。

海帶，咸寒無毒。《嘉祐》謂其能疗風下水。《綱目》謂其治水病，功同海藻。調以酸苦溫之醋，則屬平性。

附：

1. 海藻，《本經》謂其下十二水腫。李珣亦謂其治水氣浮腫。

2. 昆布，《別錄》謂其治十二種水腫。甄權謂其利水道，去面腫。

3. 水松，即形狀如松之藻類，甘咸寒無毒。陳藏器謂其治水腫、催生，三物俱可酌情使用。

22. 白朮澤瀉丸

〔处方〕 白朮 澤瀉各一兩

〔用法〕 研末，水泛為丸，每服3錢，用赤茯苓煎湯，空心吞服。

〔主治〕 浮腫屬於脾虛多濕者，或水凌心下，常覺眩暈。

〔備考〕 此方見《保命集》，治水濕腫脹。《驗方新編》卷十八亦載之，實即四苓散再減豬苓而成。

《金匱要略》之澤瀉湯，即澤瀉、白朮二味。治心下支飲，常苦眩暈。《梅師方》治心下有水，亦取此兩味。

白朮，甘溫無毒。《別錄》謂其能逐皮間風水結腫，暖胃

消谷嗜食。甄權謂其治心腹脹滿。《日華》謂其能利小便，補腰膝。潔古謂其除濕益氣，和中補陽，止瀉痢，消足脛濕腫。

澤瀉，甘寒無毒。《本經》謂其消水、輕身。《別錄》謂其逐膀胱三焦停水。潔古謂其去舊水，養新水，利小便，消腫脹。

附方：

1. 枳朮丸 白朮土蒸三兩，枳殼麸炒一兩，為末，荷葉包米飯，煨干為丸，每服3錢，治浮腫而內傷積食者（張潔古方）。

2. 澤瀉地黃湯 澤瀉二錢，地黃五錢煎服，治浮腫（瀉5）。六味地黃丸乃三補三瀉，此則各取其一，既滋陰而又利水，一開一合，浮腫屬於腎陰不足者，用之甚宜。

23. 猪 苓 粉

〔處方〕 猪苓半斤。

〔用法〕 研末，開水調服，每次1錢5分，1日3次。

〔主治〕 浮腫，兼腹膨、口渴、小便不利等症。

〔備考〕 此方出自《楊氏產乳方》，治通身浮腫，小便不利。又《子母秘錄》亦用上法治妊娠腫渴，從腳至腹，小便不通，微渴引飲等症。

猪苓，甘平無毒。《本經》謂其利水道，輕身。甄權謂其主腫脹。潔古謂其治渴除濕，去心中懊憹。

此方重在利水，不必久用。

24. 車前蓯蓉丸

〔處方〕 車前草（晒干的）五兩 肉蓯蓉五兩

〔用法〕 共研細末，蜜丸如梧子大，每服3錢，1日2次。

〔主治〕 浮腫，兩目昏花，小便短少，頻頻欲解，解時有余