



室内花卉 养护要领

卢思聪 编著

中国农业出版社

S68


56-
C1

室内花卉养护要领

卢思聪 编著

SHINEI HUIJIAHUJI YANGHU YAOJING

江苏工业学院图书馆
藏书章



图书在版编目 (CIP) 数据

室内花卉养护要领 / 卢思聪编著. —北京: 中国农业出版社, 2001.11

ISBN 7-109-07097-2

I. 室… II. 卢… III. 花卉—盆栽—观赏园艺
IV. S68

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 053825 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

出版人: 沈镇昭

责任编辑 赵 勤

北京日邦印刷有限公司印刷 新华书店北京发行所发行
2002 年 4 月第 1 版 2002 年 4 月北京第 1 次印刷

开本: 889mm × 1194mm 1/32 印张: 5.25

字数: 110 千字 印数: 1~8 000 册

定价: 29.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

编著：卢思聪

编写：邢全

摄影：卢思聪 杜惠春

卢建炜 卢建昕

李娟 司戩

司丛 树楠

叶晓余 艾蒿

陆萋 郦年

如何使用本书

页码

分类名

花卉名称

别名

拉丁学名

科属

产地

养护要点



朱顶红 (孤挺花、华胥兰)

学名: *Amaryllis vittata*

科属: 石蒜科, 孤挺花属

产地分布: 自南栽培的均为园艺品种, 原产产秘鲁。

养护要点: 多年生鳞茎植物, 花大型, 漏斗状, 花色较多, 因品种不同而异。3月中下旬用腐叶土或泥炭土盆栽。鳞茎顶部露出地面, 花茎或叶片稍露出后开始浇水。通常先叶开花, 开花即逐步加大浇水量, 喜温暖、湿润和充足阳光。旺盛生长时每两周左右施一次液肥, 并给予充足水分, 但盆内不应积水。放在阳光下栽培。秋季开始停止生长, 逐渐减少浇水。待地上部枯萎后将鳞茎挖出, 晾干贮存, 贮存温度5~10℃。

繁殖: 分株繁殖。

● 光: 阳 ▲ 水分: 中 ■ 湿度: 中 ◆ 湿度: 中

室内环境要求



书中符号的含义

光照

- 喜强光, 不耐阴。
- 不喜强光, 较耐阴。
- 适于光照不足或散射光条件。

浇水量

- ▲ 在土壤含水量高的潮湿环境中生长。
- ▲ 在湿润的土壤中生长。
- ▲ 生长在干旱地区, 有较高的耐旱能力。

温度

- 不能忍受0℃以下低温。
- 抗寒能力较强, 北方冬季需保护越冬。
- 抗寒能力强, 能耐0℃以下低温。

相对湿度

- ◆ 相对湿度高于60%。
- ◆ 相对湿度中等, 50%~60%。
- ◆ 相对湿度低于50%。



目录

如何使用本书

观花观果类

- | | | | |
|-------|----|------|----|
| 狗尾红 | 2 | 长春花 | 15 |
| 光萼荷 | 2 | 龙吐珠 | 15 |
| 口红花 | 3 | 君子兰 | 16 |
| 米兰 | 3 | 文殊兰 | 17 |
| 朱顶红 | 4 | 郁金 | 17 |
| 花烛 | 5 | 仙客来 | 18 |
| 朱砂根 | 6 | 瑞香 | 19 |
| 山茶花 | 7 | 香雪兰 | 19 |
| 丽格秋海棠 | 8 | 倒挂金钟 | 20 |
| 四季秋海棠 | 9 | 地涌金莲 | 20 |
| 球根秋海棠 | 10 | 一品红 | 21 |
| 狐尾木 | 11 | 栀子花 | 22 |
| 水塔花 | 11 | 网球花 | 22 |
| 两色茉莉 | 12 | 非洲菊 | 23 |
| 茉莉花 | 12 | 果子蔓 | 24 |
| 叶子花 | 13 | 垂花赫蕉 | 25 |
| 荷包花 | 14 | 扶桑 | 25 |

- 美丽水鬼蕉 26
风信子 26
八仙花 27
四季凤仙 28
龙船花 29
宝莲花 29
中国水仙 30
南美水仙 31
长寿花 31
朱砂橘 32
冬珊瑚 33
南天竹 34
火棘 35
夹竹桃 35
天竺葵 36
洋蝴蝶 37
巢凤梨 37
丽冠凤梨 38
袋鼠花 38
灯珠花 39
桂花 39
五星花 40
鸡蛋花 40
报春花 41
花毛茛 41
花黄芩 42
大岩桐 42
杜鹃花 43
非洲紫罗兰 44
瓜叶菊 45
白鹤芋 45
铁兰 46
鹤望兰 47
郁金香 47
丽穗凤梨 48
丝兰 49
白兰花 49
马蹄莲 50
金红花 51
百子莲 51
硬毛金鱼藤 52

兰 花 类

- 卡特兰 54
建兰 55
寒兰 55
蕙兰 56
墨兰 56
春兰 57

莲瓣兰 57

大花蕙兰 58

春石斛 60

秋石斛 61

文心兰 62

兜兰 64

蝴蝶兰 66

米尔顿兰 68

鹤顶兰 68

独蒜兰 69

万带兰 69

接瓣兰 70

观 叶 类

红桑 72

铁线蕨 72

广东万年青 73

银后万年青 73

紫背万年青 74

万年青 74

海芋 75

艳凤梨 76

枪刀药 77

猪笼草 77

银脉爵床‘妲妮亚’ 78

文竹 79

一叶兰 80

东瀛珊瑚 81

绿元宝 81

蟆叶秋海棠 82

花叶芋 83

天鹅绒竹芋 84

吊兰 86

散尾葵 86

变叶木 87

彩叶草 88

袖珍椰子 89

酒瓶椰子 89

苏铁 90

朱蕉 91

大王黛粉叶 92

姬凤梨 94

赭凤梨 94

捕蝇草 95

网纹草 95

孔雀木 96

八角金盘 96

月桂 97

肋叶蔓绿绒 97

德利龙血树 98

- 银星龙血树 99
香龙血树 100
龙血树 101
富贵竹 101
维奇露兜树 102
菜豆树 102
百合竹 103
常春藤 103
垂榕 104
橡皮树 105
花叶薜荔 105
两色竹芋 106
龟背竹 107
豆瓣绿 108
冷水花 109
含羞草 109
虎耳草 110
紫叶草 110
海桐 111
花叶钝叶草 111
兰屿肉桂 112
发财树 112
棕竹 113
榕树 113
鸟巢蕨 114
纽扣蕨 115
肾蕨 115
鹿角蕨 116
大叶凤尾蕨 116
春芋 117
马氏卷柏 117
‘绿宝石’喜芋林 118
‘绿帝王’喜芋林 118
绿萝 119
心叶绿萝 119
鹅掌柴 120
六月雪 121
合果芋 121
紫背竹芋 122
吊竹梅 122
细叶千年木 123

仙人掌与多肉类


- 沙漠玫瑰 126
酒瓶兰 126
芦荟 127
鼠尾掌 128
白云般若 128
鬼脚掌 129

- | | | | |
|-------|-----|-------|-----|
| 燕子掌 | 129 | 雪光 | 138 |
| 神刀 | 130 | 小町 | 138 |
| 彩虹菊 | 131 | 非洲霸王树 | 139 |
| 刺叶露子花 | 131 | 红雀珊瑚 | 139 |
| 金琥 | 132 | 黄翁 | 140 |
| 四海波 | 133 | 玉米石 | 140 |
| 棒叶花 | 133 | 佛肚树 | 141 |
| 佛手掌 | 134 | 帝玉 | 141 |
| 球兰 | 134 | 虎尾兰 | 142 |
| 巨鹫玉 | 135 | 马齿苋树 | 143 |
| 绯牡丹 | 135 | 假昙花 | 144 |
| 条纹十二卷 | 136 | 绿串珠 | 144 |
| 生石花 | 137 | 大花犀角 | 145 |
| 虎刺梅 | 137 | 蟹爪兰 | 145 |

花卉名称索引

- | | | |
|-------|-------|-----|
| 中文名索引 | | 146 |
| 拉丁名索引 | | 152 |

观花观果类



● 光: 喜阳 ▲ 水分: 中 ■ 温度: 高温 ◆ 湿度: 高

狗尾红

学名: *Acalypha hispida*

科属: 大戟科、铁苋菜属

产地分布: 新几内亚, 现世界各地有栽培。

养护要点: 常绿灌木, 中小盆栽种。喜高温, 怕寒冷; 喜充足阳光, 夏季可搬至室外阳光下栽培。用腐叶土或泥炭土盆栽, 生长期1~2周施一次液体肥料, 越冬最低温度18℃左右。华北地区栽培失败的主要原因是冬季温度太低。常见栽培品种: 白花狗尾红 cv. Alba、分枝狗尾红 cv. Vamosa。

繁殖: 扦插繁殖。

光萼荷 (粉菠萝、光萼凤梨)

学名: *Aechmea fasciata*

科属: 凤梨科、光萼荷属

产地分布: 巴西。世界各地有栽培。

养护要点: 多年生常绿附生草本植物。叶丛呈莲座状, 紧密排列成筒形, 可以贮水。用粗而疏松的腐叶土或泥炭土盆栽。要求盆土透气排水良好。喜充足阳光, 夏季温室栽培遮阳50%左右。用软水浇灌; 经常保持叶丛筒内有水, 两周左右更换一次。旺盛生长期, 1~2周叶面上喷施一次液体肥料, 浓度0.1%以下。喜欢较高的空气湿度, 越冬最低温度12~15℃。常见栽培种和品种: 斑叶光萼荷 cv. Variegata、二列花光萼荷 A.

● 光: 中等 ▲ 水分: 中 ■ 温度: 中 ◆ 湿度: 高

distichantha 和红翅光萼荷 A. cv. Redwing。

繁殖: 若植株开花后逐渐枯死, 基部会生出蘖芽。分割这种蘖芽繁殖。



口红花(芒毛苣苔)

学名: *Aeschynanthus radicans*

科属: 苦苣苔科、芒毛苣苔属

产地分布: 马来西亚和爪哇。

养护要点: 常绿多年生蔓生植物。

茎下垂, 花萼筒状; 深紫色, 花冠鲜红色含在萼筒中。花开前极似口红, 故名。盆土要透气排水良好, 用粗质的泥炭土或腐叶土中小盆栽种; 生长期每两周左右施肥一次; 经常保持盆土湿润和较高的空气湿度; 喜明亮的光线, 夏季忌阳光直射, 遮光30%~50%。适宜生长温度15~25℃, 30℃以上对其生长不利, 越冬最低温度13℃以上。

同属植物有大花芒毛苣苔 *A. mimetes*,

繁殖: 扦插。



● 光: 半阴 ▲ 水分: 中 ■ 温度: 中 ◆ 湿度: 中

米兰(米仔兰、四季米兰、树兰)

学名: *Aglaia odorata* var. *microphylla*

科属: 楝科、米兰属

产地分布: 中国华南及东南亚地区。

养护要点: 常绿小乔木。盆栽高0.8~2米。花小似粟粒, 金黄色, 开花时清香四溢, 气味似兰花。泥炭土或腐叶土盆栽, 两年左右换盆一次; 生长期1~2周施肥一次; 经常保持盆土湿润, 忌盆土积水; 喜充足阳光, 夏季可搬至室外阳光下栽培; 越冬温度10℃左右。

繁殖: 扦插、高枝压条。



● 光: 阳 ▲ 水分: 中 ■ 温度: 中 ◆ 湿度: 中



朱顶红(孤挺花、华胄兰)

学名: *Amaryllis vittata*

科属: 石蒜科、孤挺花属

产地分布: 目前栽培的均为园艺品种, 原产秘鲁。

养护要点: 多年生鳞茎植物。花大型, 漏斗状, 花色较多, 因品种不同而异。3月中下旬用腐叶土或泥炭土盆栽。鳞茎顶部露出土面, 花茎或叶片稍露出后开始浇水。通常先叶开花, 开花前逐步加大浇水量。喜温暖、湿润和充足阳光。旺盛生长时每两周左右施一次液体肥, 并给予充足水分, 但盆内不应积水。放在阳光下栽培。秋季开始停止生长, 逐渐减少浇水。待地上部枯萎后将鳞茎挖出, 晾干贮存, 贮存温度5~10℃。

繁殖: 分株繁殖。

● 光: 阳 ▲ 水分: 中 ■ 温度: 中 ◆ 湿度: 中



花烛(火鹤花、安祖花、红鹤芋)

学名: *Anthurium scheranum*

科属: 天南星科、安祖花属

产地分布: 原种产中南美洲, 栽培多为园艺品种。

养护要点: 多年生常绿草本植物。主要用作中小盆栽。用腐叶土或泥炭土盆栽, 要求土壤疏松。喜温暖怕高温, 越冬温度需在 15℃ 左右。春、夏、秋三季需遮光 50% 左右, 冬季不遮光。盆土中经常保持充足水分, 且盆土必须透气、排水良好。生长期每 1~2 周施一次液体肥料。同属常见有: 安祖花 *A. andreaeanum*、水晶花烛 *A. crystallinum*。

繁殖: 分株和扦插。



● 光: 半阴 ▲ 水分: 中 ■ 温度: 中 ◆ 湿度: 中



朱砂根 (大罗伞、圆叶紫金牛)

学名: *Ardisia crenata*

科属: 紫金牛科、紫金牛属

产地分布: 中国长江流域及以南亚热带林区。

养护要点: 常绿小灌木。用腐叶土或泥炭土中小盆栽培。生长期2~3周施肥一次。喜半阴环境, 春、夏、秋季遮光30%~50%, 冬季不遮光。生长旺盛期经常保持盆土中有充足水分, 但不宜积水。喜较高的空气湿度。越冬温度5℃以上。根据需, 于春季换盆。同属观赏的有: 虎舌红 *A. mamillata*。

繁殖: 播种或扦插繁殖。



● 光: 半阴 ▲ 水分: 中 ■ 温度: 低温 ◆ 湿度: 中



山茶花(茶花、耐冬、山椿)

学名: *Camellia japonica*

科属: 山茶科、山茶属

产地分布: 中国长江流域及西南地区, 日本和朝鲜半岛也有。

养护要点: 常绿灌木或小乔木。世界著名花木, 中国十大名花之一。北方腐叶土或泥炭土盆栽, 产地常露地栽植。用软水浇灌, 生长期2~3周施一次液体肥料。喜半阴和湿润的环境, 华北地区夏季移至室外荫棚下栽培, 遮光量30%~50%。北方盆栽, 2~3年换盆一次; 在冷温室越冬, 可耐2~4℃低温。栽培品种数千个。同属常见栽培种: 云南山茶 *C. reticulata*、茶梅 *C. sasanqua* 和金花茶 *C. chrysantha* 等。

繁殖: 扦插、压条和嫁接。



● 光: 半阴 ▲ 水分: 中 ■ 温度: 低 ◆ 湿度: 中

