

(園藝世界出版社 最佳獻禮)

園藝世界雜誌

● 綜合性園藝雜誌 ● 每期120元
一年6期650元 二年12期1200元

西洋茶花彩色圖鑑2輯 120元
杜鵑花盆栽藝術 150元
梅花盆栽入門 200元
菊花栽培法 150元

圖解蘭花組織培養入門 150元
蝴蝶蘭栽培技術 150元
國蘭栽培入門 200元
最新全國花卉業者名錄 150元
水耕栽培 150元



盆花
綠的生活
洋蘭百科 (即將出版)
仙人掌與多肉植物
最新全國園藝業者名錄

最新禮品包裝(22業別) 250元
花束 180元

園藝世界出版社 台北市10920東園街85巷4弄1號 電話：3074443
郵政劃撥帳號：1046704-0 02-9116204


5688.1

九重葛

■一般家庭容易栽培的熱帶花卉



黃花



白花



菲吉

在熱帶地區一年四季都欣賞到的花卉大概以九重葛為代表。

●特性

耐低溫，即使溫度降到3~4℃也可順利過冬，但需要足夠的高溫和日照量，才能開花。因此，最好選擇全年日照充足、通風良好的場所來栽種，即使冬季放置在室內也必須選擇陽光照射得到的窗邊。

●品種

有深紅色、紅紫色、兩色花、黃色花、帶有斑紋等多種品種，是極其耐熱的植物。

●選購方法

選擇時以樹幹極其碩壯，樹枝均衡為標準。

●栽培秘訣

在花期結束之後來進行修剪樹枝，當根部

長滿盆鉢時，必須加以修剪之後再重新栽種。

經常有人抱怨：「買回來正開著花的株，但是以後却不再開花了。」九重葛的主要開花期為五月到十月。只要充分的照射日光，不要停止施肥。特別是在五月到九月必須充分施肥。肥料以油粕和骨粉各半，或4比6混合，避免氮肥過多。儘可能控制澆水，以保持微乾的澆水狀最佳。但是在著蕾開花中必須充分的予以澆水。


冬天時，應將植株移至陽光照射到的位置栽培。

●翌年也可所

氮肥成5 0000036547 不會開花。當花期過後，枝端要稍微修剪，如果控制澆水，可以促進下一次花芽的形成，等待下一次開花。



0000036547



晚之舞



紅色花

每天清晨就會盛開的牽牛花是象徵夏季的花卉，自古以來就為人所愛。

●特性

在溫暖的五月中旬是播種的最適當時期。苗的移植、摘心，豎立支柱是栽培的要點。

●品種

- 大輪種：花徑15～25公分左右。花色有藏青色、白色、紫色、淺藍色、紅色、桃色、咖啡色、灰色等單色花。還有複輪花，和帶有斑紋等多種色彩。

- 矮性種：摘心之後便不再生長，大約在15～25公分左右就會開出許許多多的花。

- 變化花型種：牡丹花型、獅子花型、桔梗型等等的變化花型。即使利用盆栽也可欣賞到花的變形，愛好者可任意挑選。

- 西洋牽牛花：成長快速，在傍晚時分開花

，日本的牽牛花大都是經過美國改良培育而成。

●選購的方法

春天在市面上出售的種子多半都很可靠。但是對於老種子必須特別注意。選擇苗時必須選擇葉片肥厚圓潤，看起來生氣蓬勃的苗。

●播種

牽牛花是熱帶性植物，在氣溫上升的五月上旬到中旬播種，由於種子表皮又厚又硬，可以在種子尖端帶白點處，稍微割開使之露出，並在水中浸泡一夜，如此就可使之容易發芽。

在盆鉢或育苗箱中裝入珍珠石，或不具肥料的清潔用土。大約每隔3公分左右掩埋一粒種子，其上覆蓋1.5公分厚的土，再用細嘴壺充分澆水後，放置在日光照射良好的場所。

●移植或定植

牽牛花

■代表盛夏的花卉

燕子



曉之舞



紫色花



茶色花

發芽之後，當雙子葉完全開展之後再移植到三～四寸鉢中，並放置在日光照射良好的場所。到本葉長出四～六片時，將根部挖出再定植至6～8寸盆中。

土壤以腐葉土5，砂土3和泥炭岩或珍珠石2的比例混合。最近在日本已有出售牽牛花專用的土壤，利用此種土壤種植就更加簡便。

●定植後的管理

①放置的場所：必須放置在通風良好和日照充足的地方。

②澆水：在接近開花期必須控制給水，最重要不要使莖部徒長，水只要讓鉢土保持濕潤的程度就可以了。

③肥料：定植之後到花蕾出現之前，可以給予稀薄的液體肥料，每月二～三次，當開花之後就控制施肥。

④摘心和豎立支柱：當本葉長出10～12片時，留下7～9片，將尖端摘掉。

在本葉上面的1～3片的嫩芽會長出蔓藤，所以一旦生長到15～20公分時就必須豎立支柱，第三片以下長出的腋芽就將其剪掉。

支柱可以在花市中購買現成的。

第一次摘心後長出的蔓藤將尖端摘除，而將再長出的2～3根更小的蔓藤，保留下來使其開花。

●開花中的管理

牽牛花是一種短日植物。白天的時間一旦變短，過了夏至之後就會大量開花。

開花的株可以放置在陽光照射良好而通風的場所。開花株不可以乾燥，所以每天早上必須充分給水，下午三點以後就要控制給水。開花期中不要施肥。



從陽台的欄杆垂落下來盛開中的矮牽牛。

從初夏到秋末始終扮演著點綴窗邊陽台五彩繽紛的角色。在溫暖地區渡過冬天之後，在第二年仍會繼續開花。

● 特性

性喜陽光、厭惡長期下雨，不要忘記施肥，如果長得太長可以修剪。

● 品種

品種非常多，有單瓣的也有重瓣的，單瓣的品種比較多。

花色有紅、桃、白、紫、青和黃色，除此之外有白複輪和星形雙色品種等多彩多姿的顏色。

巨大輪種：花徑在十公分以上。

大輪種：有許多品種。

中輪種：花徑五～六公分，非常容易著花，是

一種非常耐雨的品種，很適合種植在花壇上。

● 選購的方法

在四到五月左右在市面開始出售，通常種植在約三寸大的塑膠袋中，可以購入花苗來培育。

苗要選擇橫張性的較佳，選購時要注意莖部不要過長，下葉不可變黃，花葉如有萎縮時，必須看看是否得了濾過性病，檢查之後再選購。

● 種植的秘訣

幼苗如果根部長得太大會形成袋狀，就連袋的底部也會被脹破，當莖部長得過長時必須毅然剪至一半以下。在酒杯形之盆或花槽中儘可能種植三株以上，如此看起來更有花團錦簇的樂趣。花期很長所以儘量選用排水良好的土

矮牽牛

■初夏到秋末陽台不可缺少的



白夏爾斯



羅茲安特



開前的長方形花槽上。
將矮牽牛種植在玄

壤，再施以緩效性的化學肥料。

●長久開花的管理秘訣

①放置場所：儘可能放在陽台或窗邊，但是不會直接淋到雨的地方即可。儘量選擇光線良好的場所，從初夏到秋末爲止，即使放置在明亮的北邊也可大量開花。

②澆水：一旦缺水就會枯萎，水過多會造成根腐，當看到土表面乾燥時就必須充分給水。

③肥料：在生長期間會逐漸著花。因此，一旦缺肥，著花的情形就會不良，除了要給予基肥之外，在開花期間，每隔七~十天就要給一次液體肥料。

④病蟲害防治：一旦天氣炎熱，濾過性病就十分顯著，生長好的株可以繼續開花，但是病態嚴重者，則不會開花。仔細觀察苗的情形，將

嚴重的予以去除。

⑤花株的處理：將開過的花苞採摘下來，開過花之後，將一半以下切除，如此才能繼續成長開花。

●翌年也可欣賞到開花

①開花後的管理：如果是在溫暖地區，可放置在陽台過冬，到了一月中就會開始開花。因此在十一月~十二月時，保留距離土面十公分左右的枝條，其餘切除。盆土保持微乾的狀態，放置在陽台或屋簷下，不至受到寒害，使之過冬，如果在特別寒冷的地區則需移進室內。

②翌年春天的管理：到了三月中旬時，就開始發芽，慢慢地增加澆水。從四月開始給予施肥，在五月肥料必須比前年增加2倍以上。



F₂諾貝蒂，紫羅蘭



F₂根非克辛

在盛夏時放置在半日陰的涼爽處，由於不耐乾旱，不要讓其缺水。

最近特別受歡迎的一種草花，其令人眼花撩亂的小花，開得五彩繽紛，適合種植在花槽或花籃中。

● 特性

不耐寒也不耐熱，不可以缺水但也厭惡過濕，發育快，只要放在日陰處就會開花。

● 品種

非洲鳳仙花：一般多栽培此類，品種很多。

新幾內亞的混合種：原產於新幾內亞的品種經過美國的改良，產生出許多新的品種。花朵較大，花色較美，葉子帶有斑點。可以種植在盆鉢內，但是其耐寒與耐熱的情形比非洲品種較差，如果作為盆花非常受歡迎。

● 選購的方法

因為不耐低溫，當天氣逐漸暖和（五月以後）就可開始購買，與其選擇大而長的，不如選擇小而健壯的。因為即使小株，天氣溫暖了就可迅速成長。避免選購下部的葉子開始枯萎、變黃的苗。

新幾內亞種多半屬於混合顏色，可依個人的喜愛來選購。

● 種植的秘訣

雖然苗非常小，由於成長迅速，即使種植在花槽中，每株必須使之間隔十公分以上。用土可以用培養土、泥炭苔和珍珠石等量混合。排水性和儲水性良好的輕土壤亦可。花色則以混合色彩看起來比較多彩多姿。

鳳仙花

■盆栽或花箱栽植的代表花卉



將白、紅、桃等各種顏色混合種在吊盆中

伸展在籬笆上的鳳仙花吊籃。



F₁超級的愛爾芬系列

●長久開花的秘訣

①放置場所：性喜日照良好的場所，當天氣轉熱，梅雨過後，可以放置在半日陰或光線明亮而涼爽的場所。夏季即使放置在涼爽之處，只要可照射到陽光也會開花。新幾內亞種必須放置在比較涼爽的場所。

如果放置在室外，到十一月時開花逐漸變少，如置之不理到冬天則會枯萎。但放置在十度以上日照良好的室內，冬天也會持續開花。

②澆水：不耐乾燥，如嚴重缺水葉子會掉落。反之，如澆水過多則會發生腐根，必須特別注意，當土質的表面開始乾燥就必須充分給水。

③肥料：因為不斷開花，每七到十天要給予一次液體肥料。如天氣變熱則需控制施肥。

④病蟲害：在初夏開始有蚜蟲為害，到了盛夏則有紅蜘蛛為害。

⑤花株的處理：開花後種子自然掉落，可以選擇自己所喜愛的花色來種植。夏天開始停止生長，到八月下旬時修剪掉二分之一。在同時種子已經破殼開始發芽，如果予以種植就會立刻長大，到秋天就可開花。也可將母株剪下，培育從根際處長出的子苗。

●翌年也可欣賞到開花

將母株放置在室內過冬，同時秋天插芽或活的苗也放置在溫暖的室內使之過冬，到了五月再拿到室外。新幾內亞種比非洲種還怕冷，所以需要較高的溫度。



月石



孔雀仙人掌的盆栽容易傾倒，所以必須使用支柱架住。

五～六月是花的盛開期。以其華麗的花形頗具吸引力，顏色和形態的多樣化，更能讓人感受到栽培的樂趣。

●特性

必須日照充足，保持微乾的狀態來栽培，冬天可以不澆水，放置在不致受凍的地點即可開花。

●品種

有喇叭形、盞形、八重瓣形、菊花形、水仙花形、鐵線蓮形、風車形、吊鐘形等等。花的大小從直徑四公分的小輪花到直徑超過三十公分以上的巨大輪花朵均有。

花色有白、黃、粉紅、橙、紫紅、鮮紅等等。園藝品種超過一千種以上。從十九世紀以後，美國和歐洲雜交改良出很多名種。

●選購的方法

①必須確定品種：種類多，花色形形色色，在開花期間欣賞花之後，選擇自己所喜愛的花來栽培。

當購入苗時最重要的是要仔細選擇品種。即使開著美麗花朵的植株，也有樹性不良的情形。有些栽培非常好的品種，高度已超過一公尺仍不會開花。所以在購買苗時必須確定是否二、三年之後一定會開花，且是多花性的品種。

②選購苗時的注意點：要美麗的花卉能開花的第一步就是要選購優良的苗。所謂優良的苗就是莖節要長得大而且碩壯，避免選擇已變黃的。另外，要選擇確定根底部沒有發生腐根的苗。

對於長久放置在遮光的溫室，密閉栽培的苗也不要購買。因為這種苗含有充足水份，所



丹地



粉紅巴蕾



金米達斯



茲丹卡門

以苗顯得特別嫩綠而且修長，但是，即便栽培再久也始終不易開花。

所以選購時必須到值得信賴的園藝店選購。

● 開花期間的管理

放置在室內日照良好的場所（如果放置在戶外，則必須放置在半日陰的場所）。盆土的表面出現乾燥之後等待一天之後再予以澆水。在開花期間無須施肥，對花苞過多的花株給予疏花，植株才不會衰弱，當花期結束之後，可將殘花摘下並且儘快移到戶外的半日陰處。

● 促使其開花的栽培秘訣

為了使其開花，最重要的是要選購良好的苗，再予以定植。

①定植的方法：適當的期間為五月初旬到七月上旬和九月中旬至十月上旬。將四～五寸盆的

盆底洞用底網蓋住，再裝入少許稍微大一點的顆粒土，在其上面加入栽培用土，栽培用土的比列是培養土3、腐葉土3、砂土2、燐炭1、雞糞1等混合起來使用。

每盆可以種入二株，只要淺淺的種就可以了，用土裝盆子的九分滿，之後為了避免苗的倒伏必須豎立支柱，用塑膠繩輕輕的綁住。

定植之後，為了避免風吹搖動，所以放置在半日陰的場所。不要給水，經過四、五天之後再給水。

②放置場所：在定植發根之後再移到戶外，放置在日照充足通風良好的場所。在梅雨時期避免直接淋雨，冬天則必須放置在不會受到霜凍的場所。

③澆水：孔雀仙人掌栽培管理的要點就是澆水，在七月上旬之前，當盆土乾燥之後不要匆忙



櫻姬



月世界



華利斯安



風車

給水，在盆土乾燥一、二天之後再給水。

特別是七月中旬以後，若在炎熱的盛夏中午給水，就如同在煎煮根部一樣，所以必須在傍晚時給水。

八月下旬到九月下旬，有許多品種開始結出白色的花芽，八到十一月之間給水的次數要逐漸減少，十二月到二月中以斷水的狀態，放置在通風良好，日照充足的場所。當白色的花芽開始出現微紅，在二到三月一定可以看到開花。

④肥料：在定植一個月之後，每月大約給予二次稀釋的液體肥料，夏季則不給予，到九月下旬時再給予一到二次的液體肥料。

●翌年也可欣賞到開花

當大株開花後，經過二年必須重新換盆一次。

①換盆的方法：適當期為五到九月（避免在盛夏），用土和定植時相同，盆則選擇六～七寸盆。

當株拔起來之後，將過長的根剪短，使其陰乾一～二天，當需要澆水時再來種植，根部會長得比較好。

種植的方法和苗定植時是相同的，淺淺的種植，用土只要盆的九分滿即可，將部份莖部用塑膠繩輕輕的綁在支柱上。

經過二週之後，新根開始長出，逐漸變得有生氣，從此時開始稍微給予日光照射，使之習慣栽培環境。

②換盆之後的管理：換盆之後在根部尚未長出之前，暫且放在日陰處不要移動，之後再放置在換盆前的位置，經過一個月之後再給予稍微稀薄的肥料。



美女



白色神奇

蓮花



定植之後也要控制給水。孔雀仙人掌的放置場所、澆水、肥料是三位一體，也是決定開花與否的關鍵條件。

③莖節處理：如果植株使之徒長，就會長得非常難看，而且一旦開花之後，老株會變得非常柔弱。所以可以將其修剪，但是切除的幅度必須採取一定的高度，以一公尺左右為標準。

切除後部份開始陸續長出新的莖節，經過再一次修剪，則該莖節會變得肥厚且更易結花芽。

④即使腐根也會再生：孔雀仙人掌在栽培期間出現黃葉且喪失光澤，葉子枯萎並變成茶褐色時，有許多人會認為這已經無救了，而把株拔起來丟棄。事實上這種情形千萬不可放棄，而可以使其起死回生。

因為即使因株腐爛，但是其莖節上的心還可以活，可以將株從鉢底拔起，把腐爛部份到

其上部一到二公分處予以切除，再用水洗，放置半日陰處四~五天，然後再將此定植，如此就可使其起死回生。水份在定植之後約第十天開始再徐徐的給予，以後的栽培管理就遵照定植的方法來種植。

⑤病蟲害：當葉子附著蚜蟲或介殼蟲時應該予以驅除或予以捕殺。

經常看到的病害是在莖節出現斑點並變黑，這是因為濾過性病菌所引起的毒素病，除了燒毀別無他法。

●繁殖（插枝）方法

繁殖通常以插枝法為主，插穗通常要選大一點才能培育成功。通常在二十到三十公分處，切掉莖節的尖端，然後陰乾七到十天，再將用土（顆粒土、河砂、珍珠石等）放入五寸盆內將插穗輕輕插入，約經過二週，發根之後再予以定植。



耶誕愛爾斯

伊達紫



直立型盆栽

原產於墨西哥和熱帶美洲，品種大約有一百種。花大而美麗類似女人的耳環，在歐美各國則有「女性耳墜」的別稱。

●特性

適合冬季溫暖、夏季涼爽，空氣中濕度高的環境。厭惡水份過多和夏季高溫，所以必須給予適當的栽種環境。

●品種

販賣的植株多半種植在五寸盆中，通常一年四季都會開花，盛花期大致為三月下旬到十一月中旬。

選購時必須注意枝是否長得太長，是否與盆取得均衡。從盛開的花到含苞的小花蕾、枝葉的光澤與否都是選擇的重點。

●栽培成功的秘訣

①放置場所：盆鉢必須放置在陽光照射充足的窗邊。在天氣好風又小的日子，儘量移室外。到五月中旬以後可以移到戶外，可以放置在日照充足通風良好的棚架上施予肥料栽培。

隨著環境變化，其花蕾或葉子會逐漸掉落。因此不管在室內或戶外，不要經常變換位置。

②澆水：當盆土的表面乾燥之後可充分給水，直到從盆底流出水為止。梅雨期間放置在不會被雨淋到的地方，且要注意不要過濕。

③肥料：不要有缺肥的情況發生。可以使用油粕加上骨粉混合起來的有機肥或使用含有磷酸鉀的粒狀化學肥料，經常予以施肥。如果沒有加溫設施時，在四到十月之間每隔四十五天施肥一次。

燈籠花

別緻的花形鮮豔的色彩

，以時髦的花形和鮮豔的色彩頗受歡迎。
燈籠花的吊盆就像一群飛舞中的舞者一樣



伊沙貝爾女王



白色國王



何里蒂耳

④病蟲：常見的病蟲害有黑斑病和灰色黴病，蚜蟲、蟎類和介殼蟲等。必須放置在光線充足通風良好的場所，定期噴灑殺蟲劑或殺菌劑，才能有效防治。

●翌年也可欣賞到開花

在歐美各國都喜歡栽培成直立型來欣賞其花，在我國則多利用五～六寸吊盆來栽培。

植株進入冬季休眠期時，從十一月以後就要控制給水使之習慣乾燥，到了三月下旬將枝條予以修剪，然後再換盆，如此可使植株年年增大。如果使用五寸盆栽時，在五～六月時進行插枝，小苗渡過夏天和冬天到翌年春天再換盆，枝條增加，到六月中就可以欣賞到美麗的花朵。在夏天或冬天小苗比大株還要容易渡

過，為了欣賞比較多的品種，以這種方式來栽培是比較理想的。

在栽培大株的情形時，可將三、四株種植在大盆內來欣賞，也可栽種一株使之變大。但為了使單株看起來更為美麗，須經過數年的栽培，如果要使其變成大株，那麼在進入五月之後可從鉢中拔出小苗，再以稍微高的種植方式，種植在院子日照比較佳的場所。當新的樹梢長出之後大約摘心二次，如此枝數增加，花苞也會結得更多。

庭院中所種植的植株，在嚴冬時必須改種在鉢內，移至室內保護，所以要在九月的上旬到中旬，將植株挖掘出來種在盆內，由於斷根的緣故，經過一到二個月之後，可使根長得更為碩壯。



餐桌上法國秋海棠的擺飾



英凱巴特



弗利古斯



粉紅淑女

直立伸長的莖開著許多豪華的花和多彩多姿的葉子，令人有時髦又豪華的感覺，栽培起來也非常容易，是非常受歡迎的盆花。

● 特性

應放置在陽光不會直接照射的日陰處（在夏天以百分之五十的遮光處最為適當）。性喜多濕，在乾燥的氣候必須補充空氣中的濕度。由於生長快速，必須經常地給予施肥。再配合生長情形每年換盆 1～2 次。

● 品種

一般可分為四種①莖節部份就像竹節矢形狀的矢竹形。②莖部柔軟分枝較多的叢生型。③莖粗而多肉質的肉莖型④莖細如蔓藤狀的細蔓藤型。花期有四季開花和一季開花的兩種。

● 選購的方法

必須選擇具備下列條件的花株。

- ▽ 小的花房可以大量集中在上部者。
- ▽ 莖粗而且健全茁壯者。
- ▽ 葉肉肥厚無受傷或病斑者。
- ▽ 下葉無掉落，且靠近地表的節非常結實。

● 管理秘訣

①放置場所：在四月終了，已不必再擔心有寒流出現時，可放置在戶外，在風強的地區須放置於避風處。在梅雨季節請放置在陽台或屋簷下，以免淋雨。

在七～八月必須利用遮光網來遮光，並且放在通風良好之處。如果管理得好，即使在十月末依然會持續開花。

②澆水：五～六月，九～十月每月一次，七～八月則早晚二次，空氣過於燥乾是造成花凋謝

法國海棠

■花和葉都具有魅力的

在玄關入口的牆壁上裝飾著法國海棠吊盆



端木夫人



高雅蒂莉娜



耶誕糖果



的主因，因此必須在盆的周圍以噴霧式洒水，以保持空氣中的濕度。

③肥料：四～十月每週一次，以速效性的液體肥料為佳。為了保持葉子和花的美，在五月時將油粕和骨粉等量混合成固體肥料，淺淺地埋在盆的周圍。

④病蟲害：若發生白粉病時要噴酒殺蟲劑。灰色黴病是在開花時或葉子枯萎時才發病，必須將這些病葉予以摘除。在預防時可噴酒大生，波爾多混合液。

細菌性斑點病一旦發生要防除十分不易，儘量不使葉子上有水滴殘留。

●翌年也可欣賞到開花

①冬季的管理：在冬天如果能保持在十五度以上的溫度，也可欣賞到開花的樂趣，氣溫十度

以下時生長遲鈍，則無開花的希望，但最低溫度如保持在五度以上，在冬眠狀態之下可一直維持到春天。

植株也可放置在日照充足的南側，只要每週澆水一次即可，當氣候過於乾燥時，葉子開始掉落，此時可保持空氣中的濕度。進入三月之後再施以液體肥料，以備春天的生長。

②枯萎株的重生方法

叢生性的秋海棠生長較快，如果每年不換盆一～二次，根部會糾結，植株會很快衰萎，所以若出現褐色的老化莖或出現細而且長得不好的芽莖，可以從根際處予以切除。而且當下葉開始凋落的植株，可保留二～三芽之後，再將莖切除。當整姿修剪完畢，從盆中拔起，然後再將盆土除去一半左右，改用新的培養土來栽種。

彩葉草

■ 葉色豐富的

米爾基威

彩葉草的混合種植



彩虹



氣象儀



十字彩虹

雖然不是花，但其強烈對比的葉色令人留下深刻的印象。可以放置在陽台上，以花盆或長方形花槽來種植，表現出富有豪華的感覺。

● 特性

使葉子顏色顯示出美感是最重要的，避免夏季強烈日光的直接照射，春秋則必須大量照射陽光。

● 選購方法

在初夏時有五彩繽紛的小苗出售，可以將這些苗種植在小型盆和長方形花槽上。使用種子也可發芽、生長，如播在盆上或將種子直接播在長方形的花槽中亦可。

● 栽培秘訣

①種植：栽培可從塑膠袋中把苗拔起，直接種入盆中。栽培用土以排水性良好或帶有肥料的

用上為宜。此時可將基肥或緩效性的肥料混合放置在鉢底。

②放置場所：夏季放在半日陰的場所。秋天則放在日照充足的場所，夏季時也要偶爾放在日光直射的地方，葉色才會美麗。

③澆水：夏季如缺水會立刻枯萎，因此，當盆土表面乾了必須立刻大量給水。

④肥料：由於生長快速，所以必須隨時給予追肥，追肥以液體的肥料較佳。

⑤病蟲害：除了有蚜蟲之外，還有小的介殼蟲，一旦有病蟲出現時必須立刻予以摘除。

株的修整：將葉尖摘除一～二次（有的品種則需修剪好幾次），主要是要讓植株長得更為橫張性。在欣賞的同時，若看到花必須予以摘除。