

SHIYONG ZHONGCAOYAO YUANSE TUPU

实用中草药

原色图谱

(三)

全草类
叶类
皮类
藤本类
树脂类
藻菌类等

肖培根
杨世林
主编



中国农业出版社

实用中草药原色图谱(三)

全草类、叶类、
皮类、藤本类、
树脂类、藻菌类等

肖培根 杨世林 主编



中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

实用中草药原色图谱. 3, 全草类、叶类、皮类、藤本类、树脂类、藻菌类等 / 肖培根, 杨世林主编. —北京: 中国农业出版社, 2001.8

ISBN 7-109-06909-5

I. 实... II. ①肖... ②杨... III. 中草药-图谱
IV. R282-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 037532 号

中国农业出版社出版
(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)
(邮政编码 100026)

出版人: 沈镇昭

责任编辑 朱朝伟 赵立山

北京日邦印刷有限公司印刷 新华书店北京发行所发行
2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm × 1168mm 1/32 印张: 9.75

字数: 180 千字 印数: 1~6 000 册

定价: 48.80 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

主 编	肖培根	杨世林
副主编	连文琰	刘玉琇
编 者	连文琰	刘玉琇
	林余霖	李葆莉
	潘瑞乐	
摄 影	刘玉琇	林余霖
	顾志平	张效杰
	郭绍荣	彭治章
	吴光弟	郑汉臣
	李延辉	高士贤
	严仲铠	巫金华





序

中医中药是中华民族优秀的文化遗产，在长期实践中，形成自己独特的理论体系和诊治方法，特别是对人体的病理状态和亚健康状态能发挥出多层次、多靶点的整体治疗和调整作用，也就是通常所说的“有病治病，无病防病”的医疗防治作用。由于其疗效确切，正确使用不具或很少具有毒、副作用，因而，在“人类要回归大自然”思潮的影响下，愈来愈受到国际上的重视和青睐。

中草药则是中医用来防治疾病和医疗保健的物质基础，是中华民族几千年来与自然和疾病作斗争、经过亿万人的亲身体验所精选出来的有效武器，是一个伟大的宝库。对这个伟大宝库，一方面要很好地开发利用，另一方面又要很好地加以保护，做到资源的可持续利用。其中最为基本的，首先是要正确地去认识这些中草药，《实用中草药原色图谱》（1~4册）便是为了这个目的应运而生的。

《实用中草药原色图谱》是我们多年来对中草药进行实地调查研究的成果。全书4册，收集常用中草药总计632种。前3册主要是常用中药，《中华人民共和国药典》中的种类，基本上均已收集在内，

第四册则是常用的草药180种。每种均分品名、来源、原植物、采收加工、药材性状、性味功能、主治用法以及附方等简要地叙述。

本书所收集的
图片,真实可靠,大都均
是在产地拍摄,如实地反映了这
些中草药的生态环境,药材照片均选自
正名,具有一定的代表性。本书取名为《实
用中草药原色图谱》,希望能对读者在中草药的
利用和保护方面发挥应有的作用。同时也要严肃
地指出:在中草药的临床使用方面,必须要在医生的
指导下进行,以免产生不良后果。

总之,本书对从事中药及生物资源的生产、科研、教
学、经营的专业人员,甚至对这方面有业余爱好的人员均
是一部很好的参考书。

衷心希望广大读者对本书不吝指正。

中国工程院 院士
中国医学科学院 名誉所长
药用植物研究所
世界卫生组织传
统医学合作中心 主 任

肖培根 教授

2001年2月5日



编写说明

《实用中草药

原色图谱》(以下简称《图

谱》),全书收载植物药632种,为了

鉴别和比较,全书共分四册。第一册为根及

根茎类(144种),第二册为花类及种子果实类(166

种),第三册为全草类、叶类、皮类、藤本类、树脂类、

藻菌类及其他类(142种),第四册为草药类(180种)。每

种中草药除文字描述外,均附上植物和药材彩色照片(草药除
外)。书后附有药材、原植物的药名、植物名及植物拉丁学名索引。

1.《图谱》中每种中草药均按正名(以药材名为主,个别草药
则以植物名为正名)及汉字拼音,文字描述按来源、原植物、采收加
工、药材性状、性味功能、主治用法、附方等项的顺序编写。

2.来源:记载该中草药所属的科名(包括科的拉丁学名)及该中草
药的原植物名称或多来源的原植物名称和药用部分,如中药淫羊藿,其原
植物来源有心叶淫羊藿、箭叶淫羊藿、柔毛淫羊藿、巫山淫羊藿等的全草。

3.原植物:由于植物图片及《图谱》篇幅的原因,不能全部收载;该
中草药若有2种以上的多来源原植物,也只收载1~2种,如上述中药淫
羊藿有4种原植物,仅收载心叶淫羊藿和箭叶淫羊藿等2种植物。

原植物项下包括原植物名称、别名、植物拉丁学名、植物形态、生
境分布等内容。

植物名称:以中草药常用的原植物名称为准,如中药广豆根,原
植物为越南槐。

别名:全国各地的地方名称较多,只记载常见的别名,并注
明其省(区),以示不同省(区)的不同名称,对应用中草药有
所帮助。

拉丁学名:除植物拉丁学名的正名外,如有常用拉
丁学名的异名,则在正名后用括号或方括号加以注
明。

植物形态:主要描述中草药原植物
的形态特征(包括药用部分),如
有并列品种,则重点记

述其与前种形态上

的主要区别点。形态描述的高

度、长度、宽度均采用m(米),cm(厘

米),mm(毫米)。

生境分布:生境是指植物在野生状态的生长环境。了解和掌握其植物生长环境,对采集中草药有所帮助。

分布也是指野生植物的自然分布区域或注明是否为栽培植物。

4.采收加工:重点记载该中草药的采收季节、采收和加工方法,以及野生品和栽培品的不同采收时间,并对某些药材简要地介绍其炮制的方法,以保证其药材质量或减轻其毒性。

5.药材性状:简要记述该中草药药用部分的外部形态特征、形状、大小、色泽、质地、断面、气味等内容的药材特征。

6.性味功能:此为中医用药的准则,先写味,后写性。功能只写该药本身的主要作用,不写与其他药物配伍后的效用。对某些有毒中草药,在此项下内,按毒性大小,写明有毒、小毒、大毒等,以便在利用时引起注意。

7.主治用法:主治一般只记载该中草药所治的主要病症,但中医治病多采用复方,故也包括某些以该药为主与其他药物配伍后的主要病症。用法:除浸酒服、研粉吞服、冲服、入胶囊吞服或入片剂服或鲜品捣汁服,以及外用鲜品捣烂外敷或干品研末撒敷或水煎熏洗等加以写明外,其余未写明用法的均为水煎服。用量是指该中草药(干品)成人每日的常用量,附方中的用量亦是如此,但不限于此量,要根据具体的病情,酌情增减。对某些中草药有其特殊作用的,也注明不宜与甘草同用,并写明孕妇及体虚寒者忌用。剂量单位:采用g(克),mg(毫克),kg(千克),或采用ml(毫升),时间单位:采用h(小时),min(分钟)。

8.附方:主要征集广大群众和医务工作者从临床实践中总结出来的简验的方药,也收载中医临床常用的方剂及有关中草药书籍。附方主治病症,中西医结合名均予采用。在临床选用时,一定要结合患者病情的轻重等不同情况作为辨证论治的依据。



目 录

序
编写说明

一、全草类


1 三白草	12	20 亚乎奴	50
2 大蓟	14	21 肉苁蓉	52
3 广藿香	16	22 灯心草	54
4 广金钱草	18	23 寻骨风	56
5 小蓟	20	24 杜衡	58
6 马齿苋	22	25 苏败酱	60
7 马鞭草	24	26 连钱草	62
8 木贼	26	27 伸筋草	64
9 车前草	28	28 鸡骨草	66
10 牛至	30	29 青蒿	68
11 石韦	32	30 苦地丁	70
12 石斛	34	31 委陵菜	72
13 北败酱	36	32 垂盆草	74
14 北刘寄奴	38	33 佩兰	76
15 仙鹤草	40	34 金佛草	78
16 半边莲	42	35 金钱草	82
17 半枝莲	44	36 鱼腥草	84
18 地锦草	46	37 泽兰	86
19 老鹳草	48	38 卷柏	88



39 细辛	90	53 淡竹叶	120
40 荆芥	92	54 断血流	122
41 南刘寄奴	94	55 扁蓄	124
42 茵陈	96	56 紫苏	126
43 香薷	98	57 紫花地丁	128
44 穿心莲	100	58 锁阳	130
45 鸭跖草	102	59 鹅不食草	132
46 积雪草	104	60 蒲公英	134
47 透骨草	106	61 豨莶草	136
48 浮萍	110	62 墨旱莲	138
49 益母草	112	63 薄荷	140
50 甜地丁	114	64 瞿麦	142
51 麻黄	116	65 翻白草	144
52 淫羊藿	118	66 藿香	146

二、叶 类

67 大青叶	148	73 枸骨叶	162
68 艾叶	152	74 荷叶	164
69 石楠叶	154	75 臭梧桐叶	166
70 芙蓉叶	156	76 桑叶	168
71 枇杷叶	158	77 银杏叶	170
72 罗布麻叶	160		





三、皮 类

78 土荆皮	172	87 牡丹皮	190
79 云实皮	174	88 苦楝皮	192
80 五加皮	176	89 厚朴	194
81 白鲜皮	178	90 香加皮	196
82 地枫皮	180	91 秦皮	198
83 地骨皮	182	92 海桐皮	200
84 肉桂	184	93 桑白皮	202
85 合欢皮	186	94 黄柏	204
86 杜仲	188	95 椿皮	208

四、藤 木 类

96 大血藤	210	107 鸡血藤	232
97 川木通	212	108 青风藤	234
98 小通草	214	109 侧柏	236
99 天仙藤	216	110 油松节	238
100 石南藤	218	111 降香	240
101 西河柳	220	112 钩藤	242
102 关木通	222	113 鬼箭羽	244
103 苏木	224	114 首乌藤	246
104 皂角刺	226	115 络石藤	248
105 沉香	228	116 桂枝	250
106 忍冬藤	230	117 桑枝	252

118 桑寄生	254	120 槲寄生	258
119 通草	256	121 檀香	260

五、树脂类

122 血竭	262	124 松香	266
123 安息香	264	125 枫香脂	268

六、藻菌类

126 马勃	270	130 茯苓	278
127 冬虫夏草	272	131 海藻	280
128 灵芝	274	132 猪苓	282
129 昆布	276	133 雷丸	284

七、其他类

134 儿茶	286	139 桉叶油	296
135 干漆	288	140 海金沙	298
136 五倍子	290	141 棕榈板	300
137 芦荟	292	142 樟脑	302
138 青黛	294		

药名、植物名索引	304
拉丁学名索引	309
参考文献	312



三白草

Sanbaicao

一、全草类

来源 本品为三白草科 (Sanruraceae) 三白草的全草或根茎。

原植物

三白草 别名：过塘藕（江西、福建、广东、广西），白水鸡（福建），三点白、水牛草（江西），大水白（浙江），白面姑（广西、贵州）。

Saururus chinensis (Lour.) Baill.

多年生草本，高30~80cm。根状茎粗壮，白色。茎直立，基部匍匐状，节上常生不定根。叶互生，纸质，叶柄长1~3cm，基部与托叶合生为鞘状，稍抱茎；叶卵形或卵状披针形，长5~12cm，宽3~6cm，先端渐尖或短渐尖，基部心形或耳状，全缘，基出脉5。总状花序1~2枝顶生，与叶对生；花序有2~3片乳白色叶状总苞，花序轴和花梗有短柔毛；花小，两性，无花被，生于苞片腋内，苞片卵圆形，边缘有细毛；雄蕊6，花丝与花药等长；雌蕊由4个合生心皮组成，子房上位，圆形，柱头4，向外卷曲。果实分裂为4分果，分果片近球形，有多疣状突起，不开裂。种子球形。花期5~7月。果期8~9月。

生于沟旁溪畔及沼泽地等低潮湿处。

分布于河北、山西、陕西及长江流域和以南各地区。

采收加工 四季均可采挖全草，根茎秋季采挖，洗净，晒干或鲜用。

药材性状 根茎圆柱形，节处膨大，常有须根，节间长1.5~2cm，直径5~8mm。茎淡棕色，有纵沟纹，直径2~5mm，节间长3~6cm。叶互生，多皱缩破碎，完整叶片展平卵形或卵状披针形，先端渐尖或短渐尖，基部心形，上面棕绿色，下面灰绿色。茎顶有时有总状花序残存。气微，味淡。

性味功能 味甘、辛，性寒。有清热解毒，利尿消肿的功能。

主治用法 用于尿道感染，尿路结石，肾炎水肿，黄疸，脚气，白带过多，支气管炎，流火。外用于疮痍肿痛，皮肤湿疹。用量15~30g。外用鲜品适量捣烂敷患处。

附 方

①尿道感染（热淋），血淋：三白草15g，车前草、鸭跖草、白茅根各30g。水煎服。

②浮肿，小便少：三白草、车前草各30g，桂枝4.5g。水煎服。

③风湿痹痛：三白草15g，桑枝30g，制首乌4.5g，威灵仙9g。水煎服。

④赤白带下：三白草、水芹、鸡冠花各15g。水煎服。



⑤高血压：三白草 15~30g。水煎服。

⑥下肢流火（丹毒）：三白草 15g，牡丹皮、生地、黄柏各 9g。水煎服。

⑦细菌性痢疾：三白草、马齿苋各 30g。水煎服。

⑧痢疾初起：三白草 15g，鱼腥草 30g。水煎服。另取三白草叶加桐油适量，捣烂敷患处。

2 大

薊

Daji

来源 本品为菊科 (Compositae) 植物大薊的全草。

原植物

大薊 别名：大刺刺菜（山东），将军草（江苏），野红花（浙江），土红花（四川），山萝卜（广西）。

Cirsium japonicum DC.

多年生草本，高达100cm。根长纺锤形或长圆锥形，簇生。茎直立，有白色或黄褐色丝状毛。基生叶有柄，叶倒披针形或卵状椭圆形，长12~28cm，宽5~8cm，羽状深裂，裂片5~6对，边缘齿状，齿端有刺，上面疏生丝状毛，下面沿脉有丝状毛；中部叶无柄，基部抱茎，羽状深裂，边缘有刺；上部叶渐小。头状花序单一或数个生于枝端集成圆锥花序；总苞钟状，有丝状毛；总苞片4~6层，线状披针形，外层较小，先端有短刺，最内层较长，无刺；花两性，全为管状花，花冠紫色或紫红色，长达2cm，5裂；雄蕊5，花药先端有附片，基部有尾。瘦果长椭圆形，长约4mm，冠毛羽状，暗灰色，短于花冠。花期5~8月。果期6~8月。

生于荒野、山坡或路旁等。

分布于河北、陕西、甘肃、山东及长江以南各地区。

采收加工 夏、秋季割取地上部分，去净杂质，晒干。

药材性状 全草长约1m。茎圆柱形，上部分枝，直径0.5~1.5cm，褐色或绿褐色，有纵棱，密生灰白色毛；质松脆，断面黄白色，髓部白色，中空。叶绿褐色，皱缩，破碎，边缘有黄白色针刺，两面向白色毛。头状花序顶生，圆球形或椭圆形，总苞黄色，苞片披针形，4~6层，管状花多脱落，羽毛状，黄白色。气微，味淡。

性味功能 味甘、苦，性凉。有凉血止血，散瘀消肿的功能。

主治用法 用于衄血，吐血，便血，尿血，崩漏，痈肿疮疖。用量9~15g。外用鲜品适量，捣烂敷患处。

附 方

①吐血，咳血：大薊、侧柏叶、白茅根、仙鹤草各9~15g。水煎服。

②功能性子宫出血，月经过多：大薊、小薊、茜草、炒蒲黄各9g，女贞子、旱莲草各12g。水煎服。

③肠痈：大薊、地榆各12g，茜草9g，牛膝15g，金银花、蒲公英各30g，水煎2次，将药液合并，6h1次，4次服完。



④便血：大蓟、地榆各12g，槐花6g。水煎服。

⑤乳腺炎：鲜大蓟、甜米酒各适量，捣烂外敷，干则更换。

⑥痈疽疮毒：鲜大蓟30g，捣汁内服或捣烂外敷。



广藿香

Guanghuoxiang

来源 本品为唇形科 (Labiateae) 植物广藿香的全草。

原植物

广藿香 别名：藿香、枝香、刺蕊草 (广东)。

Pogostemon cablin (Blauco) Benth.

一年生草本，高30~60cm。茎直立，有分枝，有毛，老茎外皮木栓化。叶对生，叶柄长1.5~4cm，有毛，叶揉之有清淡特异香气，卵圆形或长椭圆形，长4~9cm，宽3~7cm，先端短尖或圆钝，基部宽楔形，稍不对称，边缘有不整齐粗钝齿，两面均有毛，上面较密，叶脉于上面凸起，腹面稍凹下，有的紫红色。轮伞花序密集，基部有间断，组成顶生和腋生的穗状花序式，长2~6cm，有总花梗；苞片狭，椭圆形，长5~6mm；花萼筒状，长7~8mm，外有绒毛，萼齿4，急尖；花冠淡红紫色，长约1.3cm，花冠筒伸出花萼外，冠檐近二唇形，上唇3裂，下唇全缘；雄蕊4，伸出花冠外，花丝有髯毛。花期4月。但中国产者少有开花。

栽培于平原田间或丘陵地。

分布于福建、台湾、广东、海南、广西等省、自治区。

采收加工 插条繁殖，不同产地，采收季节及方法有所不同。广州郊区一般4月种，次年6月采，肇庆地区一般2月种，当年12月采收；海南省生长期为5~7个月，当年即可采2次（7月、11月各采收1次），采收后2~3天内，日晒夜闷，再晒至全干。

药材性状 全株长30~60cm，分枝多，枝条稍曲折。茎方形，直径0.2~0.8cm，中心有髓，枝梗有柔毛，灰褐色、灰黄色或带红棕色，节间长3~12cm，老茎有栓皮，直径1~1.2cm，断面近圆形。叶对生，皱缩成团，多聚集于枝条上部，叶片灰绿色。灰褐色或棕褐色，两面均有灰白色毛茸。叶柄长2~4cm，有柔毛。叶片展开后卵圆形或椭圆形，长4.5~9cm，宽3~7cm，先端短尖或圆钝，基部楔形，边缘有不整齐钝齿。有弱而特异香气，味淡。

性味功能 味辛，性微温。有散邪化湿，和中止呕，理气开胃的功能。

主治用法 用于夏伤暑湿，寒热头痛，胸脘满闷，呕吐泄泻，腹痛纳呆，感冒夹湿。用量3~9g。阴虚火旺，舌绛光滑者不宜应用。

附方

①脾湿郁滞，中气不运，脘腹胀满，食少作恶，大便溏薄等：广藿香、厚朴、苍术、半夏、陈皮、甘草等。水煎服。