


中国野生动物集锦 6

上海教育出版社




《中国野生动物》一百多种的彩色照片，分集出版。第六集16幅，包括哺乳类的四川猴、豚尾猴、白头叶猴、灰叶猴、熊猴、懒猴、黑长臂猿、白掌长臂猿、熊狸、貂熊、石貂、海豹、穿山甲、雪兔、獐等15种和两栖类的虎纹蛙1种。可供初级中学动物学教学和一般爱好动物的读者参考用。



忻丁诚摄影 余家瑛 洪波编文 上海教育出版社出版 上海书店上海发行所发行 上海市印刷一厂印刷 (全套16幅) 定价: 0.19 元
开本 787×1092 1/64 印张 0.5 1984年1月第1版 1984年1月第1次印刷 印数: 00,001—23,500 统一书号: 7150·图片1796





懒 猴 Slow loris

懒猴 *Nycticebus coucang* (Boddaert) 懒哺乳纲, 灵长目, 懒猴科。是一种小型的地懒猴类。体长约 36—45 厘米, 尾长约 21—24 厘米。头圆, 耳小。眼大而圆。皮毛棕灰色。从头顶部位后直到颈部, 有一条棕褐色背线。腹面灰白色。眼、耳都有黑

圈环纹。四肢粗短。

懒猴在热带、亚热带森林中, 夜间性, 动作迟缓。吃小鸟、昆虫和果实。

在我国, 分布于云南西双版纳和西南部。



此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

穿山甲 Chinese pangolin


穿山甲 *Manis pentadactyla Linnaeus* 又叫鳞鲤、鳞鲤鱼、鳞甲目、穿山甲科。体除腹部外,和尾部都披满鳞片。体长12—30厘米,尾扁而粗,长约20—35厘米。腹部毛灰白色,头小,耳廓也小。舌有大量粘液,圆而极长,能伸出口外很长。取食蚁类。四肢短,有长爪,舌挖土抓开蚁巢。

栖息在山麓、丘陵、平原等处潮湿的杂树林中。夜间、白天

都用泥土堵塞。夜行性,动作灵活,能爬树。受惊时常将身体卷成球状,把头隐藏起来,用坚硬的鳞片来保护自己。主要吃各种蚁类,也吃蜜蜂和其他昆虫。通常雌雄同居。1—5月间交配,孕期约4个月,每胎产1—2仔。

在我国,分布于南方各地。





虎纹蛙 Asian bullfrog

虎纹蛙 *Rana tigrina tigrina* (Wiegmann) 属内塘蛙，无尾目，蛙科。雄蛙体长约10厘米，雌蛙体长可达30厘米以上。吻较平展，无背侧褶。背面皮肤粗糙，布满大小不一的疣粒。有的疣粒长，似棒状。腹侧皮肤光滑。趾间有全蹼。雌蛙咽喉下有1对外声囊。前肢粗壮，握力发达。体背黄绿色，略带棕色，有不

规则的斑纹。腹面白色。四肢有明显的棕黑色横斑。

生活在近山的旷野、水田、池塘等处。白天隐藏在穴中，夜间活动。主要吃各种昆虫，也吃其他小型的蛙类。在福建，1月间产卵。蝌蚪生活在水田或静水处内，底栖。

在我国，分布于长江流域及其以南地区。






麋 Chinese river deer

麋 (*Eludropterus sinensis*, Swinhoe) 又叫牙麋, 属鹿科。偶蹄目。鹿科。是一种中型鹿。体长约150厘米, 肩高约100厘米, 体重约150斤。雌雄皆都没有角。雄兽上唇内发达, 向上延伸, 突出口外。四肢强壮有力。全身土色棕黄, 腹毛较浅, 呈淡黄褐色。

麋是在长江中下游的河湖岸边。冬季为黄棕黄色, 常发现它们生活在广阔的田野湖沼或者四德里。性温和, 嗅觉敏锐, 奔跑冲撞能力很强, 每年二、三月分娩, 每产一、二仔。广泛分布在我国长江流域各省。



此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com



雪兔 Snow hare

雪兔 *Lepus timidus timorensis* 通称雪兔、兔狍目、兔科 体 活动、成树穴、攀援和草中掘洞。每年可产2—3枚。每胎1—3仔，较大，长约20厘米。毛色随季节而变化。夏毛为褐色，冬毛白色。冬到10月—早期12月左右。

在我国，产于新疆、内蒙古、黑龙江的北部地区。

栖息在森林边缘和荒林地带。白天隐藏在洞穴中，黄昏以后



熊 狸 Buntarong


熊狸 (*Arctictis buntarong* B. & C.) 属哺乳纲、食肉目、灵猫科。体健壮，毛长而密。全身黑色，耳部有浅棕色。耳廓棕黄色，耳末端有黑毛。体长与尾长相等，各约二厘米。

生活在热带的大森林中。树栖，能立于地，还有在爬能力。

可用它在树枝上辅助行动。昼伏，夜出。吃小型鸟、兽和昆虫，也吃野果和嫩叶。

在我国，分布于云南南部。





貂 熊 Glutton

貂熊 *Uncia uncia* Linnaeus 又叫熊獾、褐熊黄啊、百肉目、藏豹。是熊科动物中最大种类之一。体长约 1.5—2 厘米，尾长约 1 厘米，体重约 10—15 公斤。全身棕褐色，腹部较淡，呈棕色。体后侧的上色也较淡，四肢和腹部呈黑色。四肢粗壮，掌宽大，趾长而弯曲。

栖息在北方森林地区的悬崖下或是石间。多夜间活动，独来独往。性机警，残暴。喜食。食肉和素食。主要吃松鼠、野兔、野兔，也常从树上跃下袭击中小型鹿类和狐狸等。春季交配，妊娠期 5 个月，每胎产 2—3 仔。

在我国，分布主要是在新疆北部。



此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com