

常用處方集



新醫書局發行

常用處方集

書號：0231

著者	李定
增訂	李潔
出版	新醫書局 杭州馬市街醫園弄四號
發行	新醫書局 上海漢口路六二七號 北京宣內大街八五號
印刷	新醫印刷廠 杭州肅儀巷二四號

一九四七年十二月初版

11001—13000

一九五二年八月六版

定價人民幣二萬二千元

增訂三版弁言

足。這逐者以。其氣的方其仍酌用
不了。以能讀可跡但如藥處使但參運
僅理，所不對為痕，例新複法，活
僅整，這因展少，等繁設要况靈
間新！稿面但，進太的君較力需情，
時從度書後，利的然視藥比極際例識。
版要速的在刪便面固忽白個方實病知誤
二需的有加增的方料可，十處的別本錯方
訂又步原能底份用材不素幾些師個基的地
增在進用祇澈部應的是徵及這醫據的一的教
書現學利的的有物補却金以，床根面萬評指
本，科了訂章也藥增性，紹臨者方免批候
這年見為增逐乎見次要素用介合讀物庶受敬
兩可次章似窺這重徵應的適望藥，地

公元一九五〇年十月十日

增訂弁言

常用處方集爲已故李定教授平生得意之作，十餘年來夔聲全國，醫界奉爲圭臬。氏於民十八九年間編輯此書，已有如許豐富之成就，非學驗廣博，曷足臻此。

但學術時有進步，迺顧近十餘年來之新醫藥，尤有長足進展。昔日之認爲豐富完全者，今日則已有不同之評價。除非加以澈底之增補，殊不足以適合今日之需要。職是之故，爰將本書增入新藥新方，俾使本書內容能與時代並進，不脫節，不落伍。

原書除附編外，共計三十三章；增補後加入化學治療及內分泌各一章，共計三十五章。其中解熱劑章增改爲解熱治癘劑；止癩劑增改爲治癩劑；補血強壯劑增改爲補血強壯滋補劑；腳氣劑增改爲維生素劑；消毒劑增改爲消毒防腐劑；局部麻醉劑增改爲麻醉劑等。至其他各章亦略有增入。原書處方共計 595 個，增訂後共計 692 個，較原書增多 187 個處方。附編中急性中毒及其處置項下增入磺胺類中毒一節。

增入之新藥名詞，大都未經審定，爰採用較爲通用者列入。若干成藥則採用各藥廠之譯名或逕以原名列入。

脫稿之後，校讀一遍，深覺未免有續貂之譏。對於新藥之未經列入者尙多，但多屬於同類製品，學者已可由此而窺其餘。至於其他遺漏之處，恐亦不免，尙望識者不吝指正。

常用處方集

目 錄

第 一 章	清涼劑	1—3
第 二 章	解熱治瀉劑	4—15
第 三 章	健胃劑	16—26
第 四 章	鎮吐劑	27—29
第 五 章	催吐劑	30—31
第 六 章	瀉下劑	32—41
第 七 章	止瀉劑	42—48
第 八 章	治痢劑	49—53
第 九 章	驅蟲劑	54—60
第 十 章	灌腸劑	61—63
第 十 一 章	胃腸洗滌劑	64—65
第 十 二 章	祛痰劑	66—76
第 十 三 章	鎮咳劑	77—80
第 十 四 章	息喘劑	81—84
第 十 五 章	吸入劑	85—86
第 十 六 章	含漱劑	87—89
第 十 七 章	強心劑及興奮劑	90—103
第 十 八 章	利尿劑	106—110
第 十 九 章	尿防腐劑	111—115
第 二 十 章	發汗	116—117

目 錄

第二十一章	止汗	118—120
第二十二章	止血	121—128
第二十三章	補血，滋補，強壯劑	129—145
第二十四章	結核劑	146—153
第二十五章	驅梅劑	154—166
第二十六章	鎮痛劑	167—176
第二十七章	催眠劑	177—181
第二十八章	鎮靜劑	182—188
第二十九章	化學治療劑	190—203
第三十章	麻醉劑	204—213
第三十一章	維生素劑	214—220
第三十二章	內分泌劑	221—229
第三十三章	消毒防腐劑	230—239
第三十四章	眼科	240—254
A.	點眼水	240—246
B.	眼軟膏	247—251
C.	眼散布料	252
D.	眼洗滌及電包科	253—254
第三十五章	耳鼻咽喉科方	255—263
A.	耳科方	255—258
B.	鼻科方	259—263
C.	咽喉科方	264—266
第三十六章	皮膚科及生殖器科方	267—288
A.	皮膚病方	267—283
B.	生殖器病科方	284—288

目 錄

附 編

(一)處方及處方箋	289—290
(二)處方箋中服法用語	290—293
(三)處方應用拉丁略語註解	293—297
(四)計量及記法	298—299
(五)對於小兒用藥之注意點(用量,矯 味,劑形)	300—301
(六)常備藥表	302—310
(七)毒藥表	310—313
(八)劇藥表	313—325
(九)極量對照表	326—335
(十)法定藥名與別名對照表	336—346
(十一)急性中毒及其處置	347—365
A. 急性中毒急救之概要	347—348
B. 急性中毒症候,急救及治療	349—365
(十二)配合禁忌一覽表	366—376
(十三)常用磺胺醯類藥物劑量表	377
內服藥時間表	378

常用處方集

第一章 清涼劑 Temperantia

第 1 方 鹽酸清涼(酸甜)水 Limonada hydrochlorica.

稀鹽酸 0.5 Acid. hydrochloric. dilut.
0.5

糖漿 10.0 Sirup. simpl. 10.0

餾水 加至 100.0 Aq. destill. ad 100.0

右一日量，三回分服。D. S 3 mal in 1 Tage.

主治 各種熱性病。

說明 本劑有清涼，止渴，助消化等作用。稀鹽酸量可增至 0.8—1.0。糖漿可改用橙皮或覆盆子糖漿 Sirup. Cort. Aurant. S. Rub. Id.

清涼水之配製，稀鹽酸之外，可用枸橼酸 Acid. Citric. (0.5%) 酒石酸 Acid-tartaric. (0.5) 稀磷酸 Acid. phosphor. dilut. (1%) 稀硫酸 Acid. sulfuric. dilut. (0.5%) 乳酸 Acid. lactic. (1%) 製之，而稱之為某酸清涼水，其中稀硫酸性者有止血作用，乳酸性者有止痢作用，可各因其宜而用之。

本方可伍下列諸藥。

1. 苦劑 Tinct. amar. 一回量 0.5—2.0
2. 杏仁水 Aq. Prun. armeniac 一回量 0.5—1.0

3. 莨菪酞 Tinct. Scopol. 一回量 0.5—1.0
4. 硫酸鎂 Magn. sulfuric. 一回量 5.0—10.0—30.0
5. 紅(葡萄)酒 Vin. rubr. 一回量 10.0—30.0
6. 狄茄令 Digalen 一回量 0.3—1.0—2.0
7. 康吡箭毒酞 Tinct. Strophanth. 一回量 2—10 滴
8. 番木鱉酞 Tinct. Strychn. (Vomicae) 一回量 5—20 滴
9. 波希鼠李流膏 Extract. Cascar. sagrad. fluid. 一回量 1.0—4.0
10. 麥角浸膏 Extract. Secal. Cornut. 一回量 0.05—0.2
11. 安替必林 Antipyrin. 一回量 0.3—0.5—1.0
12. 霹藍密藤 Pyramidon. 一回量 0.1—0.5
13. 鹽酸奎寧 Chinin. hydrochloric. 一回量 0.1—0.5—1.0
14. 阿片酞 Tinct. Opii 一回量 3—10—20 滴

例如熱性病人心機衰弱時可用下方。

第 2 方

稀鹽酸	0.5	Acid. hydrochl. dilut.	0.5
狄茄令	1.0	Digalen.	1.0
糖漿	10.0	Sir. simpl.	10.0
餾水	加至 100.0	Ap. dest,	ad 100.0

右一日量，三回分服。D. S. 3 mal in 1 Tage.

主治 各種熱性病人有心機衰弱之徵者。

說明 餘可類推，如便秘則伍以硫酸鎂，下痢

原
书
缺

原
书

缺

0.3

3. 薩羅耳 Salol. --回量 0.3—1.0—2.0
4. 霹藍密藤 Pyramidon. 一回量 0.1—0.5
5. 非那賽汀 Phenacetin. 一回量 0.3—0.5—1.0
6. 莨菪浸膏 Extract. Scopol. 一回量 0.02—0.05
7. 鹽酸海洛因 Heroin. hydrochloric. 一回量 0.002—0.005
8. 磷酸可待因 Codein. phosphoric. 一回量 0.005—0.02—0.05
9. 杜奧他耳 Duotal. 一回量 0.2—0.5

安替必林水劑可伍下列諸藥。

1. 溴化鉀 Kal. bromat. 一回量 0.5—1.0—2.0
2. 溴化鈉 Natr. bromat. 一回量 0.5—1.0—2.0
3. 杏仁水 Aq. Lauro-Cerasi 一回量 0.5—1.0—1.5
4. 安息香酸鈉咖啡英 Caffeino-Natr. benzoic. 一回量 0.1—0.5
5. 碘化鉀 Kal. jodat 一回量 0.1—0.5—1.0
6. 硫酸鎂 Magn. sulfuric. 一回量 5.0—10.0—30.0
7. 柳酸鈉 Natr. salicylic. 一回量 0.5—1.0—2.0
8. 重碳酸鈉 Natr. bicarbonic. 一回量 0.5

—2.0

9. 莨菪醇 Tinct. scopol. 一回量 0.5—1.0

第 6 方

靛藍密藤 0.3—0.5 Pyramidon. 0.3—0.5
乳 糖 1.0 Sacchar. lact. 1.0

右混和均分三包，M. f. pulv. div. in

一日三回，一回一 part aeq. No. 3

包。 S. 3 mal tgl. 1 Pulver.

主治 結核症之消耗熱，流行性感胃，傷寒，
風痺，頭痛，神經痛諸症。

說明 本品解熱作用，比安替必林強三倍，故
僅可用其三分之一量。

本方可伍下列諸藥。

1. 重碳酸鈉 Natr. bicarbonic. 一回量 0.5
—2.0

2. 澱粉酶 Diastase. 一回量 0.1—0.3

3. 杜奧他耳 Duotal. 一回量 0.2—0.5

靛藍密藤亦可製為水劑用之。

第 7 方

非那賽汀 0.3—0.5 Phenacetin. 0.3—0.5

右一包量，給同量 f. pulv. D. tal. dos. No. V.

五包，附澱粉囊，ad Capr. amylac.

一日三回。 S. 3 mal tgl. 1 Pulver.

主治 結核症發熱，流行性感胃。

說明 本方可伍下列諸藥。

1. 安替必林 Antipyrin. 一回量 0.3—0.5—
1.0

2. 薩羅耳 Salol 一回量 0.5—1.0—2.0
3. 鹽酸海洛因 Heroin. hydrochloric.
一回量 0.002—0.005
4. 磷酸可待因 Codein. phosphoric.
一回量 0.005—0.02—0.05
5. 溴化鉀 Kal. bromat. 一回量 0.5—1.0—
2.0
6. 溴化鈉 Natr. bromat. 一回量 0.5—1.0
—2.0
7. 重碳酸鈉 Natr. bicarbonic. 一回量 0.5
—2.0

第 8 方

愛爾邦錠

Elbon-Pastillen.

右給一管二十片， D. 1 Originalpackung zu
每片含1.0，一日三 20. je 1.0

四回，一回一片。 S. 3—4 mal tgl. 1 Stuck.

主治 慢性結核性發熱，肺炎。

第 9 方

邁雷汀 0.6 Maretin. 0.6

乳 糖 2.0 Sacchar. lact. 2.0

右混和均分六包， M. f. pulv. div. in
一日三回，一回一 part. aeq. No. 6

包。 S. 3 mal tgl. 1 Pulver.

主治 流行性感胃，結核症發熱。

第 10 方

鹽酸奎寧 0.3—0.5 Chinin. hydrochloric.
0.3—0.5

常用處方集

右爲一包，給同量 f. pulv. D. tal. dos.
 五包，一日二三回 No. V.
 一同一包，澱粉 S. 2—3mal tgl. 1 Pulver.
 紙包服或盛膠囊服 in Oblate od. Kapseln.
 用。 zu nehmen.

第 11 方

鹽酸奎寧 1.0 Chinin, hydrochloric. 1.0
 錫 水 8.0 Aq. destill. 8.0
 稀 鹽 酸 3滴 Acid. hydrochloric. Dil.
 Gtt III

覆盆子糖漿 加至 100.0 Sirup. Rub. Id. ad 100.0
 右混和一日數回， M. D. S. Mehrm. tgl.
 一同一茶匙。 1 Teelöffel.

第 12 方

鹽酸奎寧 3.0 Chinin, hydrochloric. 3.0
 麥芽浸膏(飴) 適量 Extract. Malt. q.s.
 右混和爲丸三十粒，ut f. pil. No. 30.
 服法依示。 S. Nach Verordnung.

第 13 方

鹽酸奎寧 2.0 Chinin, hydrochloric. 2.0
 阿 片 酊 0.5 Tinct. Opii 0.5
 亞拉伯樹膠漿 50.0 Mucilagin. Gumm.
 arabic. 50.0

右混和分二回灌腸。 M. D. S. zu 2 Klystieren.

主治 (凡鹽酸奎寧劑) 瘧疾，產褥熱，流行
 性感胃，敗血症，膿毒症，丹毒，肺炎。

說明 瘧疾於發作前六時間頓服 0.5-1.0-1.5
 卽第十方一至三包，第廿方五至十五丸。

產褥熱，敗血症，丹毒等症，一日二三回，一回三至五丸，流行性感胃，一日六至十丸分服，肺炎亦然，不能內服時，試以灌腸。

奎寧劑，鹽酸奎寧外硫酸奎寧 Chinin. sulfuric. 鞣酸奎寧 Chinin. tannic. 均為常用，但其作用較弱，故其用量須大，又二乙基炭酸奎寧 Chinin. Aethylcarbon 即歐奎寧 Euchinin 苦味極微，適用於小兒，婦人，神經過敏者。

第 14 方

硫酸奎寧	1.0	Chinin. sulfuric.	1.0
柯柯脂	6.0	Ol. Cacao	6.0

右混和為藥栓一個 ut f. suppos. D. tal.
 給同量三個，必要時一個。 dos. No. 3
 S. Bei Bedarf. 1 Zäpfchen.

說明 不能內服奎寧劑時用之。

第 15 方

歐奎寧	1.0	Euchinin.	1.0
-----	-----	-----------	-----

右為一包，給同量 f. pulv. D. tal. dos.
 十包，一日三回， No. X. S. 3 mal tgl.
 一回一包。 1 Pulver

主治 各種熱性病。

說明 鹽酸奎寧服後時見耳鳴，重聽，弱視，等副作用；而本品無之。

第 16 方

阿利斯安欣	1.0	Aristochin.	1.0
-------	-----	-------------	-----