



山蚂蝗

小叶3，顶生小叶椭圆状菱形，荚果通常具2荚节。



北京假报春

叶基生，心状圆形。花钟状，下垂，雄蕊着生于花冠管基部。



斑种草

子房4裂，形成4个小坚果，小坚果的腹面具横的凹陷。



曲花紫堇

茎基部丝状，绿色或下部带紫红色。花蓝色。



中国 野花图鉴

北京师范大学 教授
刘全儒 编著

权威专家笔下
中国最动人的自然之美

早开堇菜

花瓣5，蓝紫色，喉部紫红色淡并有紫色条纹，最下一瓣较大。



棣棠

小枝绿色，叶边缘有尖锐重锯齿，花黄色。



过路黄

本种匍匐，叶对生，叶片心形，花成对生叶腋，黄色。

山西出版传媒集团
山西科学技术出版社



中国 野花图鉴

刘全儒 编著



山西出版传媒集团
山西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国野花图鉴 / 刘全儒编著. —太原: 山西科学技术出版社, 2015.2

ISBN 978-7-5377-4357-0

I. ①中… II. ①刘… III. ①野生植物—花卉—中国—图集
IV. ①Q949.408-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 026142 号



中国野花图鉴

出 版 人: 张金柱
作 者: 刘全儒
出版策划: 张金柱
责任编辑: 郭丽丽
文图编辑: 张焱宏
美术编辑: 罗小玲
责任发行: 阎文凯
版式设计: 孙阳阳
封面设计: 垠 子

出版发行: 山西出版传媒集团·山西科学技术出版社
地址: 太原市建设南路21号 邮编: 030012

编辑部电话: 0351-4922134 0351-4922061

发行电话: 0351-4922121

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京艺堂印刷有限公司

网 址: www.sxkxjscbs.com

微 信: sxkjcbs

开 本: 710mm × 1000mm 1/16 印张: 20
字 数: 482千字
版 次: 2015年4月第1版 2015年4月北京第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5377-4357-0
定 价: 88.00元

本社常年法律顾问: 王葆柯

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

前言 >>



从神秘莫测的史前生物到飞翔的鸟类，从鱼到虫，从田地头不起眼的野花野草到美丽炫目的观赏花卉，有阳光雨露的地方就有植被和动物的繁衍及发展，它们创造着自然规律的发展变化，不断地改变着自然生态，将一个异彩纷呈、丰富多彩的大自然呈现在我们面前。本套丛书多角度展现了中国美丽的生物大世界，也展现了中国人运用智慧，利用自然，保护自然以及对大自然的深厚情感。

“中国之美·自然生态图鉴”丛书，包括《中国昆虫图鉴》《中国鱼类图鉴》《中国野菜图鉴》《中国野花图鉴》《中国观赏花卉图鉴》《中国恐龙图鉴》《中国鸟类图鉴》《中国蝴蝶与蛾类图鉴》《中国田野作物图鉴》《中国古动物化石图鉴》，共计10本，是国内首部大型辞典型自然科普图鉴，呈现了中国生命科学的研究新成果，是很有价值的生物工具书。

本套丛书由资深植物学、昆虫学、鱼类学、恐龙专家亲自撰稿，娓娓道来，科学权威。对于专业生物学家来说，研究大自然是他们一生的追求。对于普通人来说，自然的秘密更多地和青春、情感、记忆联系在一起，是一种情怀，是年少时笼中蝈蝈的鸣叫，是追捕蝴蝶的童真，是天空中鸟儿掠过的身影，是稻谷成熟的喜悦，也是“子非鱼，焉知鱼之乐”的辩论和思考，是人情的味道。这些味道，已经在中国人辛勤劳动和积累经验的时光中与丰富的情感混在一起，形成了中国人的生活态度和文化意象，如对土地的眷恋，对故乡的思念等。

本套丛书邀请了国内著名的写实插画团队绘制生物图片，栩栩如生，呼之欲出，可以直接让你叫出它们的名字。科技绘画为人类拓展着对生物的认识和反映，那艺术视觉的张力、记述场景的再现、融合着水土木的生态环境——反映着融合的生命力。艺术家们唯物辩证地认识生物世界，更有利于人类改造自然环境和创造生命力的发展空间。

目录

• Contents •



1 草本篇

- 2 阿尔泰狗娃花
- 3 抱茎小苦荬
- 4 篦苞风毛菊
- 4 刺儿菜
- 5 翠菊
- 6 大丁草
- 7 大吴风草
- 7 东风菜
- 8 飞廉
- 9 风毛菊
- 9 甘菊
- 10 狗舌草
- 10 狗娃花
- 11 高山蓍
- 12 和尚菜
- 12 华北蓝盆花
- 13 红凤菜
- 14 还阳参
- 14 黄鹌菜
- 15 碱菀
- 15 苣荬菜
- 16 绢茸火绒草
- 16 苦菜
- 17 魁蒿
- 17 蓝刺头
- 18 鳢肠
- 18 林荫千里光
- 19 零零香青
- 19 六棱菊
- 20 麻花头
- 20 猫儿菊

- 21 毛毡草
- 21 泥胡菜
- 22 牛蒡
- 23 匍茎栓果菊
- 23 蒲儿根
- 24 蒲公英
- 25 祁州漏芦
- 25 千里光
- 26 日本续断
- 26 三脉紫菀
- 27 砂旋覆花
- 27 山尖子
- 28 山马兰
- 28 山牛蒡
- 29 鼠麴草
- 29 桃叶鸦葱
- 30 兔儿伞
- 30 豨莶
- 31 狭苞橐吾
- 31 咸虾花

- 32 腺梗豨莶
- 32 小红菊
- 33 旋覆花
- 33 烟管蓟
- 34 烟管头草
- 34 夜香牛
- 35 一点红
- 35 一枝黄花
- 36 银背风毛菊
- 36 羽叶千里光
- 37 泽兰
- 38 珠光香青
- 38 紫菀
- 39 紫苞风毛菊
- 40 糙叶黄耆
- 40 草木樨
- 41 达乌里黄耆
- 42 大山黧豆
- 42 大猪屎豆
- 43 甘草
- 44 花苜蓿





- 44 苦参
- 45 蓝花棘豆
- 45 链荚豆
- 46 两型豆
- 46 米口袋
- 47 披针叶黄华
- 47 山野豌豆
- 48 歪头菜
- 48 直立黄耆
- 49 紫云英
- 50 白苞筋骨草
- 50 并头黄芩
- 51 百里香
- 52 板蓝(马蓝)
- 52 半蒴苣苔
- 53 薄荷
- 54 糙苏
- 54 草本威灵仙
- 55 丹参
- 55 吊石苣苔
- 56 地黄
- 57 返顾马先蒿
- 57 风轮菜
- 58 广防风

- 58 华北马先蒿
- 59 黄花列当
- 59 黄芩
- 60 活血丹
- 60 藿香
- 61 假杜鹃
- 61 角蒿
- 62 金疮小草
- 62 荆芥
- 63 九头狮子草
- 63 蓝萼香茶菜
- 64 列当
- 65 刘寄奴
- 66 柳穿鱼
- 66 马鞭草
- 67 毛麝香
- 67 母草
- 68 拟地皮消
- 68 牛耳草
- 69 山萝花
- 69 珊瑚苣苔
- 70 水苏
- 70 松蒿
- 71 穗花马先蒿
- 71 通泉草
- 72 透骨草
- 72 细叶婆婆纳
- 73 夏枯草
- 73 夏至草
- 74 香青兰
- 74 玄参
- 75 益母草
- 76 野芝麻
- 77 野菰

- 77 岩青兰
- 78 荫生鼠尾草
- 79 中国马先蒿
- 79 紫色翼萼
- 80 白芨
- 80 苞舌兰
- 81 北马兜铃
- 81 北乌头
- 82 翠雀
- 83 大花杓兰
- 83 杜鹃兰
- 84 二叶舌唇兰
- 84 高乌头
- 85 华凤仙
- 85 黄金凤
- 86 还亮草
- 86 灰绿黄堇
- 87 堇菜
- 88 两色乌头
- 88 牛扁
- 89 曲花紫堇
- 89 全叶延胡索
- 90 山梗菜





90 双花黄堇菜
91 手参
92 绶草
92 水金凤
93 乌头
93 蔓茎堇菜
94 西伯利亚远志
95 小黄紫堇
95 早开堇菜
96 窄萼凤仙花
96 珠果黄堇
97 竹叶兰
98 八角莲
98 巴天酸模
99 半夏
100 白头翁
101 百合
102 瓣蕊唐松草
102 北重楼
103 扁蓿
103 蝙蝠葛

104 叉分蓼
104 长瓣铁线莲
105 大百部
105 大火草
106 大戟
106 大叶铁线莲
107 独角莲
107 短尾铁线莲
108 杠板归
108 苍葱
109 红蓼
109 花蔺
110 华北繡斗菜
110 华北大黄
111 黄花铁线莲
111 黄油点草
112 黄精
113 火炭母
113 金线吊乌龟
114 金莲花
115 吉祥草

116 聚花草
116 类叶牡丹
117 狼毒
118 藜芦
118 铃兰
119 龙须菜
120 鹿药
120 驴蹄草
121 马蔺
121 绵枣儿
122 棉团铁线莲
122 七筋姑
123 荞麦叶大百合
123 拳蓼
124 芹叶铁线莲
125 乳浆大戟
125 山丹
126 射干
126 水鳖
127 酸模叶蓼





127 万寿竹
128 舞鹤草
128 小花草玉梅
129 小黄花菜
130 兴安升麻
130 鸭跖草
131 野慈菇
131 野鸢尾
132 淫羊藿
133 一把伞南星
133 有斑百合
134 银莲花
135 雨久花
136 玉竹
137 鱼腥草
137 掌裂叶秋海棠
138 泽泻
138 中华秋海棠
139 珠芽蓼
140 白花碎米荠
140 白屈菜
141 白鲜

141 白芷
142 草芍药
142 叉歧繁缕
143 柴胡
144 臭矢菜
144 粗根老鹳草
145 酢浆草
146 大苞景天
146 灯心草蚤缀
147 地榆
148 冬葵
148 短毛独活
149 钝叶瓦松
149 二月蓝
150 防风
151 翻白草
151 赶山鞭
152 狗筋蔓
152 河北石头花
153 荷青花
153 黑柴胡
154 红旱莲
154 华北八宝
155 黄蜀葵
156 虎耳草
157 荠菜
158 鸡眼梅花草
158 剪秋萝
159 角茴香
159 景天三七
160 卷耳
160 辽藜本
161 柳兰
161 柳叶菜
162 龙牙草

163 轮叶八宝
163 骆驼蒿
164 落新妇
164 牻牛儿苗
165 毛草龙
166 毛茛
166 毛蕊老鹳草
167 梅花草
167 千屈菜
168 全缘绿绒蒿
168 瞿麦
169 山酢浆草
169 山蚂蚱草
170 蛇莓
170 石生蝇子草
171 石竹
172 鼠掌老鹳草
173 水毛茛
173 水杨梅
174 糖芥
174 田麻
175 委陵菜
175 香花芥
176 小丛红景天
176 野西瓜苗
177 野罂粟





178 蝇子草
178 禹毛茛
179 元宝草
179 紫花碎米荠
180 白首乌
181 白薇
182 北京假报春
182 北鱼黄草
183 扁蕾
183 斑种草
184 齿缘草
184 糙叶败酱
185 赤虺
186 打碗花
186 大果琉璃草
187 党参
188 点地梅
188 鹅绒藤
189 二色补血草
190 飞蛾藤
190 附地菜
191 过路黄

191 红花龙胆
192 花锚
192 花葱
193 黄花龙牙
193 黄莲花
194 锦灯笼
195 桔梗
196 狼尾花
197 肋柱花
197 篱打碗花
198 鹿蹄草
198 萝藦
199 曼陀罗
200 蓬子菜
200 芹苳
201 秦艽
201 双蝴蝶
202 砂引草
203 天仙子
203 土丁桂
204 田旋花
205 勿忘草

205 狭叶珍珠菜
206 缬草
207 苔菜
208 胭脂花
208 羊乳
209 野海茄
209 异叶败酱
210 泽星宿菜
210 展枝沙参
211 獐牙菜
212 重楼排草
212 紫斑风铃草

213 木本篇

214 白背黄花稔
214 白花丹
215 地稔
216 红花岩黄耆
217 金锦香
217 苦马豆
218 罗布麻
219 木本香薷
219 山蚂蝗
220 肖梵天花
221 小槐花
221 紫金牛
222 白檀
222 扁担木
223 扁枝越橘
223 茶梨
224 怪柳
225 赤杨叶
225 稠李
226 刺玫蔷薇
226 刺五加
227 灯笼花

228 大花枇杷
228 豆梨
229 棣棠
230 杜鹃
231 杜梨
232 多花胡枝子
232 多花栒子
233 瓜木
233 光叶海桐
234 鬼箭锦鸡儿
234 河朔堯花
235 红花荷
236 红花锦鸡儿
237 厚皮香
237 胡颓子
238 胡枝子
239 花木蓝
239 花楸
240 黄花倒水莲
240 黄芦木

241 灰栒子
241 蕢子梢
242 檵木
242 金樱子
243 金缕梅
244 假鹰爪
245 阔叶十大功劳
245 了哥王
246 栲树
247 楞木石楠
247 蚂蚱腿子
248 满山红
248 毛樱桃
249 茅莓悬钩子
249 美丽茶藨子
250 美丽马醉木
250 美蔷薇
251 木荷
252 木莲
252 南烛



253 欧李
254 青莢叶
254 三裂绣线菊
255 三叶海棠
255 山矾
256 山荆子
256 山莓
257 山苍子
258 山桃
258 山楂叶悬钩子
259 山芝麻
259 山杏
260 沙枣
261 深山含笑
262 石斑木
263 栓叶安息香
263 土庄绣线菊

264 天女木兰	276 大花溲疏	288 流苏树
265 文冠果	276 大青	289 毛叶丁香
266 西北沼委陵菜	277 大叶醉鱼草	289 山梅花
266 细叶小檗	277 东陵八仙花	290 疏花卫矛
267 小果蔷薇	278 杜虹花	290 水团花
267 杨桐	278 多花野牡丹	291 太平花
268 野茉莉	279 粉红溲疏	292 桃金娘
268 野山楂	279 刚毛忍冬	292 虾子花
269 羊蹄躅	280 海州常山	293 小花溲疏
270 银露梅	281 红丁香	293 小叶白蜡
270 迎红杜鹃	282 黄牛木	294 圆锥绣球
271 照山白	283 鸡树条荚蒾	294 醉鱼草
271 中华绣线菊	284 金花忍冬	295 梾子
272 中华绣线梅	284 金丝梅	296 北清香藤
272 紫玉盘	285 金丝桃	296 常春油麻藤
273 珍珠梅	285 荆条	297 大茶药
274 白花苦灯笼	286 锦带花	298 单叶蔓荆
274 北京丁香	287 兰香草	298 杠柳
275 薄皮木	287 连翘	299 葛
275 臭牡丹		300 鸡血藤



300 络石
301 猕猴桃
302 蓬莱葛
302 五味子
303 锡叶藤
303 香花崖豆藤
304 玉叶金花
305 内容索引



Herbages

草本篇





阿尔泰狗娃花

Heteropappus altaicus (Willd.) Novopokr.

一般情况下，植物在新鲜时是许多动物争抢的美味，不过阿尔泰狗娃花非常不幸运，它在青翠嫩绿时无人问津，反而在干枯后成为一些动物的最爱。其实，这是由于阿尔泰狗娃花青翠嫩绿时植株内含有某些不适口的物质或具有不良气味导致的。

• **生境分布** 适应性强，广泛生长在荒漠、草原和草甸一带，在沙质地、田边、路旁及村舍附近也有生长。分布于我国内蒙古、陕西、山西、河北、湖北、四川、甘肃、青海、新疆、西藏等地。

• **形态特征** 多年生草本。株高20~40cm，全株被硬毛和腺点，茎多分枝；叶呈条形、条状长圆形、披针形或近匙形，两面疏生柔毛，全缘；头状花序单生枝端或排列成伞房状，舌状花淡蓝紫色，管状花黄色，上端5裂，其中1裂片较长；蒴果长圆状倒卵形，具白色或红褐色冠毛，且疏生粗毛。花期夏季，果期秋季。

• **野外识别要点** 狗娃花和阿尔泰狗娃花的区别：狗娃花头状花序较大，直径3~5cm，舌状花多，阿尔泰狗娃花的头状花序较小，直径1~3cm，舌状花少。



阿尔泰狗娃花



花朵



别名：阿尔泰紫菀

科属：菊科狗娃花属

用途：阿尔泰狗娃花富含精油成分，可利用水蒸气蒸馏提取，另外，这种植物也是劣等的饲用植物，羊、牛、马和骆驼等动物都是选择性食用。

抱茎小苦苣

Ixeridium sonchifolium (Maxim.) C. Shih

• **生境分布** 生长在海拔100~2700m的山坡、平原、林下、河滩地或岩石上。分布于我国东北、华北等地区，朝鲜、日本也有分布。

• **形态特征** 多年生草本。株高15~60cm，茎直立，单生或簇生，有白色乳汁，全株无毛；基生叶多枚，铺散状生长；茎生叶卵状椭圆形或卵状披针形，较小，顶端急尖，基部扩大成耳状或戟，抱茎极深，全缘或大头羽状裂；茎上部茎叶及接花序分枝处的叶心状披针形，常全缘；头状花序小，常聚生成伞房状，总苞圆筒形，苞片2层，外层5片，卵形，短小，内层常8片，披针形，较长；舌状花先端5齿裂，鲜黄色；瘦果成熟时黑色，冠毛白色，喙细而短。花果期3~5月。

• **野外识别要点** 在野外，抱茎小苦苣、苦菜和秋苦菜三种植物很容易混淆，区别时参考以下三点：①叶：抱茎小苦苣的基生叶最宽，短而圆，茎生叶基部抱茎，且有耳状裂片；苦菜的基生叶最窄，狭长形，茎生叶不抱茎；秋苦菜的最宽叶不是基生叶，而是中部或中部以上的叶。②花：抱茎小苦苣从春天至初夏开花，花深黄色，花药金黄色；苦菜从初春至秋末开花，花淡黄色，花药绿褐色；秋苦菜秋季开花。③果：抱茎小苦苣的果黑色，喙短于1mm；苦菜的果棕色，喙长约3mm；秋苦菜的果也是黑色，喙短于1mm。



别名：苦苣菜、苦碟子、秋苦苣菜、盘尔草

科属：菊科小苦苣属

用途：①药用价值：全草可入药，具有清热解毒，凉血活血的功效。②食用价值：嫩根和嫩叶可食用，味道微苦，可凉拌、蘸酱生吃，也可作馅。③饲用价值：茎叶柔嫩多汁，羊、牛、马、兔都可食。



篦苞风毛菊

Saussurea pectinata Bunge



紫色花

深裂，叶柄长可达17cm；顶裂片较大，侧裂片5~8对，边缘具齿或深波状，叶面绿色，被短粗毛，叶背淡绿色，有短柔毛和腺点；茎上部叶

羽状浅裂或不裂，常全缘，具短柄；头状花序顶生，数个排成伞房状花序，总苞钟状，花紫色，管部与檐部近等长；瘦果圆柱状，冠毛2层，污白色。花果期8~10月。



· **生境分布** 生长于海拔350~1900m的林下、路旁、草原和沟谷。分布于我国东北、华北、西北及山东、河南等地。

· **形态特征** 多年生草本。株高20~100cm，茎有棱，基部被褐色叶柄残迹，下部被短粗毛，上部疏生蛛丝状毛；基生叶花期枯萎，茎下部和中部叶卵形至椭圆形，大型，羽状

· **野外识别要点** 这种植物在野外比较常见，识别时注意：头状花序全为管状花，花紫红色，总苞的外层苞片叶质，边缘栉齿状，顶部有尖而反折的附片。



别名：无

用途：未详

科属：菊科风毛菊属

刺儿菜

Cirsium segetum Bunge



幼株

紫红色的管状花



叶齿端有硬刺

· **生境分布** 生长于平原、荒地、耕地、路边、村庄附近，为常见的杂草。分布于我国各地，朝鲜、日本也有分布。

· **形态特征** 多年生草本。株高20~60cm，有匍匐的根状茎，茎直立，有纵沟棱，通常无毛；叶互生，椭圆或椭圆状披针形，全缘或齿裂，齿端有硬刺，无柄；头状花序单个或2~3个生于茎顶，

成伞房状，总苞片披针形，顶端长尖，有刺；雌雄异株，管状花，紫红色；瘦果椭圆或长卵形，冠毛羽状。花期6~8月，果期8~9月。

· **野外识别要点**
①叶缘边有硬刺。②头状花序紫红色，苞片顶端有刺。

别名：小蓟、刺刺芽

用途：①药用价值：带花全草或根茎可入药，具有凉血止血、解毒消肿的功效，可治疗吐血、尿血、便血、创伤出血等症。②食用价值：嫩苗含胡萝卜素、维生素B₂、维生素C，可当野菜炒食或做汤。

科属：菊科蓟属

翠菊

> 花语：坚定的爱情，请相信我！

Callistephus chinensis (L.) Nees

翠菊原产我国，栽培历史悠久，到明清时代已培育出不少优良品种。1728年，翠菊传入法国，接着又被英国引种栽培，之后便相继走入世界各国。现在，翠菊经过杂交选育，花色更为丰富，新品种不断上市，已成为重要的观赏花卉。

• **生境分布** 生长于海拔1000~2000m的山地、草坡、水边、林阴处或公路边。分布于我国吉林、辽宁、河北、山西、山东及四川等地。

• **形态特征** 一年生或二年生草本。株高可达1m，茎直立，多分枝，被白色糙毛；叶互生，卵形、椭圆形或匙形，边缘具粗钝锯齿，叶面疏生短柔毛，上部叶近无柄；头状花序通常单生于茎顶，总苞具多层苞片，外层苞片倒状披针形、绿色叶状，中层苞片较短、淡红色，内层苞片更短；边缘舌状花一至数层，有紫色、蓝色、红色或白色；中央管状花，花冠5裂；瘦果呈楔形，浅褐色，冠毛2层，密生短毛。花期7~9月，果期9~10月。

• **野外识别要点** 一般情况下，人们习惯将中心为管状花、外部为舌状花的花卉称为野菊花。但在野生的菊科花卉中，翠菊的头状花序较大，且色彩美丽、多样，外层总苞片绿色叶状。



• 株高可达1m，被白色糙毛



花侧面观

花苞



茎多分枝

红色花植株部分图



边缘舌状花，颜色丰富

• 中央为黄色管状花

苞片多层

叶缘具粗钝锯齿

紫色花植株部分图

别名：八月菊、蓝菊、江西腊

科属：菊科翠菊属

用途：①景观用途：翠菊的矮生品种适宜盆栽和点缀花坛、花境，高秆品种常用于切花。②药用价值：夏、秋季盛花时采摘优良花朵，阴干备用，具有清热、解毒、消肿的功效，可治疗目赤肿痛、流感、头痛、麻疹等症。



大丁草

Gerbera anandria (L.) Sch.-Bip.

春型植株如果传粉不好，结果实极少，甚至不结；但球型植株的花为两性闭锁花，可自花传粉，结果实较多。

• **生境分布** 生长在海拔650~2580m的山坡、山谷、荒地、沟边等阴湿处。广泛分布于我国南北方各地，俄罗斯、日本、朝鲜也有分布。

• **形态特征** 多年生草本。植株分为春秋二型：春型植株较矮小，高不过15cm，根状茎短，簇生，粗而略带肉质；叶基生，呈莲座状，叶片通常为倒披针形或倒卵状长圆形，提琴状羽裂，顶裂片大，宽卵形，边缘具不规则圆齿，叶面被蛛丝状毛或脱落近无毛，叶背有白色绢毛；叶柄长2~4cm或有时更长，被白色绵毛；花葶单生或数个丛生，直立、纤细，棒状，被蛛丝状毛，头状花序单生花葶，总苞片约3层，外层线形，内层线状披针形，顶端均钝且带紫红色；中央管状花，外围的舌状花紫红色。花期4~8月。秋型植株高可达30cm，基生叶倒披针形，长可达16cm，裂片与春型相似，裂片背面有蛛丝状毛；头状花序较大，通常仅有管状花，为闭锁花结果实，冠毛淡棕色。花期7~8月。

• **野外识别要点** ①叶基生呈莲座状，但不具乳汁，叶脊有白色绢毛。②头状花序单生花葶，舌状花紫红色。



别名：无

科属：菊科大丁草属

用途：全草可入药，夏、秋季采收，洗净，鲜用或晒干，具有清热利湿、解毒消肿的功效，可治疗咳嗽、泻痢、热淋、风湿关节痛、蛇咬伤、烧烫伤等症。