

College Mathematics Guidance Series

大学数学学习辅导丛书

高等学校经济管理学科数学基础

主编 范培华 胡显佑

微积分中的 典型例题分析与习题

第三版

中国人民大学 朱来义 主编

高等教育出版社



College Mathematics Guidance Series
大学数学学习辅导丛书

高等学校经济管理学科数学基础

主编 范培华 胡显佑

微积分中的 典型例题分析与习题

WEIJIFEN ZHONGDE DIANXING LITI FENXI YU XITI

第三版



中国人民大学 朱来义 主编

高等教育出版社·北京

内容简介

本书是“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材《高等学校经济管理学科数学基础:微积分(第四版)》的配套辅导书,与主教材第四版的修订工作同步,也进行了相应的修订。为帮助读者系统地学习和掌握微积分的主要内容和基本方法,各章都提纲挈领地列出了基本概念、重要定理和主要结论。作为教材的扩充,本书精选了大量的例题和习题 A, B, C, 书末附有习题参考答案与提示。习题 A 是与各章节内容相配合的基本题与综合题,习题 B 是有一定难度的基本题与综合题,习题 C 是选择题。本书不仅适合于经济管理各学科本科生的学习需要,而且对于有志考研的读者,本书也不失为一本很有价值的复习用书。

图书在版编目(CIP)数据

微积分中的典型例题分析与习题 / 朱来义主编. --
3 版. --北京:高等教育出版社, 2015.6

(高等学校经济管理学科数学基础 / 范培华, 胡显佑
主编)

ISBN 978-7-04-042463-8

I. ①微… II. ①朱… III. ①微积分-高等学校-题
解 IV. ①O172-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 077422 号

策划编辑 张彦云 责任编辑 张彦云 封面设计 张楠 版式设计 于婕
插图绘制 宗小梅 责任校对 陈旭颖 责任印制 刘思涵

出版发行	高等教育出版社	网 址	http://www.hep.edu.cn
社 址	北京市西城区德外大街 4 号		http://www.hep.com.cn
邮政编码	100120	网上订购	http://www.landrac.com
印 刷	唐山市润丰印务有限公司		http://www.landrac.com.cn
开 本	787mm×960mm 1/16	版 次	2004 年 7 月第 1 版
印 张	36.25		2015 年 6 月第 3 版
字 数	660 千字	印 次	2015 年 6 月第 1 次印刷
购书热线	010-58581118	定 价	45.30 元
咨询电话	400-810-0598		

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物料号 42463-00

第三版修订说明

本书是《高等学校经济管理学科数学基础:微积分(第四版)》的配套辅导书,主教材入选“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材。本书第二版自2009年7月发行至今已有五年,不少同仁对这本辅导书中存在的问题提出了宝贵的意见。在此,我们对关心和支持本书的广大同仁表示衷心的感谢。

同主教材第四版的修订一致,本辅导书也作了相应的修订。这次修订工作主要是订正了原辅导书第二版中的疏漏以及排版印刷方面的错误。

参加这次修订工作的人员有:中国人民大学吴岚(负责第1,7章的修订工作及全书的审核工作);中国人民大学朱来义(负责第2,3,4章的修订工作);中国人民大学黄志勇(负责第5,6章的修订工作);中国人民大学范红岗(负责第8,9,10章的修订工作)。

我们衷心地希望本书能给读者以更大的帮助,同时盼望广大读者对书中的错误和问题给以批评和指正。

编者
2014年9月

第二版修订说明

作为“面向 21 世纪课程教程”——《高等学校经济管理学科数学基础：微积分(第三版)》的配套辅导书,与主教材第三版的修订一致,本书也作了相应的修订。这次修订工作主要体现在以下两个方面:

1. 订正了原辅导教材中的疏漏以及排版印刷方面的错误。

2. 第 5 章扩充了“基本积分表”,将“凑微分法”与“分部积分法”合成“凑微分法与分部积分法”,第 7 章增加了“空间直线”和“旋转曲面”方面的例题和习题,第 9 章删去了“高阶线性微分方程”方面的例题和习题,第 10 章删去了复杂的一阶和二阶常系数非齐次线性差分方程方面的例题和习题。

建议使用本辅导教材的读者能结合教材《微积分(第三版)》进行学习。当学完了教材的某一章内容之后,再进行辅导教材相应章节的学习,不仅能把握这一章的重点,而且可以了解所学内容的广泛应用。

我们衷心希望修订后的辅导书更便于读者阅读和使用,并且期盼它能够给读者以更大的帮助!同时也盼望读者对于书中的错误和问题给以批评指正。

编者
2009 年 2 月

第一版前言

由高等教育出版社出版,北京大学光华管理学院范培华教授和中国人民大学信息学院胡显佑教授主编的“高等学校经济管理学科数学基础”系列教材(包括《微积分》《线性代数》和《概率统计》),自2000年出版以来,赢得了众多的读者。并于2003年入选为高等教育出版社“高等教育百门精品课程教材建设计划”的项目。作为该项目的研究成果之一,我们编写了这本教学辅导教材。期望能对提高微积分的教学质量,对学生掌握微积分的教学基本要求起到一种辅助作用。

本书是与编者所编的《微积分》第一版和第二版(由高等教育出版社出版)(以下简称教材)配套的学习辅导教材。主要面向使用教材的学生,也可供使用教材的教师做教学参考书以及考研学生作复习之用。

本书按教材的章节顺序编排内容以便与教学同步。考虑到读者使用方便,编写时注意到使本书具有相对的独立性。

每章包括以下几部分内容:

一、内容要点

提纲式地归纳了每一章的概念、定理、公式、方法,并给出了一些常用的公式。

二、典型例题解析

按照每一章教学内容的顺序,我们选择了较典型的,能反映教学要求的例题进行解析。每道例题在解析时,先进行必要的分析,再给出解题过程。对于与例题密切相关的知识以“注”的形式介绍给读者。属于同一个知识点的一些例题之后都有一个“总结”以概括这部分内容的基本要求及注意事项。

所选用的例题,一部分是教材中较难的习题,一部分是与各章节内容相配合的典型例题,还有一部分是编者在教学过程中总结出的问题。

三、习题

按照每一章教学内容的顺序,每一章我们都配备了A、B、C三组习题。习题A是与各章节内容相配合的基本题与综合题,习题B是有一定难度的基本题与综合题,习题C是选择题。

另外,书末还附有习题参考答案与较详细的提示。

本书由教材的编者编写(按编写的章节次序排列):吴岚(第一、七章)、朱来

义(第二、三、四章)、范培华(第五、六章)、严守权(第八、九、十章)。

由于我们水平所限,书中难免有不妥之处,殷切期望同行们和广大读者给予批评指正。

编者

2004年3月

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010)58581897 58582371 58581879

反盗版举报传真 (010)82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号 高等教育出版社法务部

邮政编码 100120

目 录

第 1 章 函数	1
(一) 内容要点	1
(二) 典型例题解析	2
(三) 习题	22
第 2 章 极限与连续	27
(一) 内容要点	27
(二) 典型例题解析	28
(三) 习题	51
第 3 章 导数与微分	59
(一) 内容要点	59
(二) 典型例题解析	61
(三) 习题	99
第 4 章 中值定理与导数的应用	107
(一) 内容要点	107
(二) 典型例题解析	108
(三) 习题	158
第 5 章 不定积分	167
(一) 内容要点	167
(二) 典型例题解析	170
(三) 习题	224
第 6 章 定积分	231
(一) 内容要点	231
(二) 典型例题解析	232
(三) 习题	296
第 7 章 多元函数微积分学	304
(一) 内容要点	304
(二) 典型例题解析	308
(三) 习题	364

第 8 章 无穷级数	370
(一) 内容要点	370
(二) 典型例题解析	371
(三) 习题	411
第 9 章 微分方程初步	419
(一) 内容要点	419
(二) 典型例题解析	421
(三) 习题	452
第 10 章 差分方程	459
(一) 内容要点	459
(二) 典型例题解析	460
(三) 习题	474
习题参考答案与提示	477

第 1 章 函 数

(一) 内 容 要 点

1. 预备知识

实数,数轴,数轴上点的坐标,实数与数轴上点之间的一一对应关系;实数 x 的绝对值:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{当 } x \geq 0 \text{ 时,} \\ -x, & \text{当 } x < 0 \text{ 时,} \end{cases}$$

绝对值的几何意义,绝对值的性质;

实数全体 $\mathbf{R} = (-\infty, +\infty)$;

自然数全体 $\mathbf{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$;

整数全体 $\mathbf{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$;

开区间 $(a, b) = \{x \mid a < x < b\}$;

闭区间 $[a, b] = \{x \mid a \leq x \leq b\}$;

半开半闭区间 $(a, b], [a, b)$; 区间长度; 无限区间; 邻域, 去心邻域;

x_0 的 δ 邻域 $O_\delta(x_0) = (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$;

x_0 的 δ 去心邻域 $O_\delta(x_0) \setminus \{x_0\} = (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$;

∞ 的 M 邻域 $O_M(\infty) = \{x \mid |x| > M\}$.

2. 函数与函数的几何特征

变量,常量,连续取值变量,离散取值变量;自变量,因变量;函数,函数值,函数的定义域,函数的值域;两个函数相同的充要条件;函数的表示法,表格法、图示法、解析法,函数的解析表示式;分段函数,

取整函数:

$$[x] = n, n \leq x < n+1, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots,$$

取整函数 $[x]$ 的性质:

$$[x] \leq x < [x] + 1;$$

解析式表示的函数的定义域,定义域的求法.

单调递增,严格单增,单调递减,严格单减,单调函数;上界,下界,有上界函数,有下界函数,有界函数,无界函数;

奇函数 $f(x)$, 有

$$f(-x) = -f(x),$$

偶函数 $f(x)$, 有

$$f(-x) = f(x);$$

基本周期, 周期, 周期函数 $f(x)$, 有

$$f(x+T) = f(x).$$

3. 反函数、复合函数、隐函数

反函数; 严格单调函数必有反函数; $y=f(x)$ 与其反函数 $y=f^{-1}(x)$ 之间的关系:

$$f[f^{-1}(x)] = x, \quad x \text{ 属于 } f(x) \text{ 的值域,}$$

$$f^{-1}[f(x)] = x, \quad x \text{ 属于 } f(x) \text{ 的定义域;}$$

$y=f(x)$ 的图形与其反函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图形关于 $y=x$ 对称; 简单函数的反函数求法.

复合函数; 两函数 $y=f(u)$ 与 $u=g(x)$ 能复合成复合函数 $f[g(x)]$ 的条件; 复合函数的定义域; 简单函数的复合函数求法.

函数方程, 隐函数, 隐函数的显式.

4. 初等函数

基本初等函数:

常数函数 $y=C$; 幂函数 $y=x^a$; 指数函数 $y=a^x (a>0, a \neq 1)$; 对数函数 $y=\log_a x (a>0, a \neq 1)$; 三角函数: 正弦函数 $y=\sin x$, 余弦函数 $y=\cos x$, 正切函数 $y=\tan x$, 余切函数 $y=\cot x$, 正割函数 $y=\sec x$, 余割函数 $y=\csc x$; 反三角函数: 反正弦函数 $y=\arcsin x$, 反余弦函数 $y=\arccos x$, 反正切函数 $y=\arctan x$, 反余切函数 $y=\operatorname{arccot} x$.

基本初等函数的定义域, 基本初等函数的图形, 基本初等函数的几何特征.

初等函数.

5. 简单函数关系的建立

数学模型; 建立函数关系的方法.

经济学中常见的函数关系; 固定成本, 可变成本, 总成本; 产量, 销售量; 价格; 总收入; 总利润; 需求量, 需求函数; 供给量, 供给函数.

(二) 典型例题解析

1. 预备知识

例 1 设 (a, b) 是一个有限的开区间. 证明对任何 $x \in (a, b)$ 一定存在 x 的

一个邻域 $O_\delta(x) \subset (a, b)$.

分析 找 x 的邻域 $O_\delta(x)$ 关键是要找出 δ , 注意到 δ 与 x 到端点 a 和 b 之间的距离有关.

证明 对任何 $x \in (a, b)$, 有 $a < x < b$. 记 $\delta = \min\{b-x, x-a\}$, 则 $\delta > 0$. 下面我们来证明 $O_\delta(x) \subset (a, b)$.

由于 $O_\delta(x) = (x-\delta, x+\delta)$, 对任何 $t \in O_\delta(x)$, 有 $x-\delta < t < x+\delta$; 由于 $\delta = \min\{b-x, x-a\}$, 则 $\delta \leq b-x$, 从而 $x+\delta \leq b$, 由 $t < x+\delta$ 可得 $t < b$; 同样 $\delta \leq x-a$, 从而 $x-\delta \geq a$, 由 $t > x-\delta$ 可得 $t > a$. 因此 $a < t < b$. 这就证得 $O_\delta(x) \subset (a, b)$.

例 2 用区间表示下列点集:

(1) $\{x \mid x \neq 0\}$; (2) $\{x \mid 1 \leq |x-1| < 2\}$;

(3) $\{x \mid |x+1| > 0\}$.

分析 由绝对值的几何意义及数轴上点的位置关系可以将这些点集用区间表示出来.

解 (1) 由于实数全体为 $(-\infty, +\infty)$, 因此

$$\{x \mid x \neq 0\} = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty).$$

(2) 由 $|x-1| < 2$ 可得 $-2 < x-1 < 2$, 即 $-1 < x < 3$; 由 $|x-1| \geq 1$ 可得 $x-1 \geq 1$ 或 $x-1 \leq -1$, 即 $x \geq 2$ 或 $x \leq 0$. 将这些点在数轴上表示出来, 如图 1-1 所示.




图 1-1

因此

$$\{x \mid 1 \leq |x-1| < 2\} = (-1, 0] \cup [2, 3).$$

(3) 由绝对值性质可知 $|x+1| \geq 0$, 且 $|x+1| = 0$ 的充要条件是 $x+1=0$, 因此

$$\{x \mid |x+1| > 0\} = \{x \mid x+1 \neq 0\} = (-\infty, -1) \cup (-1, +\infty).$$

总结 区间是一个点集, 区间中的点既可以用不等式或等式表示, 也可以用数轴上的区间来表示. 掌握这两种表示是学习微积分的基础.

例 3 解绝对值不等式 $||x+1| - 2|x|| < 3$, 并用区间表示不等式的解.

分析 解此类不等式应先去掉绝对值符号. 易知 -1 和 0 分别为 $x+1$ 和 x 的零值点, 在 -1 和 0 的左右两侧, $x+1$ 和 x 分别改变符号. 故我们用 -1 和 0 两点将区间 $(-\infty, +\infty)$ 分为三个区间 $(-\infty, -1)$, $[-1, 0]$ 及 $(0, +\infty)$, 在此三个区间上分别讨论不等式的解.

解 设 $-\infty < x < -1$, 则原不等式化为 $|-x-1-2(-x)| < 3$, 即 $|x-1| < 3$. 而此不等式等价于 $-3 < x-1 < 3$, 故得 $-2 < x < 4$, 所以在 $(-\infty, -1)$ 上的解为 $(-2, -1)$.

设 $-1 \leq x \leq 0$, 则原不等式化为 $|x+1-2(-x)| < 3$, 即 $|3x+1| < 3$, 亦即 $-3 < 3x+1 < 3$, 由此得 $-\frac{4}{3} < x < \frac{2}{3}$, 所以在 $[-1, 0]$ 上的解是 $[-1, 0]$.

设 $0 < x < +\infty$, 则原不等式化为 $|x+1-2x| < 3$, 即 $|-x+1| < 3$, 亦即 $-3 < -x+1 < 3$, 由此得 $-2 < x < 4$, 所以在 $(0, +\infty)$ 上的解是 $(0, 4)$.

综上所述可得原不等式的解为 $(-2, 4)$.

例 4 解不等式 $\left| \frac{x-1}{x+2} \right| > \frac{x-1}{x+2}$.

分析 由于非负实数的绝对值等于其自身, 即当实数 $a \geq 0$ 时, $|a| = a$. 因此, 上述不等式若有解, 必有 $\frac{x-1}{x+2} < 0$.

解 所给不等式等价于 $\frac{x-1}{x+2} < 0$. 根据两个非零实数乘积的符号与商的符号相同, 因此它又等价于

$$(x-1)(x+2) < 0,$$

该不等式的解为 $-2 < x < 1$, 故原不等式的解为 $(-2, 1)$.

例 5 解不等式 $|2x+3| > |x-1|$.

分析 此不等式两边各只有一个含绝对值的非负项, 故可考虑两边平方以去掉绝对值符号.

解 不等式两边平方得

$$4x^2 + 12x + 9 > x^2 - 2x + 1,$$

即

$$(3x+2)(x+4) > 0.$$

由此得不等式的解为 $x > -\frac{2}{3}$ 或 $x < -4$, 即 $(-\infty, -4) \cup \left(-\frac{2}{3}, +\infty\right)$.

注 解绝对值不等式的基本思想是去掉绝对值符号, 而去掉绝对值符号的方法是灵活多样的, 主要是利用绝对值的定义和性质 (比如 $|a| \leq K$ 等价于 $-K \leq a \leq K$), 以及不等式两边同时平方.

例 6 证明: 若 $|x-1| \leq 1$, 则 $|x^4-1| \leq 15|x-1|$.

分析 $x^4-1 = (x^2+1)(x^2-1) = (x^2+1)(x+1)(x-1)$,

$$|x^4-1| = |x^2+1| \cdot |x+1| \cdot |x-1|,$$

因此只需估计 $|x^2+1| \cdot |x+1|$ 的范围即可.

由不等式 $|a+b| \leq |a| + |b|$ 得

$$|x| = |(x-1) + 1| \leq |x-1| + 1.$$

证明 由于 $|x| \leq |x-1| + 1 \leq 2$, 则 $x^2 + 1 \leq 5$, $|x| + 1 \leq 3$, 于是 $(x^2 + 1)(|x| + 1) \leq 15$, 故

$$\begin{aligned} |x^4 - 1| &= |x^2 + 1| \cdot |x + 1| \cdot |x - 1| \\ &\leq (x^2 + 1)(|x| + 1)|x - 1| \leq 15|x - 1|. \end{aligned}$$

例 7 证明: 对一切实数 a, b , 有

$$\max\{|a+b|, |a-b|, |b-1|\} \geq \frac{1}{2}.$$

分析 $\max\{x_1, x_2, x_3\}$ 表示 x_1, x_2, x_3 中的最大者, 利用

$$\max\{x_1, x_2, x_3, x_4\} \geq \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{4}$$

及绝对值三角不等式 $|x \pm y| \leq |x| + |y|$.

证明 $\max\{|a+b|, |a-b|, |b-1|\} \geq \frac{|a+b| + |b-1| + |a-b| + |b-1|}{4}$,

由于

$$\begin{aligned} |a+b| + |b-1| &\geq |(a+b) - (b-1)| = |a+1|, \\ |a-b| + |b-1| &\geq |(a-b) + (b-1)| = |a-1|, \\ |a+1| + |a-1| &\geq |(a+1) - (a-1)| = 2, \end{aligned}$$

因此

$$\max\{|a+b|, |a-b|, |b-1|\} \geq \frac{1}{2}.$$

例 8 证明: 对一切实数 a, b 有

$$\begin{aligned} \max\{a, b\} &= \frac{a+b}{2} + \frac{|a-b|}{2}, \\ \min\{a, b\} &= \frac{a+b}{2} - \frac{|a-b|}{2}. \end{aligned}$$

分析 $\max\{a, b\}$ 表示 a, b 中的最大者, $\min\{a, b\}$ 表示 a, b 中的最小者. 本题可以分 $a \leq b$ 和 $a > b$ 两种情形证明.

证明 当 $a \leq b$ 时, $|a-b| = b-a$, $\max\{a, b\} = b$, $\min\{a, b\} = a$, 因此

$$\begin{aligned} \max\{a, b\} &= b = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} = \frac{a+b}{2} + \frac{|a-b|}{2}, \\ \min\{a, b\} &= a = \frac{a+b}{2} - \frac{b-a}{2} = \frac{a+b}{2} - \frac{|a-b|}{2}; \end{aligned}$$

当 $a > b$ 时, $|a-b| = a-b$, $\max\{a, b\} = a$, $\min\{a, b\} = b$, 因此

$$\max\{a, b\} = a = \frac{a+b}{2} + \frac{a-b}{2} = \frac{a+b}{2} + \frac{|a-b|}{2},$$

$$\min\{a, b\} = b = \frac{a+b}{2} - \frac{a-b}{2} = \frac{a+b}{2} - \frac{|a-b|}{2}.$$

总之对一切 a, b , 所证等式成立.

总结 绝对值是微积分中一个很重要的工具, 它的几何意义和性质能反映出实数之间的许多规律, 如例 8 中 $\frac{a+b}{2}$ 表示 a 与 b 的中点, $|a-b|$ 表示 a 与 b 之间的距离, 于是 a 与 b 之间的最大者就是中点向右平移 $\frac{|a-b|}{2}$, a 与 b 之间的最小者是中点向左平移 $\frac{|a-b|}{2}$.

2. 函数与函数的几何特征

例 9 以下各组函数是否为相同的函数, 说明理由:

$$(1) f(x) = |x|, g(x) = x \operatorname{sgn} x, \varphi(x) = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0, \end{cases} \quad \psi(x) = \sqrt{x^2};$$

$$(2) f(x) = \sin(\arcsin x), g(x) = x;$$

$$(3) f(x) = \ln\left(\frac{1-x}{1+x}\right)^2, g(x) = 2\ln(1-x) - 2\ln(1+x);$$

$$(4) y = f(x) \text{ 与 } x = f(y).$$

分析 确定函数有两个要素: 定义域和对应法则. 要判断两个函数是否相同, 首先判断它们的定义域是否相同; 再判断它们的对应法则是否也相同, 也就是判断相同的 x 处所对应的函数值是否相同. 只有这两个函数的定义域和对应法则都相同, 这两个函数才相同.

解 对于 (1), $f(x), g(x), \varphi(x), \psi(x)$ 是相同的函数. 因为它们的定义域均为 $(-\infty, +\infty)$, 它们在同一 x 处所对应的函数值相同, 即它们的对应法则也相同.

对于 (2), $f(x)$ 和 $g(x)$ 是不相同的. 因为 $f(x)$ 的定义域 $D_f = \{x \mid |x| \leq 1\}$, $g(x)$ 的定义域 $D_g = \{x \mid -\infty < x < +\infty\}$.

对于 (3), $f(x)$ 和 $g(x)$ 是不同的. 因为 $f(x)$ 的定义域 $D_f = \{x \mid x \neq \pm 1, x \in \mathbf{R}\}$, 而 $g(x)$ 的定义域 $D_g = \{x \mid -1 < x < 1\}$.

对于 (4), 抽象的函数表达式 $y = f(x)$ 表示的是定义域为某实数集 D_f , 而对应法则为 f 的函数; $x = f(y)$ 表示相同的含义. 这里只是表示自变量和因变量的字母不同而已, 所以它们表示相同的函数.

例 10 求下面函数的定义域:

$$(1) y = \ln \arcsin(1-x) + \sqrt{\frac{1}{4} - x^2} + \frac{1}{(x^2 + x - 2)x};$$

$$(2) y = e^{\frac{1}{1-\ln|x|}} \cdot \operatorname{arccot}(\tan x).$$

分析 函数的定义域即是使函数的解析表达式中的运算有意义的自变量的取值全体. 而一般初等函数是由基本初等函数经过有限次四则运算和有限次复合得到的, 所以求函数的定义域, 首先得弄清楚基本初等函数的定义域.

解 (1) 要使函数有意义, 必须有

$$\arcsin(1-x) > 0, \quad |1-x| \leq 1, \quad \frac{1}{4} - x^2 \geq 0, \quad x^2 + x - 2 \neq 0, \quad x \neq 0,$$

$$\text{即} \quad 0 < 1-x \leq 1, \quad -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}, \quad x \neq 1, \quad x \neq -2, \quad x \neq 0.$$

综合即得所求的定义域为 $\left\{x \mid 0 < x \leq \frac{1}{2}\right\} = \left(0, \frac{1}{2}\right]$.

(2) 要使函数有意义, 必须有

$$1 - \ln|x| \neq 0, \quad |x| \neq 0, \quad x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots,$$

$$\text{即} \quad x \neq \pm e, \quad x \neq 0, \quad x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots.$$

故所求的定义域为 $\{x \mid x \in \mathbf{R}, x \neq \pm e, x \neq 0, x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$.

例 11 求函数 $y = \frac{2}{\pi} \arcsin \frac{2}{x-2}$ 的定义域与值域.

分析 反正弦函数 $\arcsin t$ 的定义域是 $|t| \leq 1$, 值域是 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

解 要使函数有意义, 必须使 $\left|\frac{2}{x-2}\right| \leq 1$, 即 $|x-2| \geq 2$, 由此得所求定义域是 $(-\infty, 0] \cup [4, +\infty)$.

由于 $-\frac{\pi}{2} \leq \arcsin \frac{2}{x-2} \leq \frac{\pi}{2}$, 所以 $-1 \leq \frac{2}{\pi} \arcsin \frac{2}{x-2} \leq 1$, 注意到 $\frac{2}{x-2} \neq 0$, 因此 $\frac{2}{\pi} \arcsin \frac{2}{x-2} \neq 0$, 故所给函数的值域为 $[-1, 0) \cup (0, 1]$.

总结 函数的两个基本要素是定义域和对应法则, 两个函数相同当且仅当它们的两个基本要素相同. 一般来说, 给定一个函数, 其定义域要预先给定, 但是, 对由解析表示式给出的初等函数, 其定义域规定为使表示式中运算有意义的自变量取值全体, 因此这种函数的定义域必须由表示式求出来. 求这些函数的定义域时要考虑到分数的分母不为零, 负数不能开偶次方, 负数和零没有对数, $[-1, 1]$ 上的点才有反正弦和反余弦.