

给力  
数学

GELI MATHEMATICS



吴法源 赵军 / 主编

# 高中数学 必考公式定律 高效速记

高中阶段最实用的口袋工具书！



华东理工大学出版社

EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS



吴法源 赵军 / 主编

# 高中数学 必考公式定律 高效速记



华东理工大学出版社

EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

· 上海 ·

# 图书在版编目(CIP)数据

高中数学必考公式定律高效速记/吴法源,赵军主编.

—上海:华东理工大学出版社,2015.5

(给力数学)

ISBN 978 - 7 - 5628 - 4108 - 1

I. ①高… II. ①吴… ②赵… III. ①数学公式—高中—教学参考资料 ②数学—定律—高中—教学参考资料  
IV. ①G634.603

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 058612 号

给力数学

## 高中数学必考公式定律高效速记

主 编 / 吴法源 赵 军

策划编辑 / 庄晓明

责任编辑 / 刘 靖

责任校对 / 成 俊

封面设计 / 裴幼华

出版发行 / 华东理工大学出版社有限公司

地 址: 上海市梅陇路 130 号, 200237

电 话: (021)64250306(营销部)

(021)64252718(编辑室)

传 真: (021)64252707

网 址: press.ecust.edu.cn

印 刷 / 上海崇明裕安印刷厂

开 本 / 710 mm×1000 mm 1/32

印 张 / 9.875

字 数 / 264 千字

版 次 / 2015 年 5 月第 1 版

印 次 / 2015 年 5 月第 1 次

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5628 - 4108 - 1

定 价 / 19.80 元

联系我们:电子邮箱 press@ecust.edu.cn

官方微博 e.weibo.com/ecustpress

天猫旗舰店 http://hdlgdxcbs.tmall.com

华东理工大学出版社



## PREFACE

## 前言

“工欲善其事，必先利其器。”一本好的工具书是迈向成功的关键。我们特邀教学一线的特高级教师和长期从事思维方法研究并取得一些成果的专家，依据新《课程标准》和最新的《考试说明》，精心策划并编写了这套“必考公式定律高效速记”系列学考工具书。本套丛书力求使广大中学生对知识的理解更深刻、记忆更快、掌握更牢固全面，本套丛书还针对不同的知识点提供了多种思维方法，以帮助学生迅速提高学习成绩。

本套丛书全面罗列了中学阶段必考知识点所涉及的公式定律，章节编排基本依循中学课本知识脉络，由浅入深，循序渐进。每一章包括知识网络和知识要点梳理两大模块。知识网络模块中，以结构图的形式，清晰地揭示了每一章的知识脉络，让学生在学习前对本章知识有一个清晰的认识，胸有成竹。知识要点梳理模块中，以必考知识点为线索，条理清晰地梳理出主要公式定律，言简意赅地诠释了每一知识点的内涵和掌握技巧，并列举少量典型例题帮助学生练习巩固，胜券在握。本套丛书有以下四个特点：

### 1. 对比学习

准确辨别理解对象，抓住知识点的特征进行对比学习，以帮助学生更深刻地理解知识点。

## 2. 以图释文，图文结合

利用图形形象地表述知识的内涵，将图形和文字相结合，形象地展现知识点之间的内在联系。

## 3. 典型例题诠释重难点

对于学习过程中的重难点，通过典型例题来诠释，讲练结合的效果胜过单纯的概念讲解。

## 4. 推理学习

用逻辑推理的方法进行推理、归纳、总结，寻找最快速有效的记忆规律。

笔者衷心期待本套丛书能成为方便学生及时查阅公式定律的经典手册和一套集理论知识、实际应用于一体的全能宝典，以帮助学生在相关知识的学习中抓住关键，掌握要领，提高学习效率，轻松备考应试。在编写过程中，编者虽反复推敲，但难免有不足之处，欢迎广大读者提出宝贵的建议。

## CONTENTS

## 目录

<b>第1章 集合与函数</b>	/1	<b>第3章 函数的应用</b>	/25
知识网络	/2	知识网络	/26
知识要点梳理	/3	知识要点梳理	/27
一、集合的含义与表示	/3	一、函数的零点	/27
二、集合的基本关系	/4	二、二分法	/29
三、集合的运算	/5	三、函数模型及其应用	/30
四、函数的概念	/7		
五、函数的表示方法	/8		
六、函数的单调性与 最大(小)值	/10	<b>第4章 空间几何体</b>	/34
七、函数的奇偶性	/12	知识网络	/35
<b>第2章 基本初等函数</b>	/14	知识要点梳理	/36
知识网络	/15	一、空间几何体的结构	/36
知识要点梳理	/16	二、空间几何体的三视图与 直观图	/38
一、指数与指数幂的运算	/16	三、棱柱、棱锥、棱台的 表面积	/40
二、指数函数及其性质	/17	四、圆柱、圆锥、圆台、 球的表面积	/41
三、对数与对数的运算	/20	五、柱、锥、台、球的体积	/42
四、对数函数及其性质	/21		
五、幂函数	/23		

<b>第5章 点、直线、平面之间的位置关系</b>	/44	一、圆的方程	/68
知识网络	/45	二、点与圆的位置关系	/70
知识要点梳理	/46	三、直线与圆的位置关系	/71
一、平面	/46	四、圆与圆的位置关系	/72
二、空间两条直线的位置关系	/47	五、空间直角坐标系	/73
<b>第6章 直线与方程</b>	/57	<b>第8章 算法初步</b>	/76
知识网络	/58	知识网络	/77
知识要点梳理	/59	知识要点梳理	/78
一、直线的倾斜角、斜率	/59	一、算法与程序框图	/78
二、直线方程的几种形式	/60	二、基本算法语句	/82
三、两条直线的位置关系	/61	三、算法案例	/87
四、直线的交点坐标与距离公式	/63	<b>第9章 统计</b>	/92
<b>第7章 圆与方程</b>	/66	知识网络	/93
知识网络	/67	知识要点梳理	/94
知识要点梳理	/68	一、随机抽样	/94
		二、用样本估计总体	/96
		三、变量之间的相关关系	/102
<b>第10章 概率</b>	/106	<b>第11章 三角函数</b>	/117
知识网络	/107	知识网络	/118
知识要点梳理	/108	知识要点梳理	/119

一、任意角和弧度制	/119	知识要点梳理	/159
二、任意角的三角函数	/121	一、正弦定理及其推论	/159
三、同角三角函数基本 关系式	/124	二、余弦定理及其推论	/160
四、三角函数的诱导公式	/125	三、解三角形	/162
五、三角函数的图像与性质	/127	<b>第 15 章 数列</b>	/165
六、函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ 的图像	/130	知识网络	/166
七、三角函数模型的简单应用	/132	知识要点梳理	/167
<b>第 12 章 平面向量</b>	/135	一、数列的概念与简单 表示法	/167
知识网络	/136	二、等差数列	/171
知识要点梳理	/137	三、等比数列	/175
一、平面向量的实际背景 及其基本概念	/137	四、数列的求和	/180
二、平面向量的线性运算	/138	<b>第 16 章 不等式</b>	/184
三、平面向量的基本定理及 坐标表示	/140	知识网络	/185
四、平面向量的数量积	/142	知识要点梳理	/186
五、平面向量的应用举例	/146	一、不等关系与不等式	/186
<b>第 13 章 三角恒等变换</b>	/149	二、一元二次不等式及其 解法	/187
知识网络	/150	三、二元一次不等式(组) 与简单线性规划问题	/190
知识要点梳理	/151	四、基本不等式 $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$ ( $a \geq 0, b \geq 0$ )	/193
一、两角和与差的三角函数	/151	<b>第 17 章 常用逻辑用语</b>	/196
二、二倍角公式	/152	知识网络	/197
三、三角恒等变换	/153	知识要点梳理	/198
<b>第 14 章 解三角形</b>	/157	一、命题及其关系	/198
知识网络	/158		

二、充分条件与必要条件	/200	第 20 章 导数及其应用	/240
三、简单的逻辑联结词	/201	知识网络	/241
四、全称量词与存在量词	/202	知识要点梳理	/242
<b>第 18 章 圆锥曲线与方程</b>	<b>/204</b>	一、变化率与导数	/242
知识网络	/205	二、导数的计算	/244
知识要点梳理	/206	三、利用导数函数的单调性	/246
一、椭圆及其标准方程	/206	四、利用导数函数的极值 (最值)	/247
二、椭圆的简单几何性质	/207	五、定积分与微积分基本 定理	/250
三、双曲线及其标准方程	/209	<b>第 21 章 推理与证明</b>	<b>/254</b>
四、双曲线的简单几何性质	/211	知识网络	/255
五、抛物线的定义	/213	知识要点梳理	/256
六、抛物线的标准方程及其 简单几何性质	/214	一、合情推理	/256
七、直线与圆锥曲线的位置 关系	/216	二、演绎推理	/258
八、曲线与方程	/221	三、直接证明与间接证明	/260
<b>第 19 章 空间向量</b>	<b>/225</b>	四、数学归纳法	/264
知识网络	/226	<b>第 22 章 数系的扩充与 复数的引入</b>	<b>/267</b>
知识要点梳理	/227	知识网络	/268
一、空间向量的概念	/227	知识要点梳理	/269
二、空间向量的坐标运算	/230	一、复数的相关概念	/269
三、利用空间向量证明空间 中的位置关系	/232	二、复数的运算	/271
四、利用空间向量求空间角	/234	<b>第 23 章 计数原理</b>	<b>/273</b>
五、利用空间向量求点到 平面的距离	/237	知识网络	/274
		知识要点梳理	/275
		一、计数原理	/275

二、排列	/276	第 25 章 统计案例	/295
三、组合	/278	知识网络	/296
四、二项式定理	/280	知识要点梳理	/297
<b>第 24 章 随机变量</b>	<b>/283</b>	一、回归分析的基本思想 及其初步应用	/297
知识网络	/284	二、独立性检验的基本思想 及其初步应用	/302
知识要点梳理	/285		
一、离散型随机变量及其 分布列	/285		
二、离散型随机变量的 均值与方差	/287		
三、二项分布及其应用	/289		
四、正态分布	/292		

# 第1章

# 集合与

# 函数

阅读结束，需要全本请在线购买：[www.mohu.org](http://www.mohu.org)

# 知识网络

## 集合与函数

### 集合

- ➡ 集合的含义
- ➡ 集合的表示
  - 列举法
  - 描述法
  - 韦恩图
- ➡ 集合的基本关系
  - 包含关系
  - 相等关系
- ➡ 集合的运算
  - 交集
  - 并集
  - 补集

### 函数

- ➡ 函数的概念
  - 定义域
  - 对应关系
  - 值域
- ➡ 函数的表示方法
  - 解析法
  - 图像法
  - 列表法
- ➡ 函数的基本性质
  - 单调性
  - 奇偶性
- ➡ 映射的概念

### 映射

# 知识 要点梳理

## 一 集合的含义与表示

### 1. 集合的含义

一般地,我们把研究对象统称为元素,把一些元素组成的总体叫作集合.

自然数集用  $N$  表示,正整数集用  $N^*$  或  $N^+$  表示,整数集用  $Z$  表示,有理数集用  $Q$  表示,实数集用  $R$  表示.

### 2. 元素与集合的关系

集合中的元素通常用小写拉丁字母表示,如果  $a$  是集合  $A$  的元素,就说  $a$  属于集合  $A$ ,记作  $a \in A$ ;如果  $a$  不是集合  $A$  的元素,就说  $a$  不属于集合  $A$ ,记作  $a \notin A$ .

### 3. 集合的表示方法

常用的集合表示方法有列举法和特征性质描述法两种.

根据元素个数,集合可分为两类:

- (1)有限集:含有有限个元素;
- (2)无限集:含有无限个元素.

### 特别提醒

(1)用集合的语言去描述数学问题时,要注意养成自觉使用符号的意识和能力.如在集合表示方式的选择、集合符号语言的使用中运用集合的观点分析、处理实际问题.

(2)注意集合表示的列举法与描述法在形式上的区别.列举法一般适合于有限集,而描述法一般适合于无限集.

**例 1.1** 已知全集  $U=R$ ,集合  $A=\{x|0 < x < 9, x \in R\}$  和  $B=\{x|-4 <$

$x < 4, x \in \mathbb{Z}$ } 关系的韦恩图如图 1-1 所示, 则阴影部分所示集合中的元素共有( ).




图 1-1

- A. 3 个      B. 4 个      C. 5 个      D. 无穷多个

**解析** 由韦恩图可知, 阴影部分可表示为  $\complement_U A \cap B$ . 由于  $\complement_U A = \{x | x \leq 0\text{ 或 }x \geq 9\}$ , 于是  $\complement_U A \cap B = \{x | -4 < x \leq 0, x \in \mathbb{Z}\} = \{-3, -2, -1, 0\}$ , 共有 4 个元素. 故选 B.

**答案** B

## 二 集合的基本关系

### 1. 子集与真子集

(1) 对于两个集合  $A$  与  $B$ , 如果集合  $A$  的任何一个元素都是集合  $B$  的元素, 我们就说集合  $A$  包含于集合  $B$ , 或集合  $B$  包含集合  $A$ , 记作  $A \subseteq B$  (或  $B \supseteq A$ ), 即集合  $A$  是集合  $B$  的子集. 空集是任何集合的子集,  $\emptyset \subseteq A$ . 任何一个集合是它本身的子集, 即  $A \subseteq A$ .

(2) 对于两个集合  $A$  与  $B$ , 如果  $A \subseteq B$  并且  $A \neq B$ , 就说集合  $A$  是集合  $B$  的真子集, 记作  $A \subsetneq B$  (或  $B \supsetneq A$ ).

空集是任何非空集合的真子集.

### 特别提醒

子集与真子集的区别与联系: 集合  $A$  的真子集一定是其子集, 而集合  $A$  的子集不一定是其真子集. 若集合  $A$  有  $n$  个元素, 则其子集个数为  $2^n$ , 真子集个数为  $2^n - 1$ .

**例 1.2** 已知  $M = \{a \mid |a| \geq 2\}$ ,  $A = \{a \mid (a-2)(a^2-3)=0, a \in M\}$ , 则集合  $A$  的子集共有( ).

- A. 1 个      B. 2 个      C. 4 个      D. 8 个

**解析**  $|a| \geq 2 \Rightarrow a \geq 2$  或  $a \leq -2$ . 又  $a \in M, (a-2)(a^2-3)=0 \Rightarrow a=2$  或  $a=\pm\sqrt{3}$  (舍), 即  $A$  中只有一个元素 2, 故  $A$  的子集只有 2 个, 选 B.

**答案** B

## 2. 空集

不含任何元素, 用  $\emptyset$  表示. 规定: 空集是任何集合的子集.

## 3. 全集

如果一个集合含有我们所要研究的各个集合的全部元素, 这个集合就可以看作一个全集, 全集通常用  $U$  表示.

### 特别提醒

注意集合  $\{\emptyset\}$  与空集  $\emptyset$  的区别与联系:  $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$ ,  $\emptyset \in \{\emptyset\}$ .

**例 1.3** 设集合  $P = \{x \mid x > 1\}$ ,  $Q = \{x \mid x^2 - x > 0\}$ , 则下列结论正确的是( ).

- A.  $P \subseteq Q$       B.  $Q \subseteq P$       C.  $P = Q$       D.  $P \cup Q = R$

**解析** 由集合  $Q = \{x \mid x^2 - x > 0\}$ , 知  $Q = \{x \mid x < 0 \text{ 或 } x > 1\}$ , 故选 A.

**答案** A

## 三 集合的运算

### 1. 交集

(1) 由所有属于集合  $A$  且属于集合  $B$  的元素所组成的集合, 叫作  $A$  与  $B$  的交集, 记作  $A \cap B$ , 即  $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \in B\}$ .

(2)  $(A \cap B) \subseteq A$ ,  $(A \cap B) \subseteq B$ ,  $A \cap A = A$ ,  $A \cap \emptyset = \emptyset$ ,  $A \cap B = B \cap A$ .

**例 1.4** 若集合  $A, B$  满足  $A = \{x | x < 3, x \in \mathbb{Z}\}$ ,  $B \subseteq \mathbb{N}$ , 则  $A \cap B$  不可能  
是( )。

- A.  $\{0, 1, 2\}$       B.  $\{1, 2\}$       C.  $\{-1\}$       D.  $\emptyset$

**解析** 依题意  $A \cap B$  的元素可能为  $0, 1, 2$ , 也可能没有元素, 所以  $A \cap B$  不可能是  $\{-1\}$ . 故选 C.

**答案** C

## 2. 并集

(1) 由所有属于集合  $A$  或属于集合  $B$  的元素所组成的集合, 叫作  $A$  与  $B$  的并集, 记作  $A \cup B$ , 即  $A \cup B = \{x | x \in A \text{ 或 } x \in B\}$ .

(2)  $(A \cup B) \supseteq A, (A \cup B) \supseteq B, A \cup A = A, A \cup \emptyset = A, A \cup B = B \cup A, (\complement_U A) \cup A = U$ .

**例 1.5** 已知集合  $M = \{-1, 0, 1\}, N = \{0, 1, 2\}$ , 则  $M \cup N =$  ( ).

- A.  $\{0, 1\}$       B.  $\{-1, 0, 2\}$   
C.  $\{-1, 0, 1, 2\}$       D.  $\{-1, 0, 1\}$

**解析** 因为  $M = \{-1, 0, 1\}, N = \{0, 1, 2\}$ , 所以  $M \cup N = \{-1, 0, 1, 2\}$ . 故选 C.

**答案** C

## 3. 补集

设  $U$  是一个集合,  $A$  是  $U$  的一个子集(即  $A \subseteq U$ ), 由  $U$  中所有不属于  $A$  的元素组成的集合, 叫作  $U$  中子集  $A$  的补集, 记作  $\complement_U A$ , 即  $\complement_U A = \{x | x \in U \text{ 且 } x \notin A\}$ .

## 拓展延伸

(1) 两个结论:

①若  $A \cap B = A$ , 则  $A \subseteq B$ , 反之也成立.

②若  $A \cup B = B$ , 则  $A \subseteq B$ , 反之也成立. 应用这两个结论时一定要注意不要忘记集合  $A = \emptyset$  这一个特例.

(2) 可以借助韦恩图或数轴来帮助理解两个集合的交集与并集的特

征和解题.

**例 1.6** 已知集合  $A = \{x | x > 2\}$ ,  $B = \{x | x < 2m\}$  且  $A \subseteq \complement_R B$ , 那么  $m$  的值可以是( )。

- A. 1      B. 2      C. 3      D. 4

**解析** 由  $B = \{x | x < 2m\}$ , 得  $\complement_R B = \{x | x \geq 2m\}$ , 因为  $A \subseteq \complement_R B$ , 所以  $2m \leq 2$ , 所以  $m \leq 1$ , 故选 A.

**答案** A

## 四 函数的概念

### 1. 函数的定义

一般地, 设  $A, B$  是两个非空的数集, 如果按照某种确定的对应关系  $f$ , 使对于集合  $A$  中的任意一个数  $x$ , 在集合  $B$  中都有唯一确定的数  $f(x)$  和它对应, 那么就称  $f: A \rightarrow B$  为从集合  $A$  到集合  $B$  的一个函数, 记作  $f(x), x \in A$ . 其中,  $x$  叫作自变量,  $x$  的取值范围  $A$  叫作函数的定义域; 与  $x$  的值相对应的  $y$  值叫作函数值, 函数值的集合  $\{f(x) | x \in A\}$  叫作函数的值域.

### 2. 函数的构成要素

函数是由定义域、对应法则、值域这三个要素构成的.

例如, 在  $A$  到  $B$  的函数  $y = f(x)$  中, 其中  $x \in A, y \in B$ , 原象的集合  $A$  叫作函数  $y = f(x)$  的定义域, 象的集合  $C (C \subseteq B)$  叫作函数  $y = f(x)$  的值域. 函数符号  $y = f(x)$  表示“ $y$  是  $x$  的函数”, 有时简记作函数  $f(x)$ , 其中  $f$  表示对应法则.

### 3. 映射

一般地, 设  $A, B$  是两个非空集合, 如果按照某种确定的对应关系  $f$ , 使对于集合  $A$  中的任意一个元素  $x$ , 在集合  $B$  中都有唯一确定的元素  $y$  与之对应, 那么就称对应  $f: A \rightarrow B$  是从集合  $A$  到集合  $B$  的一个映射.

若集合  $A$  中有  $m$  个元素, 集合  $B$  中有  $n$  个元素, 则可构成的映射  $f$ :