

2011

主管护师

职称考试

强化训练习题集

主编 陶文明 沈小平



第二军医大学出版社

Second Military Medical University Press

2011

前言

主管护师职称考试 强化训练习题集

主 编 陶文明 沈小平
编 委 王爱国 方 芳 尹志峰
叶 萌 吕芳萍 曲宋伟
李美英 杨 昕 杨 蓓
何 蔚 陈匿珍 沈小平
邵美红 单晓巍 赵志刚
群 徐小军
谭萍华

第二军医大学出版社

1105

主管护师职称考试强化训练习题集

主 编 陶文明 沈小平
副主编 王爱军 吕 莉
参 考 李美英 陶 莉
审 核 沈小平 陶文明
责任编辑 陆义群 刘锦丹

2011 主管护师职称考试强化训练习题集

主 编 陶文明 沈小平

第二军医大学出版社出版发行

上海市翔殷路 800 号 邮政编码: 200433

电话/传真: 021-65493093

全国各地新华书店经销

江苏句容排印厂印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 47.75 字数: 1538 千字

2007 年 1 月第 1 版 2010 年 10 月第 4 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-81060-872-5/R · 678

定价: 75.00 元

第二军医大学出版社

前言

根据卫生部考试中心编写的考试大纲和考试指南的要求,我们组织了上海医学护理学方面具有丰富教学经验的老师,结合近几年来的考试内容和考试题型修订了这本《2011 主管护师职称考试强化训练题集》,旨在帮助护士职称晋升考试中取得好成绩。

本习题集适用于主管护师职称应试者使用,包含内科护理学、外科护理学、妇产科护理学、儿科护理学、护理健康教育、护理管理学、医院感染护理七大部分,每部分包含有考试中的基础知识、相关专业知识和专业知识和专业实践能力四个部分。本书题量大,范围广,与考试指南编排的章节完全一致,读者在经过学习、复习、考试指导后,通过本书的题目练习可检验复习的效果。相信做完本书题目的考生,对其通过考试肯定会有一定的帮助。

根据考试题型,本书将归纳为 A 型、B 型、X 型题三大类。A 型题为最佳选择题,每题只有一个最佳答案;B 型题即配伍题,指若干组考题共同使用五个备选答案,从中选择一个最佳答案;X 型题是多重选择题,每道试题有多个答案。本书每篇末备有参考答案,以便读者检验学习情况。

为了配合考生考前冲刺,本书增加了模拟试题和主管护师全真试题,供考生检测学习成果,以便及时弥补不足。

本次再版对前次版本中的差错作了修订,并调整了部分过时的试题,但鉴于编写人员水平和能力有限,不当之处仍在所难免,恳请读者、专家批评、指正,以便再版时更正。

编者

2010 年 10 月

目 录

第一篇 内科护理学

第一章 绪论	1
第二章 呼吸系统疾病病人的护理	2
第三章 循环系统疾病病人的护理	21
第四章 消化系统疾病病人的护理	37
第五章 泌尿系统疾病病人的护理	55
第六章 血液及造血系统疾病病人的护理	67
第七章 内分泌代谢性疾病病人的护理	78
第八章 风湿性疾病病人的护理	87
第九章 理化因素所致疾病病人的护理	93
第十章 传染病病人的护理	100
第十一章 神经系统疾病病人的护理	120

第二篇 外科护理学

第一章 绪论	132
第二章 外科病人水、电解质和酸碱平衡失调的护理	133
第三章 外科病人的营养支持及护理	139
第四章 外科休克病人的护理	140
第五章 外科感染病人的护理	143
第六章 外科疼痛病人的护理	148
第七章 外科重症病人的监护	148
第八章 麻醉	149
第九章 复苏	151
第十章 外科病人围术期的护理	155
第十一章 手术室工作	159
第十二章 损伤病人的观察与护理	160
第十三章 肿瘤病人的护理	168
第十四章 甲状腺疾病病人的护理	172
第十五章 乳腺疾病病人的护理	176
第十六章 腹部损伤病人的护理	181
第十七章 急性腹膜炎病人的护理	183
第十八章 胃、十二指肠疾病病人的护理	184
第十九章 急性阑尾炎病人的护理	188
第二十章 腹外疝病人的护理	190

第二十一章	肠疾病病人的护理	192
第二十二章	直肠、肛管疾病病人的护理	195
第二十三章	细菌性肝脓肿病人的护理	201
第二十四章	原发性肝癌病人的护理	202
第二十五章	门静脉高压病人的护理	205
第二十六章	胆道疾病病人的护理	208
第二十七章	胰腺疾病病人的护理	211
第二十八章	外周血管病病人的护理	215
第二十九章	颅内高压病人的护理	219
第三十章	颅脑损伤病人的护理	222
第三十一章	颅内肿瘤病人的护理	224
第三十二章	脑血管疾病病人的护理	225
第三十三章	脑部特殊检查治疗的护理	226
第三十四章	胸部损伤病人的护理	227
第三十五章	肺癌病人的护理	231
第三十六章	食管癌病人的护理	233
第三十七章	心脏外科病人的护理	236
第三十八章	泌尿系统损伤病人的护理	242
第三十九章	肾及输尿管结石病人的护理	245
第四十章	肾结核病人的护理	248
第四十一章	前列腺增生症病人的护理	249
第四十二章	泌尿生殖系统肿瘤病人的护理	251
第四十三章	肾上腺疾病病人的护理	254
第四十四章	肾移植病人的护理	255
第四十五章	牵引病人的护理	256
第四十六章	石膏固定病人的护理	259
第四十七章	骨科病人的功能锻炼	260
第四十八章	常见四肢骨折病人的护理	262
第四十九章	脊髓损伤病人的护理	266
第五十章	腰腿痛病人的护理	268
第五十一章	颈椎病人的护理	271
第五十二章	化脓性骨与关节感染病人的护理	273
第五十三章	骨与关节结核病人的护理	277
第五十四章	骨肿瘤病人的护理	281
第三篇 妇产科护理学		285
第一章	绪论	285
第二章	女性生殖系统解剖	286
第三章	女性生殖系统生理	292
第四章	妊娠生理	299
第五章	妊娠期妇女的监护和护理	307

第六章	分娩期妇女的护理	313
第七章	产褥期产妇的护理	320
第八章	高危妊娠母婴的护理	327
第九章	妊娠期并发症孕妇的护理	332
第十章	妊娠并发症孕产妇的护理	348
第十一章	异常分娩产妇的护理	356
第十二章	分娩期并发症产妇的护理	361
第十三章	产后并发症产妇的护理	368
第十四章	妇产科病历及检查	371
第十五章	外阴白色病变及外阴瘙痒	375
第十六章	女性生殖系统炎症病人的护理	377
第十七章	女性生殖器肿瘤病人的护理	385
第十八章	滋养细胞疾病病人的护理	397
第十九章	放疗、化疗病人的护理	402
第二十章	月经失调病人的护理	406
第二十一章	女性生殖器官损伤病人的护理	414
第二十二章	其他妇科疾病病人的护理	417
第二十三章	妇产科受术者的护理	420
第二十四章	计划生育妇女的护理	425
第二十五章	妇女保健	434
第四篇	儿科护理学	438
第一章	绪论	438
第二章	生长发育	440
第三章	儿童保健	446
第四章	健康小儿的营养	452
第五章	小儿疾病的治疗及护理	458
第六章	新生儿和患病新生儿的护理	461
第七章	营养性疾病患儿的护理	471
第八章	消化系统疾病患儿的护理	479
第九章	呼吸系统疾病患儿的护理	492
第十章	循环系统疾病患儿的护理	503
第十一章	造血系统疾病患儿的护理	511
第十二章	泌尿系统疾病患儿的护理	520
第十三章	内分泌系统疾病患儿的护理	528
第十四章	神经系统疾病患儿的护理	534
第十五章	免疫缺陷病和结缔组织病患儿的护理	541
第十六章	遗传代谢性病患儿的护理	547
第十七章	常见传染病患儿的护理	551
第十八章	结核病患儿的护理	560
第十九章	寄生虫病患儿的护理	567

第二十章 急性中毒和常见急症患儿的护理	569
第五篇 护理健康教育	579
第六篇 护理管理学	587
第一章 绪论	587
第二章 管理理论在护理管理中的应用	588
第三章 计划工作	589
第四章 组织工作	591
第五章 护理人力资源管理	593
第六章 领导工作	595
第七章 组织沟通	597
第八章 冲突与协调	598
第九章 控制工作	599
第十章 护理质量管理	600
第七篇 医院感染护理	603
主管护师考试试题	650
主管护师考试试题	650
相关专业知识	658
专业知识	667
专业实践能力(综合专业)	675
专业实践能力(内科专业)	684
专业实践能力(外科专业)	693
专业实践能力(妇产科专业)	702
专业实践能力(儿科专业)	711
模拟试题	720
基础知识卷	720
专业知识卷	737
实践能力卷	745

第一篇

内科护理学

第一章 绪 论

A型题

1. 整体护理的涵义不包括
 - A. 护理观察是以人为中心的护理
 - B. 护理是单纯照顾病人的生活和疾病
 - C. 护理服务对象是病人和健康人
 - D. 护理服务于人的生命全过程
 - E. 护理要面向社会,保持人和环境间的平衡

2. 护理理论的四个基本概念是

- A. 预防、治疗、护理、环境
- B. 病人、健康、社会、护理
- C. 人、环境、健康、社会
- D. 病人、预防、治疗、护理
- E. 人、环境、健康、护理

3. 现代护理学关于人和健康的概念不包括

- A. 人是单纯的生物体
- B. 人是生理和心理的统一体
- C. 人的健康是生理对自然环境的适应
- D. 人的健康是心理对自然环境的适应
- E. 人需要护理促进健康

4. 护理程序的基础是

- A. 护理评估
- B. 护理诊断
- C. 护理计划
- D. 护理实施
- E. 护理评价

5. 现代护理认为,护士与服务对象的关系应是

- A. 服务对象绝对服从护士
- B. 护士绝对服从服务对象
- C. 服务对象与护士相互作用
- D. 服务对象与护士互不作用
- E. 服务对象选择性的作用护士

X型题

6. 护理程序分以下几个步骤

- A. 评估
- B. 诊断
- C. 计划
- D. 实施
- E. 评价

7. 护理程序的特性有

- A. 为护理对象提供高质量的整体护理
- B. 护士需具备多学科知识
- C. 护士需有良好的人际沟通能力
- D. 护士具有创造性
- E. 护士需有良好的合作能力

8. 对护理学性质描述错误的是

- A. 从事病人生活护理的科学
- B. 从属于医疗的辅助性科学
- C. 综合性应用科学
- D. 医疗科学中的一门独立学科
- E. 以操作为主的专门科学

参考答案

1. B 2. E 3. A 4. A 5. C 6. ABCDE

7. ABCDE 8. ABE

第二章 呼吸系统疾病病人的护理

A型题

1. 上呼吸道对吸入气体的作用不包括

- A. 交换
- B. 过滤
- C. 湿化
- D. 加温
- E. 黏附

2. 呼吸系统疾病最常见的病因是

- A. 大气污染
- B. 吸烟
- C. 变态反应
- D. 感染
- E. 肿瘤

3. 肺的主要功能是

- A. 外呼吸
- B. 湿化空气
- C. 排痰
- D. 气体交换
- E. 以上都是

4. 正确的肺循环是

- A. 右心室→肺动脉→肺毛细血管→肺静脉→左心房
- B. 左心房→肺动脉→肺毛细血管→肺静脉→右心室
- C. 左心房→肺静脉→肺动脉→肺毛细血管→左心房
- D. 右心室→肺静脉→肺动脉→肺毛细血管→左心房
- E. 以上都不是

5. 呼吸运动的化学调节是指动脉血或脑脊液中的下列物质对呼吸的调节作用

- A. O_2

B. O_2 、 CO_2 C. O_2 、 CO_2 、 H^+ D. $PaCO_2$ E. PaO_2

6. 呼吸系统疾病最常见症状是

- A. 咽痛
- B. 咳嗽
- C. 咳痰
- D. 咯血
- E. 呼吸困难

7. 咯脓臭痰常提示病人呼吸道有

- A. 病毒感染
- B. 真菌感染
- C. 化脓菌感染
- D. 铜绿假单胞菌感染
- E. 厌氧菌感染

8. 吸气性呼吸困难常见于

- A. 喉部气管病变
- B. 支气管病变
- C. 肺组织病变
- D. 肺血管病变
- E. 胸膜病变

9. 引起细菌性咽-扁桃体炎最主要的致病菌为

- A. 葡萄球菌
- B. 溶血性链球菌
- C. 肺炎球菌
- D. 奈瑟球菌
- E. 粪链球菌

10. 突然发作的吸气性呼吸困难最常见于

- A. 自发性气胸

- B. 支气管哮喘
C. 肺心病
D. 气管内异物或梗阻
E. 阻塞性肺气肿
11. 关于急性上呼吸道感染的保健指导, 不正确的一项是
A. 注意锻炼身体
B. 感冒流行季节尽可能少去公共场所
C. 接触病人时注意床边隔离, 以防交叉感染
D. 室内用食醋加热熏蒸
E. 增强机体耐寒能力
12. 治疗上呼吸道感染的措施, 下列哪项不妥
A. 适当休息, 多饮水
B. 进半流质饮食
C. 作必要的对症处理
D. 中医药治疗
E. 常规应用抗菌药
13. 在呼吸道感染流行时为防止交叉感染, 接触病毒感染者应
A. 卧床休息
B. 对症处理
C. 中医中药治疗
D. 室内食醋熏蒸
E. 呼吸道隔离
14. 急性支气管炎的主要病因是
A. 病毒或细菌感染
B. 吸入刺激性气体
C. 寒冷空气刺激
D. 过敏反应
E. 寄生虫感染
15. 慢性支气管炎最突出的症状是
A. 长期反复咳嗽、咯痰
B. 胸痛
C. 喘息
D. 反复发热
E. 少量咯血
16. 慢性阻塞性肺病合并呼吸衰竭时, 用利尿剂治疗易发生哪种电解质及酸碱平衡紊乱
A. 低钠血症
B. 高钾低氯血症
C. 低钙血症
D. 低钾低氯血症、代谢性碱中毒
E. 高钙血症
17. 慢性支气管炎并发阻塞性肺气肿病人, 主要是在原有症状的基础上出现
A. 反复发作
B. 剧烈咳嗽
C. 咯多量脓痰
D. 经常感染发热
E. 逐渐加重的呼吸困难
18. 慢性支气管炎最常见的并发症是
A. 急性肺部感染
B. 支气管扩张
C. 阻塞性肺气肿
D. 慢性肺脓肿
E. 中毒性肺炎
19. 慢性阻塞性肺气肿最常见的病因是
A. 慢性支气管炎
B. 支气管肺炎
C. 支气管扩张症
D. 支气管哮喘
E. α_1 -抗胰蛋白酶不足
20. 关于慢性阻塞性肺气肿病人的护理, 不正确的是
A. 避免不良气体刺激
B. 指导作腹式呼吸
C. 给予高浓度吸氧
D. 慎用镇静剂
E. 预防和治疗呼吸道感染
21. 慢性支气管炎发作时最重要的治疗是应用
A. 核酪
B. 抗生素
C. 祛痰镇咳药
D. 糖皮质激素
E. 支气管扩张剂
22. 不符合阻塞性肺气肿病人的肺功能检查结果是

- A. 残气量增加
B. 动脉血氧分压降低
C. 最大通气量增加
D. 时间肺活量减少
E. 通气/血流比例小于 0.8
23. 慢性支气管炎的主要诊断依据是
A. 病史和临床表现
B. 肺功能测定
C. 痰液细菌学检查
D. X 线检查
E. 临床体征
24. 肺部叩诊呈过清音提示
A. 肺结核
B. 胸腔积液
C. 胃潴留
D. 气胸
E. 肺气肿
25. 诊断早期阻塞性肺气肿最有价值的一项是
A. 病史、体征
B. 肺功能测定
C. 痰菌培养
D. 血气分析
E. X 线检查
26. 重症哮喘发作时宜选用的药物是
A. 酮替芬
B. 氨茶碱
C. 喘定
D. 泼尼松
E. 布特他林
27. 重症哮喘病人禁用的药物是
A. 吗啡
B. 氨茶碱
C. 异丙肾上腺素
D. 肾上腺素
E. 色甘酸二钠
28. 氨茶碱的严重不良反应是
A. 头痛、手指颤抖
B. 恶心、呕吐
C. 血压下降、甚至死亡
D. 心率加快
E. 嗜睡、胃肠道反应
29. 护理重症哮喘者时,下列哪项不妥
A. 守护在床边,加强心理护理
B. 安排舒适的半卧位或坐位
C. 给予低流量鼻导管吸氧
D. 勿勉强进食,限制水的摄入
E. 痰多黏稠者可作药物雾化
30. 支气管哮喘的临床表现,下列哪项是错误的
A. 呼气性呼吸困难
B. 两肺布满哮鸣音
C. 心浊音界缩小
D. 三凹征
E. 发绀
31. 支气管哮喘急性发作的首选药物是
A. β_2 肾上腺素受体兴奋剂
B. 黄嘌呤类药物
C. 色甘酸钠
D. 糖皮质激素
E. 酮替芬
32. 支气管哮喘与心源性哮喘的鉴别有助于后者诊断的是
A. 注射氨茶碱后症状好转
B. 呼气性呼吸困难
C. 咳出粉红色的泡沫样痰
D. 肺部闻及哮鸣音
E. 肺部闻及湿啰音
33. 支气管哮喘与心源性哮喘不能鉴别时,宜选用的药物是
A. 舒喘灵
B. 氨茶碱
C. 哌替啶
D. 地塞米松
E. 毒毛旋花子苷 K
34. 哮喘持续状态是指哮喘发作严重,持续多长时间以上
A. 6 h

- B. 12 h
C. 24 h
D. 48 h
E. 72 h
35. 对支气管哮喘病人作保健指导,错误的是
A. 居室应美化,适当放置花、草、地毯
B. 避免进食可能致敏的食物(如鱼、虾、蛋)
C. 避免刺激性气体吸入
D. 避免过度劳累或情绪激动等诱发因素
E. 气候变化时注意保暖,避免呼吸道感染
36. 支气管哮喘的发作出现下列哪种呼吸困难
A. 呼气性呼吸困难
B. 吸气性呼吸困难
C. 混合性呼吸困难
D. 劳力性呼吸困难
E. 夜间阵发性呼吸困难
37. 支气管哮喘发作时,听诊两肺有广泛哮鸣音,其原因是
A. 肺泡间质水肿
B. 支气管平滑肌痉挛
C. 肺泡内分泌物增多
D. 支气管内黏稠分泌物增多
E. 支气管黏膜肿胀致支气管狭窄
38. 支气管哮喘发作的主要诊断依据是
A. 端坐呼吸
B. X线胸片示双肺纹理增粗
C. 双肺可闻及干湿性啰音
D. 嗜酸性粒细胞增多
E. 反复发作带有哮鸣音、呼气性呼吸困难
39. 哮喘持续状态病人的护理不正确的是
A. 保持有效吸氧
B. 保持呼吸道通畅
C. 加快输液速度,以纠正脱水,防止痰黏塞
D. 专人护理,消除病人紧张恐惧心理
E. 严密观察血压、脉搏、呼吸及神志的变化
40. 治疗支气管哮喘持续状态,需纠正酸中毒,其最主要临床意义是
A. 增强抗生素疗效
B. 使痰液易咯出
C. 改善呼吸困难
D. 加强祛痰效果
E. 增强支气管解痉药疗效
41. 支气管扩张病人反复大咯血的主要原因是
A. 肺动脉高压
B. 肺静脉高压
C. 支气管过度扩张
D. 支气管先天性发育缺损
E. 感染引起支气管内肉芽组织或血管瘤破裂
42. 支气管扩张病人如有厌氧菌感染,则痰的特征为
A. 铁锈色
B. 胶冻样
C. 泡沫痰
D. 白色痰
E. 痰有恶臭
43. 支气管扩张病人的咳嗽特点为
A. 晨起及晚上躺下时较重
B. 常出现刺激性干咳
C. 有时呈阵发性呛咳
D. 后期咳嗽加重并伴喘鸣声
E. 严重者出现呼吸困难
44. 支气管扩张病人体位引流合理的体位是
A. 任何体位均可
B. 采取病人感觉舒适的体位
C. 患侧位于低处,引流支气管开口朝上
D. 患侧位于水平位,引流支气管开口水平位
E. 患侧位于高处,引流支气管开口朝下
45. 能确诊支气管扩张的检查是
A. 胸部X线片
B. 胸部CT
C. 痰菌培养
D. 结核菌素试验
E. 痰脱落细胞检查
46. 防止支气管扩张感染关键在于
A. 祛痰药
B. 注射疫苗

- C. 使用支气管扩张剂
D. 加强呼吸道痰液引流
E. 选择广谱抗生素
47. 支气管扩张发生大咯血首要的护理措施是
A. 保持呼吸道通畅
B. 静脉输液
C. 止血药的应用
D. 抗休克治疗
E. 持续吸氧
48. 肺炎球菌肺炎患者最具特征性的症状为
A. 寒颤、高热
B. 呼吸困难
C. 胸痛
D. 咯铁锈色痰
E. 咳嗽
49. 肺炎球菌肺炎患者的热型常呈
A. 稽留热
B. 弛张热
C. 间歇热
D. 波状热
E. 不规则热
50. 下列哪项提示肺炎球菌肺炎患者病情严重
A. 症状、体征较为典型
B. 白细胞明显增多,中性粒细胞比例增高
C. 白细胞总数不高甚至降低,但中性粒细胞比例增高,核左移
D. 痰涂片或培养见肺炎球菌
E. X线检查见病灶呈大片均匀、致密阴影
51. 治疗肺炎球菌肺炎常首选
A. 青霉素
B. 头孢菌素
C. 氨苄青霉素
D. 磺胺嘧啶
E. 红霉素
52. 肺炎球菌肺炎的致病因素最主要的是
A. 荚膜
B. 细菌的内毒素
C. 细菌的外毒素
D. 细菌迅速繁殖
E. 细菌有杀白细胞素
53. 肺炎球菌肺炎时产生的铁锈色痰最主要的原因是
A. 痰内有大量红细胞
B. 痰内含大量脓细胞
C. 白细胞破坏时所产生的溶蛋白酶
D. 红细胞破坏释放出含铁血黄素
E. 红细胞碎屑被巨噬细胞吞噬
54. 肺炎球菌肺炎病人胸痛特点,下列哪项不正确
A. 呈尖锐的刺痛
B. 咳嗽和深呼吸时加剧
C. 迫使病人取健侧卧位
D. 少数病人可有胸、腹或肩部放射痛
E. 下胸部呼吸幅度较大的部位较明显
55. 关于革兰阴性杆菌肺炎特点,下列哪项是错误的
A. 双侧下叶肺多受累
B. 肺实变或病变融合,坏死后易形成脓肿
C. 波及胸膜,可引起胸膜渗液或脓肿
D. 多为院外感染,病人原先为健康的青壮年人
E. 治疗时抗生素宜大剂量、长疗程、联合用药,静脉输注为主
56. 对肺炎链球菌肺炎,抗菌药物治疗正确的是
A. 首选青霉素,疗程 7~10 d
B. 首选青霉素,疗程 10~14 d
C. 首选青霉素,疗程 14~21 d
D. 首选红霉素,疗程 7~14 d
E. 首选红霉素,疗程 14~21 d
57. 军团菌肺炎抗菌治疗正确的方法是
A. 首选红霉素,疗程 7~14 d
B. 首选青霉素,疗程 10~14 d
C. 首选青霉素,疗程 14~21 d
D. 首选红霉素,疗程 14~21 d
E. 首选红霉素,疗程 21~28 d
58. 中毒性肺炎的抗休克治疗措施一般不包括
A. 静脉输注低分子右旋糖酐

- B. 应用强心药物
C. 静脉输注糖皮质激素
D. 使用碱性药物
E. 应用血管活性药物
59. 肺炎杆菌(肺炎克雷伯杆菌)肺炎的临床表现中具有特征的是
A. 胸痛
B. 寒颤、发热
C. 可闻干、湿性啰音
D. 红色胶冻状黏稠脓性痰
E. 胸片见模糊淡薄阴影
60. 对肺炎支原体肺炎的治疗首选
A. 青霉素
B. 红霉素
C. 激素
D. 咪康唑
E. 甲硝唑
61. 肺炎球菌肺炎最重要的体征是
A. 胸膜摩擦音
B. 面色发绀
C. 唇部疱疹
D. 气急、鼻翼扇动
E. 胸部实变体征和啰音
62. 治疗肺真菌病选用的药物是
A. 两性霉素
B. 红霉素
C. 青霉素
D. 头孢菌素
E. 激素
63. 护士在观察中毒性肺炎病人时应特别注意
A. 起病缓急
B. 体温高低
C. 呼吸困难程度
D. 有无末梢循环衰竭
E. 白细胞总数
64. 中毒性肺炎抗休克治疗的首要措施是
A. 应用强心剂
B. 补充血容量
C. 纠正酸碱平衡失调
D. 应用血管活性药
E. 应用糖皮质激素
65. 提示中毒性肺炎病人病情严重的表现是
A. 尿量增加
B. 烦躁不安
C. 体温升高
D. 脉搏加快
E. 血压下降
66. 急性肺脓肿的主要治疗措施是
A. 早期手术治疗
B. 应用抗生素
C. 抗生素及痰液引流
D. 痰液引流
E. 补充营养
67. 肺结核咯血伴高热常提示
A. 病灶扩散
B. 空洞形成
C. 支气管内血液吸收
D. 炎症波及壁层胸膜
E. 并发血气胸
68. 肺结核病人的消毒隔离措施,错误的一项是
A. 做好呼吸道隔离
B. 剩余的饭菜煮沸后弃去
C. 痰液加等量的1%过氧乙酸浸泡
D. 餐具洗涤后应煮沸5 min
E. 病室每日用紫外线灯照射
69. 预防肺结核发生与流行的关键措施是
A. 加强营养,增强体质
B. 接种卡介苗
C. 抗结核治疗
D. 做好痰的处理
E. 隔离病人及早有效地化疗
70. 肺结核病人痰菌阳性,下列说法错误的一项是
A. 病灶具有活动性
B. 需要抗结核治疗
C. 需要接种卡介苗
D. 加强隔离制度

- E. 加强营养
71. 肺结核病人痰液最简单有效的灭菌方法是
- 掩埋
 - 煮沸
 - 阳光下暴晒
 - 纸包后焚烧
 - 1%过氧乙酸浸泡
72. 对肺结核疗效观察的最可靠方法是
- X线检查
 - 痰菌检查
 - 红细胞沉降率(血沉)检查
 - 结核菌素试验
 - 体温、体重测量
73. 观察结核菌素试验正确的时间是
- 6~12 h
 - 13~24 h
 - 25~36 h
 - 37~48 h
 - 49~72 h
74. 继发性肺结核不正确的是
- 一般发生在曾受过结核感染的成年人
 - 可通过内源性感染而来
 - 可通过外源性感染而来
 - 肺内局部组织炎症反应较轻
 - 病灶多在肺尖
75. 继发肺结核好发于
- 肺尖
 - 左肺上叶
 - 左肺下叶
 - 右肺中叶
 - 右肺下叶
76. 进行结核菌素试验的主要目的是
- 测定人体是否受过结核菌感染
 - 诊断是否患有肺结核
 - 判断结核有无活动性
 - 增强机体对结核菌的免疫力
 - 明确肺结核病人是否需隔离治疗
77. 未曾接种卡介苗的3岁以下儿童结核菌素试验强阳性,提示
- 机体反应性差
 - 需接种卡介苗
 - 患有活动性结核病
 - 曾有结核菌感染
 - 严重营养不良
78. 结核菌主要的传播途径是
- 消化道
 - 泌尿道
 - 生殖道
 - 呼吸道
 - 皮肤接触
79. 早期诊断肺结核的主要方法是
- 结核菌素试验
 - 痰结核菌检查
 - 血液检查
 - 纤维支气管镜检查
 - X线检查
80. 继发性肺结核中最常见的类型为
- 原发型肺结核
 - 血行播散型肺结核
 - 浸润型肺结核
 - 慢性纤维空洞型肺结核
 - 结核性胸膜炎
81. 对肺结核病人进行病情观察时,发现下列何种情况提示病情较重,应加强护理
- 低热盗汗,颧部潮红
 - 软弱疲乏,精神不振
 - 食欲减退,体重减轻
 - 胸闷不适,咳嗽咯痰
 - 高热不退,脉搏快速,呼吸急促
82. 对肺结核咯血病人的病情观察,主要应密切注意
- 体温变化
 - 脉搏变化
 - 呼吸变化
 - 有无休克早期表现
 - 有无窒息先兆表现

83. 可使人体产生对结核菌获得性免疫力的预防措施是
- 进行卡介苗接种
 - 普及结核病防治知识
 - 及早发现并治疗病人
 - 隔离病人,消毒衣物
 - 加强锻炼,增强体质
84. 结核菌吸入人体后发生变态反应的时间是
- 1周
 - 2周
 - 3周
 - 4~8周
 - 9~10周
85. 结核病化疗联用的主要目的
- 减少并发症
 - 避免发生耐药性,增加疗效
 - 避免不良反应
 - 可完全杀灭结核菌
 - 缩短疗程
86. 肺癌早期的重要体征是
- 呼吸加快
 - 语颤增强
 - 叩诊呈浊音或实音
 - 听到局限性喘鸣音,咳嗽后不消失
 - 出现消瘦及恶病质
87. 肺癌早期特异性的表现是
- 刺激性呛咳呈金属音
 - 咯血
 - 胸痛
 - 胸闷、气促
 - 发热、消瘦
88. 持续痰中带血最可能的疾病是
- 支气管炎
 - 肺炎
 - 肺气肿
 - 肺癌
 - 心脏病
89. 与吸烟有密切关系,且是肺癌中恶性程度最高的一种应是
- 鳞状上皮癌
 - 小细胞未分化癌
 - 大细胞未分化癌
 - 腺癌
 - 细支气管肺泡癌
90. 诊断支气管肺癌最可靠的手段是
- 病史、体征
 - 胸部X线检查
 - 支气管造影
 - 胸部CT检查
 - 纤维支气管镜检查
91. 肺癌患者出现声音嘶哑,应考虑
- 压迫食管
 - 压迫颈交感神经
 - 压迫喉返神经
 - 压迫膈神经
 - 压迫上腔静脉
92. 按组织学分型,支气管肺癌最常见的类型为
- 鳞状上皮细胞癌
 - 小细胞未分化癌
 - 大细胞未分化癌
 - 腺癌
 - 细支气管-肺泡细胞癌
93. 继发性气胸发生的原因可能为
- 继发于肺部疾病引起的肺气肿
 - 胸膜下微小的肺大泡破裂
 - 屏气用力或剧烈咳嗽
 - 从高压的环境突然进入低压环境
 - 持续正压人工呼吸时加压过高
94. 自发性气胸最常见的症状是
- 胸痛,随之出现呼吸困难
 - 咯血
 - 咳嗽
 - 咯痰
 - 有休克征象
95. 张力性气胸的重要表现是
- 突发胸痛