

紧扣考试大纲
反映最新命题趋势

医师资格考试历年真题纵览与考点评析

2015

口腔助理医师资格考试

临考押题试卷及解析

主编 夏登胜 谭包生 石 莉

 军事医学科学出版社

医师资格考试历年真题纵览与考点评析丛书——

2015 口腔助理医师资格考试 临考押题试卷及解析

主 编 夏登胜 谭包生 石 莉

军事医学科学出版社

· 北 京 ·

模拟试卷一

将相应题号的标度字母所填的方格涂黑。

1. 下列有关血红蛋白的叙述, 正确的是

- A. 血红蛋白是含有铁卟啉的蛋白质
- B. 血红蛋白的氨基酸残基为 574 个
- C. 1 个血红蛋白分子含 4 个亚基
- D. 血红素是 1 个亚基的辅基
- E. 血红蛋白是含铜蛋白

2. 蛋白质二级结构是指分子中

- A. 氨基酸的排列顺序
- B. 每一个氨基酸侧链的空间位置
- C. 肽链主链的空间构象
- D. 亚基间相对的空间位置
- E. 每一个原子的相对空间位置

3. 下列有关肽键的叙述正确的是

- A. 由 C_α -H-C-COOH 组成
- B. 由 C_α 和 C_β 组成
- C. 由 C 和 N 组成
- D. 肽键有一定程度双键性质
- E. 肽键可以自由旋转

4. 不是氨基酸侧链分子中化学键的是

- A. 盐键
- B. 氢键

5. 下列有关血浆蛋白的叙述, 错误的是

- A. 存在于细胞外液, 在血浆中含量为 70g/L
- B. 由肝、肾、肠、腺体等合成
- C. 并不参与血液凝固

6. 关于糖来源的叙述, 错误的是

- A. 肠道吸收的葡萄糖
- B. 肝糖原分解成葡萄糖入血液
- C. 肌肉糖原解成葡萄糖入血液
- D. 非糖物质在肝脏异生成糖入血液
- E. 乳糖经肠中的乳糖酶在肝生成葡萄糖

7. DNA 变性时其结构变化表现为

- A. 磷酸二酯键断裂
- B. N-C 键断裂
- C. 肽键内 C-O 键断裂
- D. 碱基内 C-S 键断裂
- E. 对应碱基 C-G 键断裂

8. 核酸中含量相对较少的元素是

- A. 氧
- B. 氮
- C. 氢

第一单元

A1 型题

答题说明

每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 下列有关血红蛋白的叙述,正确的是
 - 血红蛋白是含有铁卟啉的单亚基球蛋白
 - 血红蛋白的氧解离曲线为 S 状
 - 1 个血红蛋白分子可与 1 个氧分子可逆结合
 - 血红蛋白与肌红蛋白的结构及氧解离曲线相同
 - 血红蛋白不是变构蛋白
- 蛋白质二级结构是指分子中
 - 氨基酸的排列顺序
 - 每一个氨基酸侧链的空间构象
 - 局部主链的空间构象
 - 亚基间相对的空间位置
 - 每一个原子的相对空间位置
- 下列关于肽键性质和组成的叙述正确的是
 - 由 CH 和 C - COOH 组成
 - 由 CH₁ 和 CH₂ 组成
 - 由 CH 和 N 组成
 - 肽键有一定程度双键性质
 - 肽键可以自由旋转
- 不是维系蛋白质分子中化学键的是
 - 盐键
 - 疏水键
 - 氢键
 - 肽键
 - 二硫键
- 下列有关血浆清蛋白的叙述,错误的是
 - 分子量相对较小,在血浆中含量最多
 - 表面带有大量正电荷,能使水分子凝集在其表面
 - 可运输游离脂肪酸
 - 可维持血浆胶体渗透压
 - 并不参与血液凝固
- 关于血糖来源的叙述,错误的是
 - 肠道吸收的葡萄糖
 - 肝糖原分解成葡萄糖入血液
 - 肌糖原分解成葡萄糖入血液
 - 非糖物质在肝脏异生成糖入血液
 - 乳酸循环中的乳酸在肝生成糖后入血液
- DNA 变性时其结构变化表现为
 - 磷酸二酯键断裂
 - N - C 糖苷键断裂
 - 戊糖内 C - C 键断裂
 - 碱基内 C - C 键断裂
 - 对应碱基间氢键断裂
- 核酸中含量相对恒定的元素是
 - 氧
 - 氮
 - 氢
 - 碳
 - 磷
- 下列有关类脂的叙述中错误的是

- A. 包括胆固醇、磷脂、糖脂
 - B. 组成生物膜的成分
 - C. 分布于各种组织中
 - D. 神经组织含量最少
 - E. 可供给必需脂肪酸
10. 救治过敏性休克首选的药物是
- A. 肾上腺素
 - B. 多巴胺
 - C. 异丙肾上腺素
 - D. 去甲肾上腺素
 - E. 多巴酚丁胺
11. 影响生物利用度较大的因素是
- A. 给药次数
 - B. 给药时间
 - C. 给药剂量
 - D. 给药途径
 - E. 年龄
12. 下列有关胎盘屏障的叙述,错误的是
- A. 是胎盘绒毛与子宫血窦间的屏障
 - B. 通透性与一般毛细血管相同
 - C. 几乎所有药物均可通过
 - D. 可阻止药物从母体进入胎儿血循环中
 - E. 妊娠妇女原则上应禁用一切影响胎儿发育的药物
13. 药物按零级动力学消除是指
- A. 吸收与代谢平衡
 - B. 单位时间内消除恒定比例的药物
 - C. 单位时间内消除恒定量的药物
 - D. 血浆浓度达到稳定水平
 - E. 药物完全消除
14. 阿托品滴眼可引起
- A. 扩瞳、升高眼内压、调节麻痹
 - B. 扩瞳、升高眼内压、调节痉挛
 - C. 扩瞳、降低眼内压、调节麻痹
 - D. 缩瞳、降低眼内压、调节麻痹
 - E. 缩瞳、降低眼内压、调节痉挛
15. 治疗胆绞痛应首选
- A. 阿托品
 - B. 哌替啶
 - C. 阿司匹林
 - D. 阿托品 + 哌替啶
 - E. 阿托品 + 阿司匹林
16. 下列哪一项不属于阿托品的不良反应
- A. 口干舌燥
 - B. 恶心、呕吐
 - C. 心动过速
 - D. 皮肤潮红
 - E. 视近物模糊
17. 常用局麻药中,有抗心律失常作用的是
- A. 普鲁卡因
 - B. 利多卡因
 - C. 丁卡因
 - D. 布比卡因
 - E. 阿替卡因
18. 用药前应做皮肤过敏试验的局麻药是
- A. 普鲁卡因
 - B. 利多卡因
 - C. 丁卡因
 - D. 布比卡因
 - E. 罗哌卡因
19. 去甲肾上腺素的药理作用是
- A. 心脏兴奋,皮肤黏膜血管收缩
 - B. 收缩压升高,舒张压降低,脉压加大
 - C. 收缩肾血管,扩张骨骼肌血管
 - D. 心脏兴奋,支气管平滑肌松弛
 - E. 明显的中枢兴奋作用
20. 培养真菌时最适宜的 pH 值是

- A. pH 1~2
B. pH 3~4
C. pH 5~6
D. pH 7~8
E. pH 9~10
21. 关于牙钳的使用,下列正确的是
A. 钳喙应尽量向根方夹持
B. 夹持不可太紧,否则易断根
C. 多个牙拔除时尽量选用万能牙钳
D. 手掌握持时应尽量靠近牙钳关节
E. 使用牙钳只能唇(颊)舌(腭)向摇动,否则易断根
22. 下列何种情况下阻生齿可暂不拔除
A. 阻生齿有反复发生冠周炎病史
B. 阻生齿近中出现食物嵌塞
C. 完全骨埋伏阻生齿临床无症状
D. 正畸科要求拔除
E. 阻生齿大面积龋坏
23. 关于氯己定的抗菌机制,下列哪项说法是正确的
A. 能与细菌细胞壁的阳离子作用,增加细胞壁的通透性
B. 系二价阴离子表面活性剂
C. 能与唾液碱性糖蛋白的酸性基团结合
D. 能阻碍唾液细菌对牙面的吸附
E. 取代 Ca^{2+} 与唾液中的碱性凝集因子作用
24. 关于妊娠期拔牙的注意事项哪项是错误的
A. 妊娠期前3个月不宜拔牙,否则易流产
B. 妊娠6个月以后拔牙较好
C. 妊娠4~6个月时拔牙较为合适
D. 不用含肾上腺素的局麻药
E. 保证手术无痛,以增加安全性
25. 糖尿病患者,血糖低于多少且无酸中毒症状时可考虑拔牙
A. 150 mg/dl
B. 160 mg/dl
C. 170 mg/dl
D. 180 mg/dl
E. 190 mg/dl
26. 拔牙时晕厥的处理下列哪项是不必要的
A. 立即停止手术,保持呼吸道畅通
B. 闻刺激性气体
C. 吸氧
D. 输液纠正酸碱平衡紊乱
E. 必要时静脉推注高渗葡萄糖
27. 以下哪种情况应暂缓拔牙
A. 妊娠4、5、6个月
B. 糖尿病患者的血糖 150 mg/dl,尿糖(+),无酸中毒
C. 急性智齿冠周炎伴嚼肌间隙感染
D. 甲状腺功能亢进治疗后心率低于 100 次/min
E. 高血压血压控制在 21.3~13.3 kPa (160/100 mmHg)
28. 影响种植体骨结合的因素是
A. 手术创伤
B. 患者自身条件差
C. 种植体过早负荷
D. 种植体材料的生物相容性差
E. 以上均是
29. 下牙槽神经阻滞麻醉时出现面瘫,处理方法为
A. 不行特殊处理
B. 局部理疗
C. 口服解痉类药物
D. 中草药外敷
E. 注射维生素 B_1 、 B_2
30. 关于切开拔除阻生智齿的切口设计错误的是

- A. 远中切口勿偏舌侧
B. 颊侧切口与远中切口的末端成 45° 角向下
C. 颊侧切口应超过前庭沟, 以充分暴露视野
D. 应做黏骨膜全层切开, 紧贴骨面将瓣翻起
E. 缝合后切口下应有足够骨支持
31. WHO 确定的龋病诊断标准是
A. 釉质上的白斑
B. 釉质上的着色不平坦区
C. 探针可插入着色窝沟, 底部不发软
D. 探诊窝沟底部发软, 釉质有潜在损害或沟壁软化
E. 釉质上硬的凹陷
32. 下列有关乳牙龋坏的危害性, 哪一项是错误的
A. 影响患儿咀嚼功能
B. 影响相邻的恒牙
C. 影响继承恒牙的恒牙胚
D. 容易造成相对部位的黏膜溃疡
E. 造成恒牙正中咬合关系的异常, 形成牙列畸形
33. 下面哪种食物具有防龋的作用
A. 绿叶蔬菜
B. 奶制品
C. 碳酸饮料
D. 糖果、巧克力
E. 饼干
34. 按发病情况和进展速度分类, 可将龋病分为
A. 急性龋、慢性龋、继发龋
B. 浅龋、中龋、深龋
C. 窝沟龋、平滑面龋
D. 恒牙龋、乳牙龋
E. 牙釉质龋、牙本质龋和牙骨质龋
35. 乳牙修复治疗下列哪一项描述是错误的
A. 广泛龋也可以树脂修复
B. 必须去净腐质
C. 必须采用双层垫底
D. 玻璃离子是较为理想的充填材料
E. 前牙后牙均可采用复合树脂充填
36. 乳牙充填后, 继发龋是常见的并发症, 下面哪一项是常见的原因
A. 乳牙牙龈乳头位置低, 容易嵌塞食物
B. 乳牙釉质无机物含量高, 儿童喜食甜食, 故易产酸脱矿
C. 软化牙本质去除过多
D. 乳牙备洞时不易达到抗力型和固位型, 充填体易松动
E. 乳牙牙髓血运少, 抵抗力低
37. 关于年轻恒牙龋坏的治疗, 哪一项描述是错误的
A. 尽早发现, 尽早治疗
B. 年轻恒牙硬组织弹性好, 易形成固位型
C. 髓腔大, 髓角高, 易穿髓
D. 以恢复解剖形态为目的, 不强调恢复接触点
E. 急性龋多见, 去腐易穿髓
38. 有关乳牙龋病的预防, 哪一项是正确的
A. 龋病的预防工作, 应有家长参与完成
B. 出生 6 个月后, 即应诱导幼儿刷牙
C. 饮食管理主要是进软甜食后要刷牙
D. 氟化亚锡和氟化氨银可作为预防药物使用
E. 对乳磨牙窝沟较深处可做窝沟封闭以防龋
39. 下列哪一项不是乳牙拔除适应证
A. 牙冠破坏严重, 无法修复的乳牙
B. 替换期, 牙根吸收 $1/3$ 以上, 不能做根管治疗者
C. 根尖周炎症侵及恒牙胚, 或恒牙牙根已形成 $3/4$ 或恒牙胚顶端牙槽骨已消失
D. 外伤不能保留的乳牙
E. II 度松动的乳牙

40. 以下是牙隐裂的辅助检查方法, 除外

- A. X 线检查
- B. 试验性备洞
- C. 咬诊
- D. 染色法
- E. 透照法

41. 逆行性牙髓炎不同于其他牙髓炎的临床表现特点是

- A. 冷测缓解疼痛
- B. 有阵发性自发痛
- C. 热测引起迟缓痛
- D. 深及根尖的牙周袋
- E. 松动Ⅱ度, 叩痛(++)

42. V 类洞制备的要点包括

- A. 倒凹固位应做于龈轴和殆(切)轴线角处
- B. 倒凹固位应做于近中轴和远中轴线角处
- C. 近远中壁和轴柱垂直
- D. 对抗力形要求高
- E. 洞壁与轴壁平行

43. G. V Black 分类考虑的窝洞充填材料是

- A. 复合树脂
- B. 复合体
- C. 银汞合金
- D. 玻璃离子水门汀
- E. 磷酸锌水门汀

44. 畸形中央尖常见于

- A. 上颌第二前磨牙
- B. 下颌第二前磨牙
- C. 上颌第一前磨牙
- D. 下颌第一前磨牙
- E. 上颌前磨牙

45. 不宜做桩冠修复的人群是

- A. 18 岁以下
- B. 20 岁以上

C. 育龄期妇女

D. 65 岁以上的老年人

E. 轻度心血管疾病的成人患者

46. 急性牙髓炎最具诊断特点的是下列哪项

- A. 自发痛阵发性加重
- B. 冷刺激引起疼痛
- C. 热刺激引起疼痛
- D. 痛向颌面部放射
- E. 持续性痛、叩痛

47. 关于医疗损害责任的赔偿主体, 下列说法正确的是

- A. 患者在诊疗活动中受到损害, 医务人员有过错的, 由医务人员承担赔偿责任
- B. 患者在诊疗活动中受到损害, 医疗机构有过错的, 也应当承担民事赔偿比例
- C. 患者在诊疗活动中受到损害, 医务人员有过错的, 也应当适当承担民事赔偿比例
- D. 患者在诊疗活动中受到损害, 医疗机构及其医务人员有过错的, 由医疗机构和医务人员承担连带赔偿责任
- E. 患者在诊疗活动中受到损害, 医疗机构及其医务人员有过错的, 由医疗机构承担赔偿责任

48. 下列关于医学模式的说法, 哪一项是错误的

- A. 生物医学模式是建立在近代生物学、化学、物理学和社会实践基础之上的医学模式
- B. 生物医学模式认为任何一种疾病都可在器官、细胞或生物大分子上找到可测量的、形态的或化学的改变
- C. 医学模式向生物-心理-社会医学模式的转变在本质上反映了医学道德的进步
- D. 生物医学模式对人类健康、疾病的认识是片面的, 没有对医学起推动作用
- E. 20 世纪下半叶开始, 医学模式由生物医学模式逐渐转变为生物-心理-社会医学模式

49. 医学伦理学原则中的最高层次是
- 不伤害患者
 - 有利于患者
 - 全心全意为人民身心健康服务
 - 尊重患者的自主性
 - 公正地对待患者
50. 医学道德评价的方式包括
- 医德原则、医德规范、医德范畴
 - 医德原则、医德规范、内心信念
 - 社会舆论、传统习俗、医德范畴
 - 社会舆论、传统习俗、内心信念
 - 社会舆论、医德原则、内心信念
51. 医师注册后有下列情形之一的,其所在的医疗、预防、保健机构应当在三十日内报告准予注册的卫生行政部门,卫生行政部门应当注销注册,收回医师执业证书,除了
- 中止执业医师满二年的
 - 受吊销医师执业证书行政处罚的
 - 死亡或者被宣告失踪的
 - 中止医师执业活动满一年的
 - 有国务院卫生行政部门规定不宜从事医疗、预防、保健业务的其他情形的
52. 不予医师执业注册的情形是
- 受刑事处罚,刑罚执行完毕之日起不满三年或者受吊销医师执业证书行政处罚,自处罚之日起不满二年的
 - 受吊销医师执业证书行政处罚自处罚之日起不满三年的
 - 受刑事处罚,刑罚执行完毕之日起不满二年或者受吊销医师执业证书行政处罚,自处罚之日起不满三年的
 - 受刑事处罚,刑罚执行完毕之日起不满二年或者受吊销医师执业证书行政处罚,自处罚之日起不满二年的
 - 受刑事处罚,自刑事处罚执行完毕之日起不满五年的
53. 我国发生的严重急性呼吸综合征(SARS),很快波及许多省市,这种发病情况称为
- 暴发
 - 流行
 - 季节性升高
 - 周期性流行
 - 长期变异
54. 根据《传染病防治法》,按甲类传染病原则处置的乙类传染病是
- 霍乱、鼠疫
 - 鼠疫、天花
 - 艾滋病、鼠疫
 - 天花、霍乱
 - 艾滋病、肺炭疽
55. 传染病暴发流行时,必要时当地政府可以采取以下紧急措施,除了
- 临时征用房屋、交通工具
 - 限制或者停止集市、集会、影剧院演出或者其它人群聚集的活动
 - 停工、停业、停课
 - 封闭被传染病病原污染的公共饮用水
 - 停止一切活动
56. 双端固定桥牙体预备应注意的问题,主要的是
- 殆面磨除要足
 - 两个基牙要有共同就位道
 - 邻面片切应到龈下0.5 mm
 - 两个基牙的四个片切面都必须绝对水平
 - 基牙不能有倒凹
57. 1|1 缺失,基牙健康,选择何种修复体最好
- 2|2 固定桥
 - 32|2 固定桥
 - 32|23 固定桥
 - 局部义齿
 - 2|23 固定桥

58. 在正常情况下, $\overline{42}$ 缺失, 考虑做固定义齿修复时, 最理想的设计是
- 以 $\overline{531}$ 为基牙的复合固定桥
 - 以 $\overline{53}$ 为基牙的复合固定桥
 - 以 $\overline{3}$ 为基牙的单端固定桥
 - 以 $\overline{31|1}$ 为基牙的复合固定桥
 - 以 $\overline{31}$ 为基牙的复合固定桥
59. 下面哪个固定体不是冠位体
- 全冠
 - 甲冠
 - 开面冠
 - 高嵌体
 - 3/4 冠
60. 口腔专科病史中的修复治疗史不包括
- 是否曾做过牙体修复
 - 是否曾做过牙列缺损修复
 - 曾采用何种修复方式
 - 现在修复体的使用情况
 - 患者希望的修复方式
61. 制作固定义齿需要等待伤口愈合的合适时间是在拔牙后
- 1 个月
 - 2 个月
 - 3 个月
 - 3~6 个月
 - 1 年以上
62. 对于倾斜基牙, 难以获得共同就位道时, 可行的处理方法是
- 对于轻度倾斜移位的基牙, 可以在倒凹大的一侧多磨除适当的牙体组织
 - 正畸治疗以改变牙体长轴方向
 - 根管治疗后行桩冠修复改变方向
 - 对倾斜面的预备不要求将最大周径线降至颈缘
 - 以上都是
63. 下列关于单端固定桥的描述, 正确的是
- 桥体与固位体之间一端为固定连接, 另一端为活动连接
 - 受力主要由桥体承担, 基牙不会受到损害
 - 桥体的一端必须与邻牙接触
 - 适用于缺牙间隙较大的牙列缺损修复
 - 又称悬臂固定桥
64. 设计半固定桥的主要原因是
- 应力缓冲
 - 以便获得共同的就位道
 - 制作方便
 - 美观
 - 价格便宜
65. 固定义齿选择基牙时, 以下哪种说法不确切
- 牙冠长大
 - 牙根长大
 - 活髓牙
 - 牙周健康
 - 基牙位置正常
66. 固定桥修复失败, 最常见的原因因为
- 固位体松动或脱落
 - 基牙松动
 - 桥体殆力过大
 - 连接体为活动连接
 - 固位体选择桩冠
67. 修复体的固位力与下列哪种因素无关
- 制备牙轴面聚合度
 - 黏结剂的厚度
 - 接触面积
 - 制备牙的松动感
 - 修复体与制备牙密合度
68. 需要考虑增加固定桥基牙数目的情况是
- 基牙为单根牙
 - 基牙轻度倾斜

- C. 基牙牙冠形态异常
D. 基牙牙槽骨吸收 1/3 以上
E. 无对颌功能的基牙
69. 与减少桥体殆力不相关的是
A. 减少颊舌径
B. 增大舌侧外展隙
C. 降低牙尖高度
D. 增加食物溢出道
E. 轴面形态
70. 黏结固定桥的特点是
A. 主要以牙体预备的固位形获得固位作用
B. 牙体预备时磨削牙体组织较多
C. 主要利用黏结材料的黏结力起到固位作用
D. 黏结材料的黏结力与固定桥的固位关系不大
E. 适用于多数牙缺失的修复
71. 腮腺良性肿瘤中最常见的是
A. 圆柱瘤
B. 多形性腺瘤
C. 腺淋巴瘤
D. 腺瘤
E. 神经纤维瘤
72. 牙源性角化囊肿衬里上皮的组织来源可能是
A. 结合上皮
B. 缩余釉上皮
C. 上皮根鞘剩余
D. 牙板上皮剩余
E. 牙乳头
73. 发生在舌下腺的恶性肿瘤,应首先考虑
A. 多形性腺瘤
B. 腺样囊性癌
C. 黏液表皮样癌
D. 腺泡细胞癌
E. 恶性多形性腺瘤
74. 甲状舌管囊肿好发部位为颈中线的是哪项
A. 骨上部
B. 舌骨下部
C. 舌骨上下部
D. 舌根部
E. 胸骨切迹
75. 按世界卫生组织对口腔鳞癌的分级方法,角化珠多见、多形性较轻者应为
A. I 级鳞癌
B. II 级鳞癌
C. III 级鳞癌
D. IV 级鳞癌
E. V 级鳞癌
76. 含牙囊肿有以下病理改变,除了
A. 囊壁较薄
B. 衬里上皮为角化的复层鳞状上皮
C. 上皮只由 2~3 层扁平或矮立方形细胞组成
D. 无明显上皮钉突
E. 囊壁中偶尔可见牙源性上皮岛
77. 较易发生淋巴结转移的肿瘤是
A. 舌癌
B. 唇癌
C. 腺淋巴瘤
D. 基底细胞癌
E. 多形性腺瘤
78. 下列哪项不是腺样囊性癌的临床病理特点
A. 浸润性极强,易沿神经扩散
B. 易侵入血管,早期发生远处转移
C. 极易发生颈部淋巴结转移
D. 可沿骨髓腔扩散
E. 单纯放疗不能达到根治
79. 上皮异常增生可表现下列变化,除了
A. 上皮基底细胞极性消失

- B. 基底细胞液化变性
C. 上皮钉突呈滴状
D. 有丝分裂相增加
E. 细胞核浓染
80. 下颌神经的分支不包括
A. 蝶腭神经
B. 颞深神经
C. 翼外肌神经
D. 咬肌神经
E. 颊神经
81. 面前静脉接纳静脉血的区域不包括
A. 内眦
B. 鼻背
C. 眶下区
D. 上、下唇
E. 腮腺区
82. 汇合成面总静脉的静脉分支是
A. 面前静脉和面后静脉的前支
B. 面前静脉和面后静脉的后支
C. 面前静脉和耳后静脉
D. 面前静脉和颞浅静脉
E. 颞浅静脉和颌内静脉
83. 关于翼静脉丛广泛交通的描述哪项是正确的
A. 向后外经颌内静脉汇入面后静脉
B. 向前经面深静脉汇入面前静脉
C. 向上经卵圆孔网和破裂孔导血管等与海绵窦交通
D. 收集口腔颌面及眼的静脉血
E. 以上全对
84. 通过颊间隙的重要组织结构不包括以下哪项
A. 面神经分支
B. 颌外动脉
C. 颌内动脉
D. 腮腺导管
E. 面前静脉
85. 颈鞘内包裹的组织不包括
A. 颈内静脉
B. 颈内动脉
C. 迷走神经
D. 颈外动脉
E. 颈总动脉
86. 属于面侧深区解剖结构的是
A. 翼丛、颌外动脉、翼外肌
B. 下颌神经、颌外动脉、翼内肌
C. 翼丛、翼外肌、下颌神经
D. 颌外动脉、翼内肌、翼外肌
E. 翼丛、颌外动脉、翼内肌
87. 颈总动脉分为颈内动脉和颈外动脉的部位是
A. 平甲状软骨下缘
B. 平甲状软骨上缘
C. 平甲状软骨中 1/2 处
D. 平舌骨上缘
E. 平舌骨下缘
88. 切牙乳突的作用是
A. 排列上颌中切牙的参考标志
B. 确定殆平面的标志
C. 确定基托伸展范围的标志
D. 确定牙槽嵴顶的标志
E. 确定后堤区的标志
89. 根据气管颈段解剖特点行气管切开术时注意点不包括
A. 采取头正中后仰位, 以免伤及颈总动脉
B. 多在 3~5 气管软骨环范围内切开, 不宜过深以免伤及食管
C. 应切断甲状腺峡部, 防止出血
D. 勿切环状软骨, 防止发生喉狭窄
E. 切口不应低于第 5 气管软骨环, 以免伤及无名动脉

A2 型题

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

90. 某年轻女患者,自诉左侧乳房有硬结,到某医院外科诊治。经活体组织检查证实为乳腺癌。经患者及其家属同意后,收住院行乳腺癌根治术。在术中右侧乳房也做了活体组织切片,检查结果为“乳腺瘤性肿瘤,伴有腺体增生”。虽然目前不是癌组织,但是将来有癌变的可能性,医生决定将右侧乳房切除。术后患者及其家属认为,医生未经患者或其家属同意切除右侧乳房,要求追究医生的责任并要求赔偿。上述病例从伦理学上分析,下列哪一个说法是正确的

- A. 该医生未经患者及其家属同意,自行切除患者右侧乳房,损害了患者的知情同意权
- B. 该医生为了防止右侧乳房癌变,切除右侧乳房的做法是正确的
- C. 该医生未经患者及其家属同意,自行切除患者右侧乳房,是对患者的伤害,不符合无伤原则
- D. 患者及其家属的赔偿要求是无理的
- E. 以上说法都不对

91. 青年李某,右下腹疼痛难忍,到医院就诊。经医师检查、检验,当即诊断为急性阑尾炎,遂对其施行阑尾切除术。手术情况正常,但拆线时发现伤口愈合欠佳,有淡黄色液体渗出。手术医师告知,此系缝合切口的羊肠线不为李某人体组织吸收所致,在临床中少见。经过近 1 个月的继续治疗,李某获得痊愈。根据《医疗事故处理条例》规定,李某被拖延近 1 个月后才得以痊愈。这一客观后果,应当属于

- A. 二级医疗事故
- B. 三级医疗事故
- C. 四级医疗事故

- D. 因患者体质特殊面发生的医疗意外
- E. 因不可抗力而造成的不良后果

92. 某蓄电池厂男工,工龄 8 年,主诉头昏,头痛,乏力,记忆力减退,睡眠障碍,纳差,脐周隐痛,经尿检 6-ALA 为 $28.6 \mu\text{mol/L}$,其诊断

- A. 慢性铅中毒
- B. 慢性苯中毒
- C. 慢性汞中毒
- D. 慢性氰化物中毒
- E. 慢性硫化氢中毒

93. 患者女 36 岁,因急性一氧化碳中毒入院,治疗 1 周后症状消失出院,2 个月后突然出现意识障碍,既往无高血压及脑血管病史,最可能的诊断是

- A. 脑出血
- B. 脑梗死
- C. 肝性脑病
- D. 中毒迟发脑病
- E. 中间综合征

94. 患者男,40 岁,入院后确诊为氰化物中毒,患者呼吸气味可呈

- A. 烂苹果味
- B. 蒜臭味
- C. 腥臭味
- D. 酒味
- E. 苦杏仁味

95. 患者女,55 岁。20 年来因丈夫有外遇,夫妻感情不佳,总想离婚,但舍不得孩子,又怕丢面子,来到心理咨询门诊,想咨询离婚还是不离婚好。此时,心理咨询师应注意采用的原则是

- A. 回避原则
B. 中立原则
C. 耐心原则
D. 综合原则
E. 灵活原则
96. 患者 11 龋充填后 3 天出现自发痛、咬合痛。查:11 叩(++)松动 I 度,充填体完整,牙龈轻度红肿,冷热测无反应。该患牙 3 天前处理中,存在的最可能的问题是
- A. 牙髓情况误判
B. 材料选择不当
C. 洞形制备不当
D. 充填时未垫底
E. 腐质没有去尽
97. 患者,女性,40 岁。左下后牙遇冷热及刷牙时有酸痛感,刺激去除后酸痛感立即消失。检查:左下颌第一磨牙殆面磨损,暴露牙本质,探诊颊殆斜面有酸痛区,叩痛(-)。该患者首先考虑的疾病是
- A. 牙隐裂
B. 磨损
C. 磨牙症
D. 酸蚀症
E. 牙本质过敏症
98. 婴儿,男,出生 5 天,啼哭拒食,口腔黏膜出现微凸的软白小点,擦去后可露出出血面,拟诊为
- A. 早萌乳牙
B. 婴儿白斑
C. 新生儿雪口病
D. 牙龈角化上皮珠
E. 以上都不是
99. 60 岁男性,左耳垂下无痛性肿物缓慢长大 4 年,局部有胀感。检查见肿块位于腮腺后下极,表面光滑,质中偏软,不可压缩,与皮肤无粘连。最可能的诊断是
- A. 腮腺混合瘤
B. 腮腺淋巴瘤
C. 腮腺内慢性淋巴结炎
D. 腮腺血管瘤
E. 腮腺囊肿
100. 患者女,左上 5 行双端固定修复,固定桥试戴时用力戴入,基牙出现胀痛不适,最可能的原因是
- A. 就位道不一致
B. 有早接触点
C. 基牙牙髓炎
D. 邻接关系过紧
E. 邻牙根尖病变
101. 患者女,14 岁,左上 1 冠折 1/2,咬合关系正常,患牙经根管治疗后,最好选用哪种桩冠修复
- A. 成品桩桩冠
B. 金属核桩冠
C. 铸造舌背桩冠
D. 0.7 mm 不锈钢丝弯制桩冠
E. 1.2 mm 不锈钢丝弯制桩冠
102. 患者 22、24 缺失,设计 23、25 修复 24,23 修复 22 的固定桥,该种固定桥称
- A. 双端固定桥
B. 半固定桥
C. 单端固定桥
D. 复合固定桥
E. 种植固定桥
103. 患者,女性,25 岁,怀孕 5 个月,怀孕后,反复发生冠周炎,1 周前再次发作,经治疗后治愈,目前最佳处理方法是
- A. 龈瓣切除
B. 拔除
C. 冲洗上药

D. 理疗

E. 口服抗生素

104. 患者,女性,30岁,于[8]拔除过程中因疼痛紧张,而出现胸闷、心慌、面色苍白、四肢湿冷、脉快而弱,此情况属于

A. 肾上腺素反应

B. 麻药中毒

C. 瘰症

D. 麻药过敏

E. 晕厥

105. 患者,女性,24岁,拔除近中阻生[8]后3天出现咽喉疼痛,张口受限,检查见[8]拔牙创血块存在,舌侧黏膜红肿,压痛明显,此患者最

大可能是

A. 干槽症

B. 咽颊前间隙感染

C. 舌侧骨板断裂

D. 舌神经损伤

E. 牙槽突骨折

106. 李某,男性,38岁,要求拔除左下水平低位埋伏阻生智齿,此时不正确的处理是

A. X线牙片检查

B. 行下齿槽神经麻醉

C. 舌侧翻瓣

D. 术后仔细清理牙槽窝

E. 术后口服抗生素

B1 型题

答题说明

以下提供若干组考题,每组题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(107 ~ 109 题共用备选答案)

A. 颞下颌韧带

B. 蝶下颌韧带

C. 关节囊

D. 茎突下颌韧带

E. 盘 - 锤韧带

107. 限制下颌过度向前运动的是

108. 悬吊下颌并保护进入下颌孔的血管、神经的是

109. 防止下颌侧方脱位的是

(110 ~ 112 题共用备选答案)

A. 与主根管成直角走行,贯穿牙本质和牙骨质的根管的细小分支

B. 与主根管成平行的根管分支

C. 根管在根尖分散的细小分支

D. 在单根的两个根管之间相交通的联络侧支

E. 从髓室底发出至根分歧处的管道

110. 副根管是

111. 根管侧支是

112. 根尖分歧是

(113 ~ 115 题共用备选答案)

A. 成釉器

B. 牙乳头

C. 牙囊

D. 缩余釉上皮

E. Malassez 上皮剩余

113. 形成釉质的是

114. 形成牙周膜的是

115. 上皮根鞘的残余上皮是

(116 ~ 119 题共用备选答案)

- A. 在成牙本质细胞和矿化牙本质之间是一层未钙化的牙本质
 - B. 牙本质钙质小球之间遗留的未钙化间质
 - C. 在冠部靠近釉质和根部靠近牙骨质最先形成的牙本质
 - D. 牙齿发育完成后形成的牙本质
 - E. 釉质表面因磨损、酸蚀、龋病等而遭受破坏时,部分成牙本质细胞继续形成的牙本质
116. 继发性牙本质是
117. 前期牙本质是
118. 修复性牙本质是
119. 小球间牙本质是

(120 ~ 123 题共用备选答案)

- A. 鼠疫、霍乱和炭疽
 - B. 甲类传染病患者和病原携带者、乙类传染病患者中的艾滋病患者、炭疽中的肺炭疽患者
 - C. 对疑似甲类传染病患者
 - D. 对除了艾滋病患者、肺炭疽患者以外的乙类传染病患者
 - E. 丙类传染病患者
120. 须予以隔离治疗的患者是
121. 哪种患者死亡后必须将尸体立即消毒,就近火化
122. 在明确诊断前,在指定场所进行医学观察的是
123. 必须根据病情,采取必要的治疗和控制传播措施的是

(124 ~ 125 题共用备选答案)

- A. 吊销执业证书
- B. 承担赔偿责任
- C. 追究刑事责任
- D. 罚款
- E. 责令暂停 6 个月以上 1 年以下执业活动

124. 造成医疗事故,情节严重

125. 隐匿、伪造或者擅自销毁医学文书及有关资料,构成犯罪的

(126 ~ 127 题共用备选答案)

- A. 暂停执业活动 3 个月至 6 个月
 - B. 暂停执业活动 6 个月至 1 年
 - C. 给予行政处分
 - D. 吊销医师执业证书
 - E. 追究刑事责任
126. 未经患者或其家属同意,对患者进行试验性治疗的,由卫生行政部门给予的处理是
127. 不按规定使用麻醉药品、精神药物,情节严重的,由卫生行政部门给予的处理是

(128 ~ 130 题共用备选答案)

- A. 由卫生行政部门给予处分,没收违法所得
 - B. 由工商行政管理部门处 1 万元以上 20 万元以下的罚款
 - C. 由卫生行政部门吊销其执业证书
 - D. 依法追究刑事责任
 - E. 依法承担赔偿责任
128. 医疗机构违反法律规定,给药品使用者造成损害的
129. 医疗机构负责人收受药品生产企业给予的财物的
130. 医疗机构在药品销售中暗中给予、收受回扣或者其他利益的

(131 ~ 133 题共用备选答案)

- A. 知情同意
 - B. 支持医学发展
 - C. 患者利益至上
 - D. 医德境界
 - E. 内心信念
131. 属于患者和受试者权利的是
132. 属于患者义务的是
133. 属于医德评价方式的是

A3 型题

答题说明

以下提供若干个案例,每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信息在每题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(134~135 题共用题干)

青年女性,有溃疡反复发作的病史 10 年,每次发作溃疡少于 5 个,症状轻,可以自行愈合。

134. 诊断为

- A. 轻型口疮
- B. 疱疹型溃疡
- C. 腺周口疮
- D. 疱疹性口炎
- E. 白塞综合征

135. 本次发病溃疡扩大,直径 1~2 cm,深及黏膜层,呈“弹坑状”损害,应诊断为

- A. 轻型口疮
- B. 疱疹型溃疡
- C. 腺周口疮
- D. 疱疹性口炎
- E. 白塞综合征

(136~138 题共用题干)

患者男,27 岁,具有剧烈自发性搏动性牙痛,遇冷刺激可暂时缓解。

136. 临床诊断可能是

- A. 急性牙髓炎浆液期
- B. 牙髓坏死
- C. 急性冠周炎
- D. 急性牙髓炎化脓期
- E. 急性根尖脓肿

137. 此时何种应急处理能最大限度地缓解疼痛

- A. 黏膜切开引流
- B. 开髓引流
- C. 根管引流
- D. 切开骨膜引流
- E. 面部冷敷,服用四环素类抗生素

138. 临床观察时最有可能伴有哪项阳性体征

- A. 叩痛
- B. 温度刺激痛
- C. X 线检查见根尖周有圆形或椭圆形边界清晰的透射区
- D. 牙齿松动
- E. 牙齿变色

(139~141 题共用题干)

患者,男性,34 岁。2 周来右侧后牙咬物不适,喝冷热水均引起疼痛。近 2 天来,夜间疼痛影响睡眠,并引起半侧头、面部疼痛,痛不能定位。检查时见右侧上、下后牙多个充填体。应继续进行检查。

139. 应进行检查中,以下哪一项最可能出现异常

- A. X 线片检查
- B. 温度测验
- C. 叩诊
- D. 松动度
- E. 牙周袋探诊

140. 发现可疑患牙后,以下哪项检查最重要

- A. X 线片检查
- B. 电活力测验
- C. 温度测验
- D. 松动度检查
- E. 染色试验

141. 当日最有效的治疗措施是

- A. 局麻下开髓,封失活剂
- B. 局麻封闭止痛
- C. 服消炎止痛药
- D. 针灸合谷、平安穴
- E. 以上均不是