


彩色中藥大典

編輯

劉接實 洪禎徽 張蔚炎 李坤城 邱德明 廖桂榮 詹台杰
洪禎禪 劉焜明 謝炫禔 傅鳳嬌 李金串 李喜昌 賴天旺 李正興

3



益大書局出版社

臨床實用
彩色中藥大典

3

益大書局出版社

臨床實用 彩色中藥大典

全書共四大冊特價：4000元


3

編輯：劉接寶 洪禎徽 張蔚炎 李坤城 邱德明
廖桂榮 詹台杰 洪禎儷 劉焜明 謝炫緯
傅鳳嬌 李金串 李喜昌 賴天旺 李正興

發行人：陳 振 東
出版者：益大書局出版社
登記證：局版台業字第2443號
總經銷：益大書局
地址：台北市八德路一段51號樓下83號
電話：(02)3911267・3519356
郵撥：0537202~9 蕭天岳帳戶
封面設計：蕭 一 鳴
製版：興旺彩色製版有限公司
印刷所：沅立彩色製版印刷股份有限公司
中華民國七十七年八月出版

本書如有缺頁破損，請寄回更換

版權所有



翻印必究

第三冊目錄

溫裏藥

蒼朮·····	6
丁香·····	10
八角茴香·····	14
肉桂·····	18
萹艾·····	22
高良薑·····	26
萹澄茄·····	30
黑胡椒·····	34
附子·····	38
草烏·····	42

瀉下藥

①潤下藥

黑芝麻·····	48
蜂蠟·····	52
火麻仁·····	56
番木瓜·····	60

②峻水瀉下藥

葶藶子·····	66
巴豆·····	70
商陸·····	74
馬藍·····	78
烏桕·····	82
大戟·····	86
芫花·····	90
甘遂·····	94
牽牛子·····	98

③攻下藥

大黃·····	104
---------	-----

開竅藥

水菖蒲·····	110
石菖蒲·····	114
麝香·····	118

安神藥

靈芝·····	124
遠志·····	128
啤酒花·····	132
酸棗仁·····	136

平肝息風藥

天麻·····	142
---------	-----

理氣藥

木香·····	148
沉香·····	152
長梗薤白·····	156
柿蒂·····	160
檀香·····	164
枳殼·····	168
甘松·····	172
降香·····	176
香附·····	180
佛手·····	184
白屈菜·····	188

理血藥

①活血祛瘀藥

紅花·····	194
---------	-----

積雪草·····	198
鈴蘭·····	202
喜樹·····	206
虎杖·····	210
丹參·····	214
矮地茶·····	218
郁金·····	222
藏紅花·····	226
桃仁·····	230
胡桃仁·····	234
三稜·····	238
益母草·····	242
莪朮·····	246

②止血藥

白及·····	252
三七·····	256
地錦草·····	260
仙鶴草·····	264
棕板·····	268
大蓟·····	272
小蓟·····	276
委陵菜·····	280
艾葉·····	284
卷柏·····	288
地榆·····	292
茜草·····	296
側柏葉·····	300

臨床實用
彩色中藥大典

3

益大書局出版社

臨床實用 彩色中藥大典

第一冊～第四冊

補益藥(1)補氣藥(2)助陽藥(3)養血藥(4)滋陰藥

解表藥(1)發散風熱藥(2)發散風寒藥

芳香化濕藥

利水滲濕藥

清熱藥(1)清熱瀉火藥(2)清肝明目藥(3)清熱涼血藥

(4)清熱燥濕藥(5)清熱解毒藥

祛風濕藥

溫裏藥

瀉下藥(1)潤下藥(2)峻水逐下藥(3)攻下藥

開竅藥

安神藥

平肝息風藥

理氣藥

理血藥(1)活血祛瘀藥(2)止血藥

消導藥

化痰止咳藥(1)溫化寒痰藥(2)清化熱痰藥(3)止咳平喘藥

收斂藥

驅蟲藥

其他藥(1)催吐劑(2)外科藥(3)強心藥

第三冊目錄

溫裏藥

蒼朮	6
丁香	10
八角茴香	14
肉桂	18
萹荳	22
高良薑	26
萹澄茄	30
黑胡椒	34
附子	38
草烏	42

瀉下藥

①潤下藥

黑芝麻	48
蜂蠟	52
火麻仁	56
番木瓜	60

②峻水瀉下藥

葶藶子	66
巴豆	70
商陸	74
馬藍	78
烏桕	82
大戟	86
芫花	90
甘遂	94
牽牛子	98

③攻下藥

大黃	104
----	-----

開竅藥

水菖蒲	110
石菖蒲	114
麝香	118

安神藥

靈芝	124
遠志	128
啤酒花	132
酸棗仁	136

平肝息風藥

天麻	142
----	-----

理氣藥

木香	148
沉香	152
長梗薤白	156
柿蒂	160
檀香	164
枳殼	168
甘松	172
降香	176
香附	180
佛手	184
白屈菜	188

理血藥


①活血祛瘀藥

紅花	194
----	-----

積雪草	198
鈴蘭	202
喜樹	206
虎杖	210
丹參	214
矮地茶	218
郁金	222
藏紅花	226
桃仁	230
胡桃仁	234
三稜	238
益母草	242
莪朮	246

②止血藥

白及	252
三七	256
地錦草	260
仙鶴草	264
棕板	268
大蓟	272
小蓟	276
委陵菜	280
艾葉	284
卷柏	288
地榆	292
茜草	296
側柏葉	300



溫裏藥




蒼朮

別名	赤朮，馬薊，青朮，仙朮。
基源	爲菊科植物蒼朮或北蒼朮等的根莖。
性味	辛苦，溫。
一般用量	1.5～3 錢。
主治·效能	健脾，燥濕，解鬱，闢穢。治濕盛困脾，倦怠嗜臥，脘痞腹脹，食慾不振，嘔吐，泄瀉，痢疾，瘧疾，痰飲，水腫，時氣感冒，風寒濕痹，足痿，夜盲。
採取·加工	春、秋均可採挖，以秋季爲好。挖取根莖後，除去殘莖、鬚根及泥土，曬乾。
藥用部份	根莖。

藥理作用

對血糖的影響：早年報告南蒼朮浸膏（相當生藥 6 克／公斤）可降低家兔血糖，未被證實。煎劑或醇浸劑 8 克／公斤口服或皮下注射，正常家兔的血糖略有上升的傾向。用煎劑 10 克／公斤灌胃，亦得到相同的結果；但同劑量灌注四氧嘧啶性糖尿病家兔，則血糖略升後即下降到灌藥前血糖水平以下，唯差別並不明顯。此後在每日灌藥的 10 天內，血糖不斷下降，差別顯著（自 401 降至 160 毫克％）。停藥後 4～17 天血糖未見升高到用藥前水平。

參考圖鑑





苍朮 *Atractylodes lancea* (Thunb.) DC.

【古籍記載】

(1)《醫學啓源》：“蒼朮，主治與白朮同，若除上濕發汗，功最大，若補中焦除濕，力少。《主治秘要》云：其用與白朮同，但比之白朮，氣重而體沉。及脛足濕腫，加白朮泔浸刮去皮用。”

(2)李杲：“《本草》但言朮，不分蒼、白，而蒼朮別有雄壯上行之氣，能除濕，下安太陰，使邪氣不傳入脾也。以其經泔浸火炒，故能出汗，與白朮止汗特異，用者不可以此代彼，蓋有止發之殊，其餘主治則同。”

(3)《仁齋直指方》：“脾精不禁，小便漏濁淋不止，腰背酸痛，宜用蒼朮以斂脾精，精生於谷故也。”

(4)朱震亨：“蒼朮治濕，上、中、下皆有可用。又能總解諸鬱，痰、火、濕、食、氣、血六鬱，皆因傳化失常，不得升降，病在中焦，故藥必兼升降，將欲升之，必先降之，將欲降之，必先升之，故蒼朮爲足陽明經藥，氣味辛烈，強胃健脾，發谷之氣，能徑入諸藥，疏泄陽明之濕，通行斂滯，香附乃陰中快氣之藥，下氣最速，一升一降，故鬱散而平。

(5)《綱目》：“張仲景關一切惡氣，用赤朮同猪蹄甲燒烟，陶隱居亦言朮能除惡氣，弭災疹，故今病疫及歲旦，人家往往燒蒼朮以闢邪氣。”

(6)《本草通玄》：“蒼朮，寬中發汗，其功勝於白朮，補中除濕，其力不及白朮。大抵卑監之土，宜與白朮以培之，敦阜之土，宜與蒼朮以平之。”

(7)《本草正》：“蒼朮，其性溫散，故能發汗寬中，調胃進食，去心腹脹疼，霍亂嘔吐，解諸鬱結，逐山嵐瘴疫，散風眩頭疼，消痰癖氣塊，水腫脹滿。其性燥濕，故治冷痢冷泄滑瀉，腸風，寒濕諸瘡。與黃蘗同煎，最逐下焦濕熱痿痹。然惟茅山者其質堅小，其味甘醇，補益功多，大勝他朮。”

【化學成份】

南蒼朮根莖含揮發油約5～9%。油的主要成分爲蒼朮醇(Atractylol)、茅朮醇(Hinesol)、β-桉葉醇(B-Eudesmol)等。

北蒼朮根莖含揮發油1.5%，其主要成分爲蒼朮醇、蒼朮酮(Atractylone)、茅朮醇及桉葉醇等。

東蒼朮根莖含揮發油1.5%，其主要成分蒼朮醇、茅朮醇、β-桉葉醇、蒼朮呋喃烴(Atractylodin, Atractylin)、蒼朮酮。

【臨床應用】

(1)治脾胃不和，不思飲食，心腹脅肋脹滿刺痛，口苦無味，嘔吐噁心，常多自利：蒼朮(去粗皮，米泔浸二日)五斤，厚朴(去粗皮，薑汁製，炒香)、陳皮(去白)各三斤二兩，甘草(炒)三十兩。上爲細末。每服二錢，以水一盞，入生薑二片，乾棗兩枚，同煎至七分，去薑、棗，帶熱服，空心食前；入鹽一捻，沸湯點服亦得。

(2)治太陰脾經受濕，水泄注下，體微重微滿，困弱無力，不欲飲食，暴泄無數，水谷不化，如痛甚者：蒼朮二兩，芍藥一兩，黃芩半兩。上銼，每服一兩，加淡味桂半錢，水一盞半，煎至一盞，溫服。

(3)治時暑暴瀉，壯脾溫胃，進美飲食，及療飲食所傷，胸膈痞悶：神曲（炒）、蒼朮（米泔浸一宿，焙乾）各等分爲末。麵糊爲丸，如梧桐子大。每服三十丸，不拘時，米飲吞下。

(4)治殭泄：蒼朮二兩，小椒一兩（去目，炒）。上爲極細末，醋糊爲丸，如桐子大。每服二十丸，或三十丸，食前溫水下。一法惡痢久不癒者加桂。

(5)治膈中停飲，已成癰囊：蒼朮一斤，去皮，切，末之，用生麻油半兩，水二盞，研濾取汁，大棗十五枚，爛者去皮、核，研，以麻汁勻研成稀膏，搜和，入白熟杵，丸梧子大，乾之。每日空腹用鹽湯吞下五十丸，增至一百丸、二百丸。忌桃李雀鴿。

(6)治脾經濕氣，少食，濕腫，四肢無力，傷食，酒色過度，勞逸有傷，骨熱：鮮白蒼朮二十斤，浸去粗皮，洗淨曬乾，銼碎，用米泔浸一宿，洗淨，用溪水一擔，大鍋入要，以慢火煎半乾去渣，再入石楠葉三斤，刷去紅衣，用楮實子一斤，川歸半斤，甘草四兩，切，研，同煎黃色，用麻布濾去渣，再煎如稀粥，方入好白蜜三斤，同煎成膏。每用好酒，空心食遠，調三、五錢服，不飲酒用米湯。有腫氣用白湯，嘔吐用薑湯。

(7)治濕溫多汗：知母六兩，甘草（炙）二兩，石膏一斤，蒼朮三兩，粳米三兩。上銼如麻豆大。每服五錢，水一盞半，煎至八、九分，去滓取六分清汁，溫服。

(8)治四時瘟疫，頭痛項強，發熱憎寒，身體疼痛，及傷風、鼻塞聲重、咳嗽頭昏：蒼朮（米泔浸一宿，切，焙）五兩，藁本（去土）、香白芷、細辛（去葉、土）、羌活（去蘆）、川芎、甘草（炙）各一兩。上爲細末。每服三錢，水一盞，生薑三片，葱白三寸，煎七分，溫服，不拘時。如覺傷風鼻塞，只用葱茶調下。

(9)治感冒：蒼朮一兩，細辛二錢，側柏葉三錢。共研細末，每日四次，每次一錢五分，開水沖服，葱白爲引，生吃。

(10)治濕氣身痛：蒼朮，泔浸切，水煎，取濃汁熬膏，白湯點服。

(11)治筋骨疼痛因濕熱者：黃柏（炒）、蒼朮（米泔浸炒）。上二味爲末，沸湯入薑汁調服。二物皆有雄壯之氣，表實氣實者，加酒少許佐之。

(12)補虛明目，健骨和血：蒼朮（泔浸）四兩，熟地黃（焙）二兩。爲末，酒糊丸梧子大。每溫酒下三、五十丸，日三服。

(13)治牙床風腫：大蒼朮，切作兩片，於中穴一孔，入鹽實之，濕紙裹，燒存性，取出研細，以此搽之，去風涎即癒，以鹽湯漱口。

(14)控制瘡疾證狀或作預防：蒼朮、白芷、川芎、桂枝各等分爲末，每用1克，以紗布四層包成長形，於瘡發前1～2小時塞鼻孔內，5小時或1天。

【禁忌】

陰虛內熱，氣虛多汗者忌服。



丁香

別名	丁子香，支解香、雄丁香，公丁香。
基源	爲桃金娘科植物丁香的花蕾。
性味	辛，溫。
一般用量	0.3～1 錢。
主治·效能	溫中，暖腎，降逆。治呃逆，嘔吐，反胃，瀉痢，心腹冷痛，痲痺疝氣，癰症。
採取·加工	通常在9月至次年3月間，花蕾由青轉爲鮮紅色時採收。採下後除去花梗，曬乾。
藥用部份	花蕾。

藥理作用

抗菌作用：含有1%濃度的丁香的乙醚浸出液，水浸液或含8%濃度的丁香煎劑的沙伯氏培養基，對許蘭氏黃癰菌、白色念珠菌等多種致病性真菌均有抑制作用。較高濃度時對新型隱球菌也有抑制作用。醇浸出液與醚浸出液相似，但水浸液較差。丁香油及丁香油酚在1:8000～1:16000時，對致病性真菌即有抑制作用。煎劑1:20～1:640濃度時，對葡萄球菌，鏈球菌及白喉、變形、綠膿、大腸、痢疾、傷寒等桿菌均有抑制作用，丁香油和丁香油酚在1:2000～1:8000濃度時，對金黃色葡萄球菌及肺炎、痢疾（志賀氏）、大腸、變形、結核等桿菌均有抑菌作用。丁香對流感病毒PR₈株也有抑制作用（體外試驗）。

參考圖鑑





【古籍記載】

(1)《本草經疏》：“丁香，其主溫脾胃、止霍亂壅脹者，蓋脾胃為食廩之官，飲食生冷，傷於脾胃，留而不去，則為壅塞脹滿，上涌下泄，則為揮霍撩亂，辛溫暖脾胃而行滯氣，則霍亂止而壅脹消矣。齒疳蠱者，亦陽明濕上攻也，散陽明之邪，則疳蠱自除。療風毒諸腫者，辛溫散結，而香氣又能走竅除穢濁也。”

(2)《本草通玄》：“丁香，溫中健胃，須於丸劑中同潤藥用乃佳。獨用多用，易於僭上，損肺傷目。”

(3)《本草新編》：“丁香，有雌雄之分，其實治病無分彼此。直中陰經之病，最宜用之，但不可用之於傳經之傷寒也。”

(4)《得配本草》：“丁香，得五味子治奔豚，配甘蔗、薑汁治乾嘔。肉桂溫能發表，丁香溫能和胃。”

【化學成份】

花蕾含揮發油即丁香油。油中主要含有丁香油酚 (Eugenol)、乙酰丁香油酚、 β -石竹烯 (β -Caryophyllene)，以及甲基正戊基酮、水楊酸甲酯、律草烯 (Humulene)、苯甲醛、 α -醇、間甲氧基苯甲醛、乙酸 α -酯、胡椒酚 (Chavicol)、 α -衣蘭烯 (α -Ylangene) 等。也有野生品種中不含丁香油酚 (平常丁香油中含 64~85%)，而含丁香酮 (Eugenone) 和番櫻桃素 (Eugenin)。花中還含三萜化合物如齊墩果酸 (Oleapolic acid)、黃酮和對氧萘酮類鼠李素 (Rhamnetin)、山柰酚 (Kaempferol)、番櫻桃素、番櫻桃素亭 (Eugenitin)、異番櫻桃素亭 (Isoeugenitin) 及基去甲基化合物異番櫻桃酚 (Isoeugenitol)。

【臨床應用】

(1)治傷寒咳噫不止，及噦逆不定：丁香一兩，乾柿蒂一兩。焙乾，搗羅為散。每服一錢，煎人參湯下，無時服。

(2)治小兒吐逆：丁香、半夏 (生用) 各一兩。同研為細末，薑汁和丸，如綠豆大。薑湯下三、二十丸。

(3)治朝食暮吐：丁香十五個研末，甘蔗汁、薑汁和丸蓮子大，噙咽之。

(4)治霍亂，止吐：丁香十四枚，以酒五合，煮取二合，頓服之。用水煮之亦佳。

(5)治久心痛不止：丁香半兩，桂心一兩。搗細，羅為散，每於食前，以熱酒調下一錢。

(6)治癰疽惡肉：丁香末敷之，外用膏藥護之。

(7)治食蟹致傷：丁香末，薑湯服五分。

(8)治鼻中瘰肉：丁香綿裹納之。

【治療體會】

(1)治癬：丁香 15 克，加入 70% 酒精至 100 毫升，浸 48 小時後去渣。每日外搽患處 3 次，觀察 31 例病史在 2 年以上的體癬及足癬患者，一般在治療 1 天後症狀即見消退，2 天後患處開始有皮屑脫落。病史較長或曾經其它癬藥治療而不能控制者，則於治療後 2~3 天症狀才開始消退，一般經 3~5 天亦能治癒。但有 20% 左右治癒後仍反復發作

。一法用1:10的丁香煎液外塗，每日1～3次，治療數種皮膚霉菌病共31例，結果8例臨床痊癒，10例顯效，8例有效，5例無效。有效病例通常在塗藥後3～7日癢感輕，炎症減退，落屑減少，以後局部症狀逐漸好轉。治療期中如中斷用藥，效果多不明顯或無效。療效與病原菌未見明顯關係。曾對6例治癒患者進行短期隨訪，1例於1個月後復發，5例經2～12月觀察未見復發。

(2)驅蟲作用：水或醇提取液在體外對猪蛔蟲有麻痺或殺死作用，感染蛔蟲的狗口服丁香油0.5～1.0克/公斤，有驅蟲作用，但一次服用並不能將蛔蟲全部驅除。丁香油較煎劑為優。

(3)健胃作用：丁香為芳香健胃劑，可緩解腹部氣脹、增強消化能力、減輕噁心嘔吐。5%丁香油酚乳劑可使胃黏液分泌顯著增加，而酸度則不增強；丁香油之作用稍差，連續應用，可使黏液耗竭，而僅分泌非黏液性的滲出物；36小時後方能部分恢復反應（分泌黏液），完全恢復，需數月以後。

(4)止牙痛：丁香油（少量滴入）可消毒齦齒腔，破壞其神經，從而減輕牙痛。

(5)其他作用：家兔靜脈注射丁香油酚，可產生麻醉，降低血壓、呼吸抑制與抗驚厥作用。但對小鼠皮下注射，不能產生麻醉作用。丁香還含有子宮收縮成分，易溶於水和乙醇，不易溶於醚、石油醚、氯仿、苯和醋酸。

【禁忌】

熱病及陰虛內熱者忌服。