

临床检验外语略语

广西医科大学教材

第一版 第一分册

临床检验外语略语

曾宛伊 阮绍玲 编

广西人民出版社

临床检验外语略语

曾定伊 阮绍玲 编



广西人民出版社出版

(南宁 衡阳路14号)

广西医药书店发行

广西民族印刷厂印刷

号

开本787×1092 1/32 1.15535印张 34千字

1984年7月第1版 1984年7月第1次印刷

印 数 1—11,000册

书号: 14113-47 定价: 0.12元

说 明

本书收集常用临床检验外语略语近一千条，内容包括血液、血清免疫学、尿液、粪便、血生化、肝功能、肾功能、肺功能、脑脊液、内分泌、理学检查、统一公制计量单位和其他等十三部分。每条略语按英文字母顺序排列，并注明外语全称和汉语词义；方括号内的表示正常值。除英语外，其他语种的略语在全称之后标明，外加圆括号。本书内

容均选自我国医药学统编教材、专业刊物和广西医学院临床资料。在编写时力求准确、实用、方便查阅。可供医务工作者和医护院校学生参考。

编 者

1984年5月

目 录

血液	(1)
血清免疫学	(18)
尿液	(40)
粪便	(47)
血生化	(48)
肝功能	(71)
肾功能	(77)

肺功能.....	(81)
脑脊液.....	(85)
内分泌.....	(87)
理学检查.....	(103)
统一公制计量单位.....	(127)
其他.....	(132)

血液

ABC absolute basophil count 绝对嗜碱性细胞
计数

AcCT(ACT) activating coagulation time 活化
凝血时间[50~90秒]

AHF antihemophilic factor 抗血友病因子

AHF-A antihemophilic factor A 抗血友病因
子A

AHF-B antihemophilic factor B 抗血友病因
子 B

ANC absolute neutrophil count 绝对嗜中性细
胞计数

APGL alkaline phosphatase activity of the
granular leukocyte 粒白细胞碱性磷酸
脂酶活动度

APTT activated partial thromboplastin time
致活部分凝血激酶时间

ATT aspirin tolerance time 阿司匹林耐量试
验, 阿司匹林耐量时间

B(BAS) basophil 嗜碱性粒细胞〔周围血片分类
0~1%，平均0.5%〕

B blood 血液

Bas(BAS) basophil 嗜碱性粒细胞〔周围血片
分类0~1%〕

BL B B lymphocyte B淋巴细胞

BLT(BT) blood type 血型

BLT blood-clot lysis time 血块溶解时间

〔正常人在24小时~48小时内不发生溶解〕

BT bleeding time 出血时间〔Duke 氏法1~3
分钟〕

CI color index 血色指数〔指数为1〕

CRT clot retraction time 血块收缩时间
〔收缩良好(24小时37℃)〕

CT coagulation time 凝血时间〔玻片法3~7分,
试管法4~12分〕

~ Coombs' test Coombs' 试验〔阴性〕

CTE circulation time estimation 循环时间
测定

CV corpuscular volume 红细胞容量

DC differential count (白细胞)分类计数 N嗜
中性粒细胞 (Neutrophil, N) 〔50~70%〕

E 嗜酸性粒细胞 (Eosinophil, E) [0.5~3%]

B 嗜碱性粒细胞 (Basophil, B) [0~1%]

L 淋巴细胞 (Lymphocyte, L) [25~35%]

M 单核细胞 (Monocyte, M) [3~8%]

DL Donath-Landsteiner test 当蓝二氏试验
(冷溶血试验) [阴性]

EC eosinophil count 嗜酸性粒细胞直接计数
[50~300/立方毫米]

ECLT euglobulin clot lysis time 优球蛋白凝
块溶解时间

ELT euglobulin lysis time 优球蛋白溶解时间

〔大于90~120分钟〕

Eos eosinophil 嗜酸性粒细胞 (同 EC)

ESR erythrocyte sedimentation rate 红细胞沉降率〔短管法：男0~8毫米/小时，女0~10毫米/一小时〕〔长管法：男0~15毫米/一小时，女0~20毫米/一小时〕

Fb(FG,FI) fibrinogen 纤维蛋白原〔0.2~0.4克/分升〕

FBE full blood examination 全血检查

FDP fibrinogen degradation product 纤维蛋白原降解产物 (定量)〔乳胶凝集法小于10

微克/毫升, 简易法1:16~1:64]

FreeHB Free Hemoglobin 游离血红蛋白 [小于
10毫克/分升(血浆)]

FSF fibrin stabilizing factor 纤维蛋白稳定因
子或称纤维蛋白酶

FT fragility test 红细胞脆性试验 [开始溶血
0.4~0.46% (NaCl 溶液中)] [完全溶血
0.3~0.36% (NaCl 溶液中)]

G/E granulocyte/erythroid ratio 粒细胞/红细
胞比率

Ham T Ham's test 酸化血清溶血试验 [阴性]

HAT hemagglutination inhibition test 血凝抑

制试验〔滴定度为1:64〕

Ha test hemadsorption test 红细胞吸附试验

Hb hemoglobin 血红蛋白〔沙利氏比色法：男
12~15克/分升，女10.5~13.5克/分升〕

Hct hematocrit 血细胞比容

Hg hemoglobin 血红蛋白

ICT indirect Coombs' test 间接 Coomb's 氏试
验

KPTT kaolin partial thromboplastin time 白
陶土部分凝血激酶时间〔男 31.5~43.5

秒, 女 32~43秒]

L lymphocyte 淋巴细胞 [周围血片分类占 25~35%, 儿童年龄越小, 占的%相对越高]

L-D Leishman-Donovan body 利-杜二氏体, 黑热病小体。

LE lupus erythematosus cells 红斑狼疮细胞

LEC lupus erythematosus cell 红斑狼疮细胞

LE test lupus erythematosus test 红斑狼疮试验

LMT leucocyte migration test 白细胞移动试验 [移动能力应大于76%]

- M monocyte 单核细胞[周围血片分类3~8%]
- MCC mean corpuscular-hemoglobin concentration 平均红细胞血红蛋白浓度
- MCD mean corpuscular diameter 红细胞平均直径[6.686~7.718微米, 平均为7.2微米]
- MCH mean corpuscular hemoglobin 红细胞平均血红蛋白量[27~31微微克]
- MCHC mean corpuscular hemoglobin concentration 红细胞平均血红蛋白浓度[32~36%]
- MCHg mean corpuscular hemoglobin 平均红