



绿喉蜂虎

体型较小，头顶及枕部铜色。



家燕

中等体型的辉蓝色及白色燕。



大红鹳

体型大且甚高的偏粉色水鸟。嘴形似靴，粉红而端黑，颈甚长，腿长。



# 中国鸟类图鉴

赵欣如 北京师范大学 副教授  
卓小利  
蔡益 编著



戴胜

体型中等且色彩鲜明的鸟。嘴长且下弯。

权威专家笔下  
中国最动人的自然之美



红尾鹑

体型略大的白色或偏粉色鹑。

斑头大翠鸟

中等体型且具艳蓝色及棕色的翠鸟。

山西出版传媒集团  
山西科学技术出版社





# 中国 鸟类图鉴

赵欣如 卓小利 蔡 益 编著

山西出版传媒集团  
山西科学技术出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

中国鸟类图鉴 / 赵欣如, 卓小利, 蔡益编著. —太原:  
山西科学技术出版社, 2015.2

ISBN 978-7-5377-4294-8

I. ①中… II. ①赵… ②卓… ③蔡… III. ①鸟类—中国—  
图集 IV. ① Q959.708-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 026145 号



## 中国鸟类图鉴

出版人: 张金柱

作者: 赵欣如 卓小利 蔡益

出版策划: 张金柱

责任编辑: 黄聪

文图编辑: 邵鹤丽

美术编辑: 张鹤飞

责任发行: 阎文凯

版式设计: 孙阳阳

封面设计: 垠子

出版发行: 山西出版传媒集团·山西科学技术出版社

地址: 太原市建设南路21号 邮编: 030012

编辑部电话: 0351-4922134 0351-4922061

发行电话: 0351-4922121

经销: 各地新华书店

印刷: 北京艺堂印刷有限公司

网址: [www.sxkxjscbs.com](http://www.sxkxjscbs.com)

微信: sxkjcbcs

开本: 710mm×1000mm 1/16 印张: 20

字数: 482千字

版次: 2015年4月第1版 2015年4月北京第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5377-4294-8

定价: 88.00元

本社常年法律顾问: 王葆柯

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

## 前言 >>



从神秘莫测的史前生物到飞翔的鸟类，从鱼到虫，从田间地头不起眼的野花野草到美丽炫目的观赏花卉，有阳光雨露的地方就有植被和动物的繁衍及发展，它们创造着自然规律的发展变化，不断地改变着自然生态，将一个异彩纷呈、丰富多彩的大自然呈现在我们面前。本套丛书多角度展现了中国美丽的生物大世界，也展现了中国人运用智慧，利用自然，保护自然以及对大自然的深厚情感。

“中国之美·自然生态图鉴”丛书，包括《中国昆虫图鉴》《中国鱼类图鉴》《中国野菜图鉴》《中国野花图鉴》《中国观赏花卉图鉴》《中国恐龙图鉴》《中国鸟类图鉴》《中国蝴蝶与蛾类图鉴》《中国田野作物图鉴》《中国古动物化石图鉴》，共计10本，是国内首部大型辞典型自然科普图鉴，呈现了中国生命科学的研究新成果，是很有价值的生物工具书。

本套丛书由资深植物学、昆虫学、鱼类学、恐龙专家亲自撰稿，娓娓道来，科学权威。对于专业生物学家来说，研究大自然是他们一生的追求。对于普通人来说，自然的秘密更多地和青春、情感、记忆联系在一起，是一种情怀，是年少时笼中蝈蝈的鸣叫，是追捕蝴蝶的童真，是天空中鸟儿掠过的身影，是稻谷成熟的喜悦，也是“子非鱼，焉知鱼之乐”的辩论和思考，是人情的味道。这些味道，已经在中国人辛勤劳动和积累经验的光华中与丰富的情感混在一起，形成了中国人的生活态度和文化意象，如对土地的眷恋，对故乡的思念等。

本套丛书邀请了国内著名的写实插画团队绘制生物图片，栩栩如生，呼之欲出，可以直接让你叫出它们的名字。科技绘画为人类拓展着对生物的认识和反映，那艺术视觉的张力、记述场景的再现、融合着水土木的生态环境——反映着融合的生命力。艺术家们唯物辩证地认识生物世界，更有利于人类改造自然环境和创造生命力的发展空间。



# 目录

• Contents •



- 2 潜鸟目**  
潜鸟科
- 2 红喉潜鸟 / 黑喉潜鸟 / 太平洋潜鸟
- 3 鸬鹚目**  
鸬鹚科
- 3 小鸬鹚 / 赤颈鸬鹚 / 凤头鸬鹚
- 4 角鸬鹚 / 黑颈鸬鹚
- 5 鸬形目**  
信天翁科
- 5 短尾信天翁 / 黑脚信天翁
- 6 黑背信天翁
- 鸬科
- 6 褐燕鸬
- 7 楔尾鸬 / 淡足鸬
- 8 暴风鸬 / 白额圆尾鸬 / 白额鸬
- 海燕科
- 9 白腰叉尾海燕 / 黑叉尾海燕
- 10 鹈形目**  
鹈科
- 10 红尾鹈 / 白尾鹈
- 鹈科
- 10 白鹈鹕
- 11 卷羽鹈鹕 / 斑嘴鹈鹕
- 鳀鸟科
- 12 蓝脸鳀鸟 / 红脚鳀鸟 / 褐鳀鸟
- 鸬科
- 13 黑颈鸬鹕 / 普通鸬鹕 / 斑头鸬鹕
- 14 红脸鸬鹕 / 海鸬鹕
- 军舰鸟科
- 15 黑腹军舰鸟 / 白斑军舰鸟 / 白腹军舰鸟
- 16 鹈形目**  
鸬科
- 16 白鹭 / 黄嘴白鹭 / 岩鸬
- 17 斑鸬 / 苍鸬 / 白腹鸬
- 18 草鸬 / 大白鸬 / 中白鸬
- 19 牛背鸬 / 池鸬 / 绿鸬
- 20 夜鸬 / 海南虎斑鸬 / 栗头虎斑鸬
- 21 黑冠鸬 / 小苇鸬 / 黄斑苇鸬
- 22 紫背苇鸬 / 栗苇鸬 / 黑苇鸬
- 23 大麻鸬
- 鸬科
- 23 彩鹈 / 黑鹈
- 24 白鹈 / 东方白鹈 / 秃鹈
- 鸬科
- 25 彩鹈 / 黑头白鹈 / 白肩黑鹈
- 26 朱鹈 / 白琵鸬 / 黑脸琵鸬
- 27 红鹈目**  
红鹈科
- 27 大红鹈
- 27 雁形目**  
鸭科
- 27 栗树鸭 / 白头硬尾鸭
- 28 疣鼻天鹅 / 大天鹅 / 小天鹅
- 29 鸿雁 / 豆雁 / 白额雁
- 30 小白额雁 / 灰雁 / 斑头雁
- 31 雪雁 / 加拿大雁 / 黑雁
- 32 赤麻鸭 / 翘鼻麻鸭 / 瘤鸭
- 33 鸳鸯 / 罗纹鸭 / 赤颈鸭
- 34 绿头鸭 / 斑嘴鸭 / 琵嘴鸭
- 35 针尾鸭 / 白眉鸭 / 花脸鸭
- 36 绿翅鸭 / 云石斑鸭 / 赤嘴潜鸭
- 37 帆背潜鸭 / 青头潜鸭 / 凤头潜鸭
- 38 小绒鸭 / 丑鸭 / 长尾鸭



- 39 黑海番鸭 / 鹞鸭  
40 红胸秋沙鸭 / 普通秋沙鸭

## 41 隼形目

### 鸢科

- 41 鸢

### 鹰科

- 41 褐冠鵟隼 / 黑冠鵟隼  
42 凤头蜂鹰 / 黑翅鸢 / 黑鸢  
43 栗鸢 / 白腹海雕 / 玉带海雕  
44 虎头海雕 / 渔雕 / 胡兀鹫  
45 高山兀鹫 / 兀鹫 / 秃鹫  
46 黑兀鹫 / 短趾雕 / 蛇雕  
47 白头鹞 / 白尾鹞 / 鹞鹞  
48 凤头鹰 / 褐耳鹰 / 赤腹鹰  
49 雀鹰 / 苍鹰 / 灰脸鵟鹰  
50 普通鵟 / 棕尾鵟 / 大鵟  
51 毛脚鵟 / 乌雕 / 草原雕  
52 白肩雕 / 金雕 / 白腹隼雕  
53 靴隼雕 / 鹰雕

### 隼科

- 53 红腿小隼  
54 黄瓜隼 / 红隼 / 红脚隼  
55 灰背隼 / 燕隼 / 猛隼  
56 猎隼 / 矛隼 / 游隼

## 57 鸡形目

### 松鸡科

- 57 镰翅鸡 / 岩雷鸟  
58 黑琴鸡 / 松鸡 / 黑嘴松鸡  
59 花尾榛鸡

### 雉科

- 59 雪鹑 / 藏雪鸡  
60 暗腹雪鸡 / 黄喉雉鹑 / 石鸡

- 61 中华鹌鹑 / 斑翅山鹑 / 高原山鹑

- 62 蓝胸鹑 / 红喉山鹌鹑 / 台湾山鹌鹑

- 63 白眉山鹌鹑 / 棕胸竹鸡 / 血雉

- 64 红腹角雉 / 黄腹角雉 / 勺鸡

- 65 棕尾虹雉 / 原鸡 / 黑鹇

- 66 白鹇 / 褐马鸡 / 白马鸡

- 67 蓝马鸡 / 白颈长尾雉 / 黑长尾雉

- 68 白冠长尾雉 / 红腹锦鸡

- 69 白腹锦鸡 / 绿孔雀

## 70 鹤形目

### 三趾鹑科

- 70 黄脚三趾鹑 / 棕三趾鹑

### 鹧鸪科

- 70 白鹧  
71 赤颈鹧 / 白枕鹧 / 蓑羽鹧  
72 黑颈鹧 / 丹顶鹧

### 秧鸡科

- 73 花田鸡 / 白喉斑秧鸡 / 普通秧鸡  
74 红脚苦恶鸟 / 白胸苦恶鸟 / 小田鸡  
75 红胸田鸡 / 白眉田鸡 / 董鸡  
76 黑水鸡

### 鸨科

- 76 小鸨  
77 大鸨 / 波斑鸨

## 78 雉形目

### 水雉科

- 78 水雉 / 铜翅水雉



### 彩鹌鹑科

- 78 彩鹌鹑

### 蛎鹑科

- 79 蛎鹑

### 鸨鹑科

- 79 鸨鹑

### 反嘴鹑科

- 79 黑翅长脚鹑

- 80 反嘴鹑

### 石鹑科

- 80 石鹑 / 大石鹑

### 燕鹑科

- 81 领燕鹑 / 普通燕鹑 / 灰燕鹑

### 鸽科

- 82 金鸽 / 灰鸽 / 剑鸽  
83 长嘴剑鸽 / 金眶鸽 / 环颈鸽  
84 铁嘴沙鸽 / 东方鸽 / 凤头麦鸡  
85 距翅麦鸡 / 灰头麦鸡 / 肉垂麦鸡

### 鹑科

- 86 丘鹑 / 孤沙雉 / 拉氏沙雉  
87 针尾沙雉 / 扇尾沙雉 / 斑尾腔鹑  
88 小杓鹑 / 中杓鹑 / 白腰杓鹑



- 89 大杓鹀 / 鹤鹀 / 红脚鹀
- 90 泽鹀 / 青脚鹀 / 小黄脚鹀
- 91 白腰草鹀 / 林鹀 / 翘嘴鹀
- 92 矶鹀 / 灰尾漂鹀 / 翻石鹀
- 93 半蹼鹀 / 大滨鹀 / 红腹滨鹀
- 94 三趾滨鹀 / 西滨鹀 / 红颈滨鹀
- 95 青脚滨鹀 / 斑胸滨鹀 / 尖尾滨鹀
- 96 黑腹滨鹀 / 弯嘴滨鹀 / 阔嘴鹀
- 97 流苏鹀 / 红颈瓣蹼鹀 / 勺嘴鹀
- 贼鹀科**
- 98 南极贼鹀 / 短尾贼鹀
- 99 长尾贼鹀
- 鹀科**
- 99 黑尾鹀 / 普通海鹀
- 100 灰翅鹀 / 灰背鹀 / 银鹀
- 101 黄腿银鹀 / 渔鹀
- 102 棕头鹀 / 红嘴鹀 / 细嘴鹀
- 103 黑嘴鹀 / 遗鹀 / 小鹀
- 104 楔尾鹀 / 叉尾鹀 / 三趾鹀
- 燕鹀科**
- 105 鸥嘴噪鹀 / 红嘴巨燕鹀 / 河燕鹀
- 106 小凤头燕鹀 / 大凤头燕鹀 / 黑枕燕鹀

- 107 普通燕鹀 / 白额燕鹀 / 黑腹燕鹀
- 108 褐翅燕鹀 / 乌燕鹀 / 灰翅浮鹀
- 109 白翅浮鹀 / 黑浮鹀 / 白顶玄燕鹀
- 110 白燕鹀

### 剪嘴鹀科

- 110 剪嘴鹀

### 海雀科

- 110 角嘴海雀

## 111 沙鸡目

### 沙鸡科

- 111 西藏毛腿沙鸡 / 毛腿沙鸡 / 黑腹沙鸡

## 112 鸽形目

### 鸠鸽科

- 112 原鸽 / 岩鸽 / 雪鸽
- 113 欧鸽 / 斑尾林鸽 / 斑林鸽
- 114 灰林鸽 / 紫林鸽 / 山斑鸠
- 115 棕斑鸠 / 珠颈斑鸠 / 火斑鸠
- 116 灰斑鸠 / 斑尾斑鸠 / 绿翅金鸠
- 117 橙胸绿鸠 / 灰头绿鸠 / 厚嘴绿鸠



- 118 黄脚绿鸠 / 针尾绿鸠 / 楔尾绿鸠
- 119 红翅绿鸠 / 绿皇鸠

## 120 鸚形目

### 鸚鵡科

- 120 小葵花凤头鸚鵡 / 红领绿鸚鵡
- 121 短尾鸚鵡 / 大紫胸鸚鵡 / 绯胸鸚鵡

## 122 鴉形目

### 杜鵑科

- 122 斑翅凤头鸚 / 红翅凤头鸚 / 大鹰鸚
- 123 普通鹰鸚 / 四声杜鹃 / 大杜鹃
- 124 栗斑杜鹃 / 八声杜鹃 / 翠金鸚
- 125 紫金鸚 / 乌鸚 / 噪鸚
- 126 绿嘴地鸚 / 褐翅鸦鸚 / 小鸦鸚

## 127 鴉形目

### 草鴉科

- 127 仓鴉 / 东方草鴉

### 鴉科

- 127 纵纹角鴉
- 128 西红角鴉 / 红角鴉 / 领角鴉
- 129 雕鴉 / 褐渔鴉 / 黄腿渔鴉
- 130 雪鴉 / 褐林鴉 / 灰林鴉
- 131 长尾林鴉 / 乌林鴉 / 猛鴉
- 132 花头鸛鴉 / 领鸛鴉 / 斑头鸛鴉
- 133 纵纹腹小鴉 / 鬼鴉 / 短耳鴉

- 134 长耳鸮 / 鹰鸮
- 135 夜鹰目**  
蛙口夜鹰科
- 135 黑顶蛙口夜鹰  
夜鹰科
- 135 普通夜鹰 / 欧夜鹰
- 136 雨燕目**  
雨燕科
- 136 白喉针尾雨燕 / 棕雨燕 / 普通雨燕
- 137 白腰雨燕 / 小白腰雨燕  
凤头雨燕科
- 137 凤头树燕
- 138 咬鹃目**  
咬鹃科
- 138 橙胸咬鹃 / 红头咬鹃
- 139 佛法僧目**  
翠鸟科
- 139 斑头大翠鸟 / 普通翠鸟 / 三趾翠鸟
- 140 鹳嘴翡翠 / 赤翡翠 / 白胸翡翠
- 141 蓝翡翠 / 白领翡翠 / 冠鱼狗
- 142 斑鱼狗  
蜂虎科
- 142 绿喉蜂虎
- 143 蓝喉蜂虎 / 栗喉蜂虎 / 黄喉蜂虎
- 144 栗头蜂虎  
佛法僧科
- 144 蓝胸佛法僧
- 145 棕胸佛法僧 / 三宝鸟
- 146 戴胜目**  
戴胜科
- 146 戴胜
- 146 犀鸟目**  
犀鸟科
- 146 冠斑犀鸟 / 双角犀鸟
- 147 棕颈犀鸟 / 花冠皱盔犀鸟
- 148 鹭形目**  
拟鹭科
- 148 大拟啄木鸟 / 绿拟啄木鸟 / 黄纹拟啄木鸟
- 149 金喉拟啄木鸟 / 黑眉拟啄木鸟 / 蓝喉拟啄木鸟
- 150 赤胸拟啄木鸟  
响蜜鸫科
- 150 黄腰响蜜鸫  
啄木鸟科
- 150 蚁鸫
- 151 斑姬啄木鸟 / 白眉棕啄木鸟 / 星头啄木鸟
- 152 小星头啄木鸟 / 小斑啄木鸟 / 纹腹啄木鸟
- 153 纹胸啄木鸟 / 棕腹啄木鸟 / 赤胸啄木鸟
- 154 黄颈啄木鸟 / 白背啄木鸟 / 大斑啄木鸟
- 155 白翅啄木鸟 / 栗啄木鸟 / 白腹黑啄木鸟
- 156 黑啄木鸟 / 黄冠啄木鸟
- 157 花腹绿啄木鸟 / 鳞腹绿啄木鸟 / 灰头绿啄木鸟
- 158 金背啄木鸟 / 大金背啄木鸟 / 竹啄木鸟
- 159 黄嘴栗啄木鸟 / 大灰啄木鸟
- 160 雀形目**  
阔嘴鸟科
- 160 银胸丝冠鸟 / 长尾阔嘴鸟  
八色鸫科
- 160 双辫八色鸫
- 161 蓝背八色鸫 / 栗头八色鸫 / 蓝八色鸫
- 162 绿胸八色鸫 / 仙八色鸫 / 蓝翅八色鸫  
百灵科
- 163 歌百灵 / 长嘴百灵 / 蒙古百灵
- 164 黑百灵 / 细嘴短趾百灵 / 短趾百灵
- 165 凤头百灵 / 云雀 / 角百灵  
燕科
- 166 崖沙燕 / 岩燕 / 家燕
- 167 洋燕 / 金腰燕 / 毛脚燕





- 鹡鹑科**
- 168 山鹡鹑 / 白鹡鹑 / 黄头鹡鹑
- 169 灰鹡鹑 / 田鹡 / 树鹡
- 170 草地鹡 / 红喉鹡 / 粉红胸鹡
- 171 水鹡 / 黄腹鹡 / 山鹡
- 山椒鸟科**
- 172 暗灰鹡 / 粉红山椒鸟 / 长尾山椒鸟
- 173 褐背鹡
- 鸭科**
- 173 凤头雀嘴鸭 / 领雀嘴鸭
- 174 纵纹绿鸭 / 黑头鸭 / 红耳鸭
- 175 黄臀鸭 / 白头鸭 / 白颊鸭
- 176 黑喉红臀鸭 / 白喉红臀鸭 / 纹喉鸭
- 177 黄绿鸭 / 栗耳短脚鸭
- 178 灰短脚鸭 / 绿翅短脚鸭 / 黑短脚鸭
- 雀鸭科**
- 179 黑翅雀鸭
- 叶鸭科**
- 179 蓝翅叶鸭
- 180 金额叶鸭 / 橙腹叶鸭
- 和平鸟科**
- 180 和平鸟
- 太平鸟科**
- 181 太平鸟 / 小太平鸟
- 伯劳科**
- 181 虎纹伯劳
- 182 牛头伯劳 / 红背伯劳 / 红尾伯劳
- 183 栗背伯劳 / 黑额伯劳 / 楔尾伯劳
- 燕鹟科**
- 184 钩嘴林鹟
- 黄鹟科**
- 184 金黄鹟 / 黑枕黄鹟
- 185 黑头黄鹟 / 朱鹟
- 卷尾科**
- 185 黑卷尾
- 186 灰卷尾 / 古铜色卷尾 / 小盘尾
- 187 发冠卷尾 / 大盘尾
- 椋鸟科**
- 187 灰头椋鸟
- 188 黑冠椋鸟 / 丝光椋鸟 / 北椋鸟
- 189 粉红椋鸟 / 紫翅椋鸟 / 灰椋鸟
- 190 斑椋鸟 / 黑领椋鸟 / 红椋鸟
- 191 家八哥 / 白领八哥 / 八哥
- 192 鹩哥
- 燕鹟科**
- 192 灰燕鹟
- 鸫科**
- 193 松鸫 / 北噪鸫 / 黑头噪鸫
- 194 台湾蓝鸫 / 红嘴蓝鸫 / 蓝绿鸫
- 195 灰喜鸫 / 灰树鸫
- 196 喜鸫 / 黑尾地鸫 / 星鸫
- 197 红嘴山鸫 / 寒鸫 / 达乌里寒鸫
- 198 秃鼻乌鸫 / 大嘴乌鸫 / 白颈鸫
- 199 渡鸫
- 河鸟科**
- 199 河乌 / 褐河乌
- 鹟科**
- 200 鹟
- 岩鹟科**
- 200 领岩鹟 / 高原岩鹟
- 201 鹟岩鹟 / 棕胸岩鹟 / 棕眉山岩鹟
- 202 褐岩鹟 / 黑喉岩鹟
- 203 栗背岩鹟
- 鹟科**
- 203 蓝短翅鹟
- 204 欧亚鹟 / 日本歌鹟 / 琉球歌鹟
- 205 红尾歌鹟 / 红喉歌鹟 / 黑胸歌鹟
- 206 蓝喉歌鹟 / 黑喉歌鹟 / 金胸歌鹟
- 207 蓝歌鹟 / 红肋蓝尾鹟 / 金色林鹟
- 208 白眉林鹟 / 鹟 / 白腰鹟
- 209 红背红尾鹟 / 蓝头红尾鹟 / 欧亚红尾鹟
- 210 白喉红尾鹟 / 北红尾鹟 / 蓝额红尾鹟
- 211 白顶溪鹟 / 白腹短翅鹟 / 白尾地鹟
- 212 蓝大翅鹟 / 小燕尾 / 黑背燕尾
- 213 灰背燕尾 / 斑背燕尾 / 绿宽嘴鹟





- 214 黑喉石鹀 / 灰林鹀  
 215 穗鹀 / 白顶鹀 / 漠鹀  
 216 白背矶鹀 / 白喉矶鹀 / 栗腹矶鹀  
 217 蓝矶鹀 / 紫啸鹀 / 橙头地鹀  
 218 白眉地鹀 / 长尾地鹀 / 灰背鹀  
 219 黑胸鹀 / 白颈鹀 / 灰翅鹀  
 220 乌鹀 / 白头鹀 / 灰头鹀  
 221 白眉鹀 / 榭鹀 / 赤颈鹀  
 222 斑鹀 / 田鹀 / 白眉歌鹀  
 223 欧歌鹀 / 宝兴歌鹀

#### 鹀科

- 223 白喉林鹀  
 224 斑鹀 / 灰纹鹀 / 褐胸鹀  
 225 棕尾褐鹀 / 白眉姬鹀 / 鹁姬鹀  
 226 锈胸蓝姬鹀 / 橙胸姬鹀 / 红喉姬鹀  
 227 棕胸蓝姬鹀 / 小斑姬鹀 / 灰蓝姬鹀  
 228 白腹蓝姬鹀 / 铜蓝鹀 / 大仙鹀  
 229 小仙鹀 / 棕腹大仙鹀 / 海南蓝仙鹀  
 230 纯蓝仙鹀 / 蓝喉仙鹀

#### 扇尾鹀科

- 231 黄腹扇尾鹀 / 白喉扇尾鹀

#### 王鹀科

- 231 黑枕王鹀  
 232 紫寿带 / 寿带

#### 画眉科

- 232 黑脸噪鹛  
 233 白喉噪鹛 / 黑领噪鹛 / 条纹噪鹛  
 234 白颈噪鹛 / 栗颈噪鹛 / 黑喉噪鹛  
 235 山噪鹛 / 灰翅噪鹛 / 棕颈噪鹛  
 236 白点噪鹛 / 大噪鹛 / 眼纹噪鹛  
 237 灰胁噪鹛 / 棕噪鹛 / 画眉  
 238 白颊噪鹛 / 细纹噪鹛 / 纯色噪鹛  
 239 橙翅噪鹛 / 灰腹噪鹛 / 黑顶噪鹛  
 240 台湾噪鹛 / 红翅噪鹛 / 红尾噪鹛

- 241 红翅薮鹛 / 黄痣薮鹛 / 棕头幽鹛  
 242 长嘴钩嘴鹛 / 斑胸钩嘴鹛 / 棕颈钩嘴鹛  
 243 棕头钩嘴鹛 / 红嘴钩嘴鹛 / 短尾鹪鹩  
 244 鳞胸鹪鹩 / 短尾鹪鹩 / 红头穗鹛  
 245 金头穗鹛 / 纹胸鹛 / 红顶鹛  
 246 金眼鹪雀 / 矛纹草鹛 / 大草鹛  
 247 银耳相思鸟 / 红嘴相思鸟 / 斑肋姬鹛  
 248 红翅鹪鹩 / 淡绿鹪鹩

- 249 栗额斑翅鹛 / 白眶斑翅鹛 / 台湾斑翅鹛  
 250 蓝翅希鹛 / 斑喉希鹛 / 红尾希鹛  
 251 金胸雀鹛 / 栗头雀鹛 / 白眉雀鹛  
 252 棕头雀鹛 / 褐头雀鹛 / 褐顶雀鹛  
 253 褐肋雀鹛 / 灰眶雀鹛 / 黑顶奇鹛  
 254 灰奇鹛 / 黑头奇鹛 / 白耳奇鹛  
 255 丽色奇鹛 / 长尾奇鹛 / 栗耳凤鹛  
 256 黄颈凤鹛 / 纹喉凤鹛 / 白领凤鹛  
 257 棕臀凤鹛 / 黑颈凤鹛 / 白腹凤鹛  
 258 火尾绿鹛

#### 鸦雀科

- 258 文须雀 / 三趾鸦雀  
 259 灰头鸦雀 / 点胸鸦雀 / 白眶鸦雀  
 260 棕头鸦雀 / 灰喉鸦雀 / 暗色鸦雀  
 261 黄额鸦雀 / 金色鸦雀 / 短尾鸦雀  
 262 震旦鸦雀

#### 扇尾莺科

- 262 棕扇尾莺 / 山鹛  
 263 黑喉山鹪莺 / 灰胸山鹪莺 / 黄腹山鹪莺  
 264 纯色山鹪莺

#### 莺科

- 264 栗头地莺 / 鳞头树莺

265 远东树莺 / 异色树莺 / 黄腹树莺

266 斑胸短翅莺 / 矛斑蝗莺 / 黑斑蝗莺

267 北蝗莺 / 苍眉蝗莺 / 蒲苇莺

268 黑眉苇莺 / 东方大苇莺 / 厚嘴苇莺

269 靴篱莺 / 草绿篱莺 / 栗头缝叶莺

270 长尾缝叶莺 / 黑喉缝叶莺 / 褐柳莺

271 黄腹柳莺 / 巨嘴柳莺 / 橙斑翅柳莺

272 灰喉柳莺 / 黄腰柳莺 / 黄眉柳莺

273 冕柳莺 / 海南柳莺 / 黑眉柳莺

274 金眶鹟莺 / 栗头鹟莺 / 棕脸鹟莺

275 黄腹鹟莺 / 沼泽大尾莺

#### 绣眼鸟科

276 红肋绣眼鸟 / 灰腹绣眼鸟

277 暗绿绣眼鸟

#### 攀雀科

277 白冠攀雀 / 中华攀雀

278 火冠雀

#### 长尾山雀科

278 银喉长尾山雀 / 红头长尾山雀

279 黑眉长尾山雀 / 银脸长尾山雀

#### 山雀科

279 沼泽山雀



280 褐头山雀 / 白眉山雀 / 红腹山雀

281 黑冠山雀 / 煤山雀 / 黄腹山雀

282 褐冠山雀 / 大山雀 / 西域山雀

283 绿背山雀 / 黄颊山雀 / 台湾黄山雀

284 灰蓝山雀 / 杂色山雀 / 黄眉林雀

285 冕雀

#### 鹀科

285 普通鹀 / 栗臀鹀

286 白尾鹀 / 黑头鹀 / 绒额鹀

#### 旋壁雀科

287 红翅旋壁雀

#### 旋木雀科

287 欧亚旋木雀 / 高山旋木雀

#### 啄花鸟科

288 黄臀啄花鸟 / 红胸啄花鸟 / 朱背啄花鸟

#### 花蜜鸟科

289 紫颊太阳鸟 / 黄腹花蜜鸟 / 紫花蜜鸟

290 蓝喉太阳鸟 / 绿喉太阳鸟 / 叉尾太阳鸟

291 黑胸太阳鸟 / 黄腰太阳鸟 / 火尾太阳鸟

292 长嘴捕蛛鸟 / 纹背捕蛛鸟

#### 雀科

292 家麻雀

293 黑胸麻雀 / 山麻雀 / 树麻雀

294 白腰雪雀 / 棕颈雪雀

#### 织雀科

294 纹胸织布鸟

295 黄胸织布鸟

#### 梅花雀科

295 红梅花雀 / 斑文鸟

296 栗腹文鸟 / 禾雀 / 白腰文鸟

#### 燕雀科

297 燕雀 / 金额丝雀 / 高山岭雀

298 粉红腹岭雀 / 松雀 / 红眉松雀

299 赤朱雀 / 普通朱雀 / 酒红朱雀

300 北朱雀 / 藏雀 / 白翅交嘴雀

301 高山金翅雀 / 黄雀 / 白腰朱顶雀

302 灰头灰雀 / 锡嘴雀 / 黑尾蜡嘴雀

303 黄颈拟蜡嘴雀 / 金枕黑雀 / 血雀

304 内容索引







## 红喉潜鸟

• **科属：**潜鸟目，潜鸟科。


• **外观特征：**体型最小（61cm）的潜鸟。夏季成鸟的头顶、脸、喉及颈侧灰色，特征为一栗色带白喉中心伸至颈前成三角形，颈背多具纵纹。上体其余部位黑褐无白色斑纹，下体白。冬季成鸟的颈、颈侧及脸白色，上体近黑而具白色纵纹，游水时嘴略上扬，与黑喉潜鸟的区别为振翼较快且较高。虹膜红色或栗色；嘴黑色或淡灰色；脚绿黑色，跗跖后面和趾上缀有白色或黄色。

• **声音：**飞行时发出似雁叫的gwuk-gwuk-gwuk声。

• **野外分布：**近北极区，冬季南下至北纬30°左右。

• **现存状况：**种群数量稀少。在中国东北部黑龙江，下至东部沿海经旅顺、北戴河至广东、海南岛及台湾北部有过境记录。

• **习性：**繁殖于淡水区域，越冬在沿海水域，有时成群活动。



Red-throated Diver

*Gavia stellata*

## 黑喉潜鸟

• **科属：**潜鸟目，潜鸟科。

• **外形特征：**体型略大（68cm）的潜鸟。繁殖期头灰色，喉及前颈闪辉墨绿色，上体黑色，具白色方形横纹，颈侧及胸部具黑白色细纵纹。非繁殖期下体白色上延及颈侧、颈及脸下部，两胁白色斑块明显。虹膜红色；嘴冬季灰色，尖端和嘴峰黑色，夏季黑色；脚黑色。

• **声音：**重复似打鼾的呱呱声及似鸥叫的aah-oww声。

• **野外分布：**繁殖于北半球，从苏格兰北部至西伯利亚。冬季南迁至北纬30°左右的新疆北部。

• **现存状况：**亚种*viridigularis*为罕见候鸟，见于辽宁半岛，在福州有一次记录。易与太平洋潜鸟混淆。

• **习性：**单独在淡水水域繁殖，冬季常成散群在沿海越冬。

注：太平洋潜鸟有时作为此种的一个亚种处理（参见Harrison, 1983）。



Black-throated Loon

*Gavia arctica*

## 太平洋潜鸟

• **科属：**潜鸟目，潜鸟科。


• **外形特征：**体型略大（66cm）的潜鸟。比黑喉潜鸟略小，所有体羽均相似。繁殖羽区别在喉具闪辉紫色而非绿色斑块，颈背白色较多。与黑喉潜鸟较难区别，不同处仅在于喉块为闪辉紫色而非闪辉绿色。虹膜栗褐色，嘴灰色至黑色，脚黑色。

• **声音：**通常无声。

• **野外分布：**繁殖于西伯利亚东部至阿拉斯加及加拿大；越冬于日本沿海及北美洲西部，南至北纬23°。

• **现存状况：**种群数量稀少。有记录经过辽东半岛，可能也经过北戴河及山东。香港可能有过记录。

• **习性：**同黑喉潜鸟。



Pacific Diver

*Gavia pacifica*

小鸕鷀

• **科属：** 鸕鷀目，鸕鷀科。

• **外形特征：** 体型较小（27cm）而矮扁。繁殖羽：喉及前颈红栗色，头顶及颈背深灰褐，上体呈黑褐色，下体偏灰，具明显黄色嘴斑。非繁殖羽：上体灰褐，下体白。虹膜黄色；嘴黑色；脚石板灰，趾尖浅色。

- **声音：** 重复的高音吱叫声ke-ke-ke-ke，求偶追逐时常发。
- **野外分布：** 非洲、欧亚大陆、印度、中国、日本、东南亚及新几内亚北部。
- **现存状况：** 留鸟及部分候鸟，分布于中国各地包括台湾及海南岛。亚种*capensis*为留鸟，见于中国西北部，海拔可达2000m。
- **习性：** 喜在清水及有丰富水生生物的湖泊、沼泽及涨过水的稻田单独或成分散小群活动。




赤颈鸕鷀

• **科属：** 鸕鷀目，鸕鷀科。

• **外形特征：** 体型较小（45cm）的鸕鷀。嘴较短而粗，体形短且圆。各型体羽嘴基部均具特征性黄色斑块，尖端呈黑色，略具羽冠。繁殖期鸟顶冠呈黑色，颈栗色，脸颊灰白为识别特征。非繁殖期鸟脸颊及前颈灰色多，嘴形及色彩也不同。虹膜黑褐色；嘴偏黑，基部黄色；脚橄榄黑色，内侧微缀有一点黄绿色。

- **声音：** 繁殖期有声，营巢时发出uoooh-uoooh的号叫声。
- **野外分布：** 全北界、斯堪的那维亚至西伯利亚，越冬于伊朗及北非。北美洲及东北亚的鸟越冬在中国、日本及美国南部。
- **现存状况：** 在中国繁殖于东北的湿地；迁徙经东北，在河北、福建及广东有越冬记录。
- **习性：** 善游泳和潜水，潜水时常冒出水面。



凤头鸕鷀

• **科属：** 鸕鷀目，鸕鷀科。

• **外形特征：** 体型较大（50cm）且外形优雅的鸕鷀。颈修长，具显著的深色羽冠，下体近白，上体纯灰褐。繁殖期成鸟颈背栗色，颈具鬃毛状饰羽。与赤颈鸕鷀的区别在于脸侧白色延伸过眼，嘴形长。虹膜近红；嘴黑褐色（冬季红色），基部红色，尖端苍白色；脚近黑，内侧为黄绿色，外侧橄榄绿色。

- **声音：** 成鸟叫声深沉而洪亮，雏鸟乞食时发出ping-ping声。
- **野外分布：** 古北界、非洲及印度、澳大利亚、新西兰。中国除海南外，见于各省。
- **现存状况：** 指名亚种为地区性常见鸟，广布于较大的湖泊。
- **习性：** 繁殖期成对作精湛的求偶炫耀，两相对视，身体高高挺起并同时点头，有时嘴上还衔着植物。巢为浮巢，漂浮在水面。





## 角鸬鹚

• **科属：** 鸬鹚目，鸬鹚科。

• **外形特征：** 中等体型（33cm）且体态紧实、略具冠羽的鸬鹚。夏季清晰的橙黄色过眼纹及冠羽与黑色头成对比并延伸过颈背，前颈及两胁深栗色，其余下体白色，上体多黑色。冬季鸟比黑颈鸬鹚脸上多白色，嘴不上翘，头显略大而平。偏白色的嘴尖有别于所有其他鸬鹚，但似体型较小的小鸬鹚。虹膜红色，眼圈白；嘴黑色，嘴端偏黄白色；脚黑蓝或灰色。

• **声音：** 繁殖期发声，发出与小鸬鹚相似但鼻音较重的颤音二重唱；有时也发出粗哑而多喉音的叫声。

• **野外分布：** 繁殖于整个北方温带的淡水区域，冬季分散在北纬30°以南，包括沿海水域。中国主要见于黑龙江、辽宁、河北、山东、新疆、浙江、福建、香港及台湾。

• **现存状况：** 种群数量极为稀少。通常繁殖于天山西部，有记录迁徙时见于中国东北；越冬在中国东南部及长江下游；香港有一次记录。

• **习性：** 迁徙季节和冬季结小群活动。



Horned Grebe

*Podiceps auritus*

## 黑颈鸬鹚

• **科属：** 鸬鹚目，鸬鹚科。

• **外形特征：** 中等体型（30cm）的鸬鹚。繁殖期成鸟具松软的黄色耳簇，且耳簇延伸至耳羽后，前颈黑色，嘴较角鸬鹚上扬。非繁殖期鸟与角鸬鹚的区别在于嘴深色，且深色的顶冠延伸至眼下；颈部白色延伸至脑后，呈月牙形。幼鸟似冬季成鸟，但褐色较重，眼圈白色，胸部具深色带。虹膜红色；嘴黑色，微向上翘；脚外侧黑色，内侧灰绿色。

• **声音：** 繁殖期发出哀怨的poo-eeet及尖厉颤音。

• **野外分布：** 北美洲西部、欧亚大陆至蒙古西部、非洲、南美洲及中国东北，分布不连贯。冬季分散至北纬30°以南地区。中国除西藏、海南外，见于各省。

• **现存状况：** 指名亚种为罕见繁殖鸟及冬候鸟。繁殖于天山西部、内蒙古及中国东北；有记录迁徙时见于中国多数地区，越冬于华南和东南沿海及中国西南的河流。在香港为迷鸟。

• **习性：** 成群在湖泊与水塘上繁殖。冬季结群于湖泊及沿海。



Black-necked Grebe

*Podiceps nigricollis*



短尾  
信天翁

• **科属：**鸕形目，信天翁科。

• **外形特征：**成鸟体型较大，体长可达90cm，展翼可达216cm，背白色，头和颈缀有黄色，飞行时脚伸出黑色尾后。体羽从幼鸟的深褐色渐变至亚成鸟的浅色，并具翼上白斑及背部鳞状斑纹。成鸟为太平洋上唯一的体白色信天翁，其颈背略带黄色。幼鸟及亚成鸟嘴浅粉色，脚偏蓝，嘴基无白色。虹膜暗褐色；嘴黄色，嘴端偏蓝；脚蓝灰色，蹼黑色。

• **声音：**于海上通常无声。

• **野外分布：**北太平洋，现已罕见。中国见于山东和台湾。

• **现存状况：**种群数量稀少。繁殖在台湾北部钓鱼岛及赤尾屿。有记录迁徙时见于山东，在东部沿海有记录。

• **习性：**结群繁殖。善飞行，除繁殖期外常在海上飞翔，偶尔跟随船只。



Short-tailed Albatross

*Diomedea albatrus*

黑脚  
信天翁

• **科属：**鸕形目，信天翁科。


• **外形特征：**中等体型（81cm）且体羽多深褐色，仅嘴基、尾基部及尾下覆羽具狭窄白色。有些老年成鸟头及胸部褪成近白色。幼鸟似成鸟，但尾及尾下覆羽无白色。与短尾信天翁幼鸟的区别在于嘴及脚深色。虹膜褐黑色，嘴黑褐色，脚黑色。

• **声音：**在海上无声。

• **野外分布：**北太平洋。中国一般见于浙江、福建、海南及台湾等沿海地区。

• **现存状况：**种群数量稀少。常年见于台湾海峡。春季及冬季见于中国南海。

• **习性：**结群繁殖，栖息于开阔海洋中的小岛和附近海域。非繁殖期飞翔于海上，跟随船只找食废弃物。



Black-footed Albatross

*Diomedea nigripes*





黑背  
信天翁

• **科属：**鸕形目，信天翁科。

• **外形特征：**中等体型（80cm），通体呈黑白色。其显著特征为自颈至臀部为全白色，翼上及背为深色。翼下主要为白色，具深色边缘，覆羽具近黑色纵纹；眼及眼周深色。飞行时脚略伸出尾后。幼鸟似成鸟，但嘴灰色较重。虹膜深褐；嘴黄色，嘴端深色；脚粉灰。

• **声音：**于海上通常无声。

• **野外分布：**太平洋北部。繁殖于日本南部的小岛和夏威夷，分布于北纬30°~55°。中国见于福建、台湾。

• **现存状况：**冬候鸟，每年定期至日本南部海域。在中国尚无记录。

• **习性：**结群繁殖，常跟随船只找食废弃物。



Laysan Albatross

*Phoebastria immutabilis*

褐燕鸕

• **科属：**鸕形目，鸕科。

• **外形特征：**体型较小（28cm），下体呈浅褐色，翼上覆羽具浅色横纹。与黑叉尾海燕的区别在于体型较大，尾长楔形（飞行时显得长而尖），容易区别。虹膜褐色，鼻管蓝色；嘴黑色，嘴角粉红色，缀有蓝色；脚偏棕色，具黑色蹼。

• **声音：**在繁殖期发出chuff的低吠声。

• **野外分布：**繁殖于大西洋及太平洋岛屿，包括中国南海。中国常见于云南、浙江、福建、广东、海南、台湾。

• **现存状况：**数量稀少，较罕见。中国主要繁殖于福建海上岛屿，在台湾及南海、广东、香港海上均有记录。

• **习性：**飞行时强劲有力，常慌乱振羽往下猛扑或高高在上作环形盘旋。



Bulwer's Petrel

*Bulweria bulwerii*