



实用中药性状鉴别 入门

李喜香 刘效栓 主编



中医古籍出版社

publishing house of ancient chinese medical books

实用中药性状鉴别入门

主 编 李喜香 刘效栓

副主编 张晓明 姜玲艳

张承军 黄清杰

中医古籍出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

实用中药性状鉴别入门/李喜香主编. —北京: 中医古籍出版社, 2015. 2
ISBN 978-7-5152-0561-8

I. ①实… II. ①李… III. ①饮片-中药鉴定学-基本知识
IV. ①R282.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 006762 号

实用中药性状鉴别入门

李喜香 刘效栓 主编

责任编辑 郑蓉

封面设计 韩博玥

出版发行 中医古籍出版社

社 址 北京东直门内南小街 16 号 (100700)

印 刷 三河市华东印刷有限公司

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 19.625

字 数 370 千字

版 次 2015 年 2 月第 1 版 2015 年 2 月第 1 次印刷

印 数 0001 ~ 2000 册

书 号 ISBN 978-7-5152-0561-8

定 价 38.00 元

前 言

中药是我国传统中医药文化的重要组成部分，药材的真伪优劣与临床疗效关系密切，李时珍曰：“一物有谬，便性命及之。”笔者在多年中药实践工作中发现，目前中药饮片市场鱼龙混杂，真假难辨，对于初入中药行业的人员来说，掌握中药传统性状鉴别面临较大困难，特别是刚毕业的中药专业学生。因为大专院校所学《中药学》《中药鉴定学》《中药炮制学》等专业知识与目前中药应用现状存在差异。近年来，在中药从业人员的培训中发现，目前中药专业教材内容比较分散，在工作节奏较快的今天，不便从业人员快速掌握实践所需知识。为了方便从业人员快速掌握中药性状鉴别，笔者结合工作实践，组织编写了《实用中药性状鉴别入门》一书，旨在帮助从业人员在较短时间内能掌握常用中药性状鉴别，熟悉中药及炮制品的鉴别要点及应用，为今后工作打下坚实基础。

本书以《中华人民共和国药典》（2010版）为基础，结合地方用药特点，参考相关资料，对目前临床常用的286味中药及其炮制品，按药用部位分为根及根茎类、茎木类、皮类、叶类、花类、果实种子类、全草类、藻菌类、树脂类、动物类、矿物类、其他类共计12类。每个品种基本上从来源、产地分布、采收季节、规格与加工炮制、性状、外观质量评价、性味归经、功能主治、地方习用品、易混品及伪品等10个方面进行全面系统的阐述，以突出其实用性、可读性、学术性、翔实性和特色性。

由于时间仓促，加之作者水平有限，故难免在编撰过程中有所纰漏，敬请披阅者赐教斧正！

编者

2014年7月26日

第一章 根及根茎类	1
巴戟天	1
白附子	2
白及	3
白前	4
白芍	5
白术	6
白头翁	7
白薇	9
白芷	9
百部	10
板蓝根	11
半夏	12
北豆根	14
北沙参	15
苍术	16
草乌	17
柴胡	18
赤芍	20
川贝母	21
川木香	24
川牛膝	25
川乌	26
川芎	27
大黄	28
丹参	30
当归	31
独活	33

党参	34
地黄	37
地榆	38
莪术	39
防风	40
防己	42
粉萆薢	43
粉葛	44
附子	45
干姜	46
甘草	47
甘遂	49
高良姜	49
藁本	50
葛根	51
狗脊	52
骨碎补	53
何首乌	54
胡黄连	56
虎杖	57
黄精	57
黄连	59
黄芪	60
黄芩	62
姜黄	64
桔梗	64
苦参	66
龙胆	66
麦冬	68
绵萆薢	69
绵马贯众	69
木香	71
南沙参	72
牛膝	73

平贝母	74
前胡	74
茜草	76
羌活	77
秦艽	78
拳参	81
人参	82
三棱	84
三七	85
山慈姑	87
山豆根	88
山药	89
射干	91
升麻	92
石菖蒲	93
太子参	94
天冬	95
天花粉	96
天麻	98
天南星	99
土茯苓	100
威灵仙	101
乌药	102
西洋参	103
细辛	104
香附	106
续断	107
玄参	108
延胡索	109
银柴胡	110
玉竹	111
郁金	112
远志	113
泽泻	114

浙贝母	115
知母	116
紫草	117
紫菀	118
第二章 茎木类	120
沉香	120
川木通	121
大血藤	122
钩藤	123
桂枝	124
海风藤	124
槲寄生	126
鸡血藤	127
降香	128
络石藤	129
木通	130
青风藤	131
桑寄生	132
苏木	133
檀香	133
通草	134
小通草	135
皂角刺	136
第三章 皮类	138
白鲜皮	138
椿皮	139
地骨皮	140
杜仲	140
关黄柏	142
黄柏	142
海桐皮	143
合欢皮	144
厚朴	145
牡丹皮	146

秦皮	147
肉桂	148
桑白皮	149
五加皮	150
香加皮	151
紫荆皮	152
第四章 叶类	154
艾叶	154
侧柏叶	155
大青叶	155
番泻叶	156
枇杷叶	157
桑叶	158
石韦	158
第五章 花类	160
丁香	160
合欢花	161
红花	162
槐花	162
金银花	163
菊花	164
款冬花	166
密蒙花	167
蒲黄	167
西红花	168
辛夷	169
旋覆花	170
野菊花	171
第六章 果实及种子类	172
白豆蔻	172
槟榔	173
补骨脂	174
苍耳子	175
草豆蔻	175

车前子	176
陈皮	177
川楝子	179
地肤子	180
佛手	181
覆盆子	182
枸杞子	183
瓜蒌	184
诃子	185
化橘红	185
火麻仁	186
芥子	187
金樱子	187
决明子	188
苦杏仁	189
莱菔子	189
连翘	190
蔓荆子	191
木瓜	192
南五味子	193
牛蒡子	193
女贞子	194
肉豆蔻	195
沙苑子	196
砂仁	197
山楂	199
山茱萸	200
蛇床子	201
丝瓜络	201
酸枣仁	202
桃仁	203
葶苈子	204
菟丝子	206
王不留行	207

乌梅	208
吴茱萸	209
五味子	210
香橼	210
小茴香	211
益智	212
薏苡仁	213
郁李仁	214
栀子	214
枳壳	215
枳实	217
紫苏子	218
第七章 全草类	220
白花蛇舌草	220
败酱草	221
半边莲	222
半枝莲	223
薄荷	223
大蓟	224
淡竹叶	225
广藿香	226
金钱草	227
荆芥	228
麻黄	228
佩兰	230
蒲公英	230
青蒿	231
肉苁蓉	232
伸筋草	234
石斛	235
锁阳	236
透骨草	237
豨莶草	238
仙鹤草	239

香薷	239
小蓟	240
益母草	241
茵陈	242
淫羊藿	244
鱼腥草	245
紫花地丁	246
泽兰	247
第八章 藻菌类	248
冬虫夏草	248
茯苓	249
海藻	250
昆布	251
灵芝	252
马勃	253
猪苓	254
第九章 树脂类	256
琥珀	256
没药	257
乳香	257
血竭	258
第十章 动物类	260
鳖甲	260
蝉蜕	260
穿山甲	261
地龙	262
蜂房	263
蛤蚧	264
龟甲	265
海龙	266
海马	267
海螵蛸	268
鸡内金	269
僵蚕	270

金钱白花蛇	270
羚羊角	271
鹿茸	272
牡蛎	275
牛黄	276
全蝎	277
桑螵蛸	277
麝香	278
石决明	280
水蛭	281
土鳖虫	282
乌梢蛇	283
蜈蚣	284
五灵脂	285
珍珠母	286
第十一章 矿物类	288
赤石脂	288
磁石	288
浮海石	289
龙骨	290
石膏	291
雄黄	292
赭石	292
朱砂	293
自然铜	294
第十二章 其他类	295
冰片	295
儿茶	296
海金沙	296
青黛	297
天竺黄	298
五倍子	299

第一章 根及根茎类

巴戟天

(药典品种)

【来源】本品为茜草科植物巴戟天 *Morinda officinalis* How 的干燥根。

【产地分布】主产广东高要、德庆，广西百色、苍梧及福建等地。原为野生，现多为家种，销全国。

【采收季节】野生巴戟天全年均可采挖，以秋冬采收较好。栽培巴戟天一般5~7年后才可采收，但有的地方对巴戟天遍施肥料，种植2~3年即可采收。

【规格与加工炮制】

1. 巴戟天 挖出根部，洗净，除去须根，晒至六七成干，轻轻捶扁，晒干。

2. 巴戟肉 取原药材，除去杂质，洗净，置蒸制容器内蒸透，趁热除去木心，或用水润透后除去木心，切段，干燥。

3. 盐巴戟天 取净巴戟天，用盐水拌匀，置适宜的容器内，加热蒸透，取出，趁热除去木心，切段，干燥。或将巴戟天段与盐水拌匀，闷润至盐水被吸尽时，置锅内用文火炒至表面呈黄色为度，取出，放凉。巴戟天每100kg，用食盐2kg。

4. 制巴戟天 取净甘草片捣碎，加水（约1:5量）煎汤两次，去渣，合并两次煎液。取甘草煎液，加入净巴戟天拌匀，共煮，煮透至甘草汤完全吸尽或切开无白心时，取出，趁热除去木心，切段，干燥。巴戟天每100kg，用甘草6kg。

【性状】

1. 巴戟天 本品为扁圆柱形，略弯曲，长短不等，直径0.5~2cm。表面灰黄色或暗灰色，具纵纹和横裂纹，有的皮部横向断离露出木部；质韧，断面皮部厚，紫色或淡紫色，易与木部剥离；木部坚硬，黄棕色或黄白色，齿轮状，直径1~5mm，占整个断面1/3。气微，味甘而微涩，嚼之有痒舌感。

2. 巴戟肉 本品呈扁圆柱形短段或不规则块。表面灰黄色或暗灰色，具纵纹和横裂纹。切面皮部厚，紫色或淡紫色，中空。气微，味甘而微涩。

3. 盐巴戟天 本品呈扁圆柱形短段或不规则块。表面灰黄色或暗灰色，具纵纹和横裂纹。切面皮部厚，颜色变深为深紫色或紫黑色，中空。味甘微带咸味。

4. 制巴戟天 本品呈扁圆柱形短段或不规则块。表面微黄色，具纵纹和横裂纹。切面皮部厚，紫黑色或深紫色，中空。味甜。

【外观质量评价】药材以条大、肥壮、连珠状、肉厚、色紫者为佳。

【性味归经】甘、辛，微温。归肾、肝经。

【功能主治】补肾阳，强筋骨，祛风湿。用于阳痿遗精，宫冷不孕，月经不调，少腹冷痛，风湿痹痛，筋骨痿软。

【易混品及伪品】

1. 恩施巴戟 湖北地区曾以同科植物四川虎刺 *Damnacanthus officinarus* Huang 的干燥根作巴戟天使用，习称“恩施巴戟”。

2. 羊角藤 同属植物羊角藤 *Morinda umbellate* L. 的干燥根。

3. 假巴戟 同属植物假巴戟 *Morinda shughuaeusis* C. Y. Chen et M. S. Huang 的干燥根。

4. 香巴戟 本品为木兰科植物铁箍散（香巴戟）*Schisandra propinqua* (Wall.) Baill. var. *sinensis* Oliv 的干燥根及根茎。

以上几种伪品与正品的鉴别特征见下表1。

表1：巴戟天正品与伪品的鉴别

品种 性状 特点	巴戟天	恩施巴戟	羊角藤	假巴戟	香巴戟 (铁箍散)
形状	扁圆柱形	短圆柱形或压扁	圆柱形	圆柱形	细长，有分枝
外观 表面	皮部常断裂露出木部，形似连珠	具细的横皱纹	具少数横缢纹	具少数横缢纹	横裂深者露出木部
断面	皮部较厚紫色，木部约占直径1/3	皮部较厚，木心已抽去中间有圆形小孔	皮部较薄，木部约占直径60%~70%	皮部菲薄，易脱落，木部约占直径80%以上	皮部较薄，木部约占直径80%以上

白附子

(药典品种)

【来源】本品为天南星科植物独角莲 *Typhonium giganteum* Engl. 的干燥块茎。

【产地分布】主产于河南禹县、长葛，甘肃天水、武都，湖北等地。以河南禹县产量大，质优，故习称“禹白附”。

【采收季节】秋季采挖。

【规格与加工炮制】

1. 白附子 采挖块茎，除去须根和外皮，晒干。

2. 制白附子 取净白附子，分开大小个，浸泡，每日换水2~3次，数日后如起黏沫，换水后加白矾泡1日后再进行换水，至口尝微有麻舌感为度，取出。将生姜片、白矾粉置锅内加适量水，煮沸后，倒入白附子共煮至无白心，捞出，除去生姜片，晾至六七成干，切厚片，干燥。

【性状】

1. 白附子 本品呈椭圆形或卵圆形，长2~5cm，直径1~3cm。表面白色或黄白色，略粗糙，有环纹及须根痕，顶端有茎痕或芽痕。质坚硬，断面白色，粉性。气微，味淡、麻辣刺舌。

2. 制白附子 本品为类圆形或椭圆形厚片，外表皮淡棕色，切面黄白色至淡棕黄色，呈半透明状。气微，味微涩，无麻舌感或微有麻舌感。

【外观质量评价】药材以身干、个均、肥壮饱满、色白、质坚、体重、粉性足者为佳。

【性味归经】辛，温，有毒。归胃、肝经。

【功能主治】祛风痰，定惊搐，解毒散结，止痛。用于中风痰壅，口眼喎斜，语言謇涩，惊风癫痫，破伤风，痰厥头痛，偏正头痛，瘰疬痰核，毒蛇咬伤。

【易混品及伪品】

关白附 本品为毛茛科植物黄花乌头 *Aconitum coreanum* (Levl.) Revl. Rapaice. 的干燥块根。主产辽宁、吉林、黑龙江及河北等地。本品母根略似草乌，呈倒长圆锥形，略弯曲，长4~7cm，直径1~1.5cm。表面暗棕色，多突起的皱纹，顶端亦有如草乌母根之残基。体轻，质地疏松，断面有裂隙，粉性较小。子根呈卵形、椭圆形或长圆形，长1.5~4cm，直径1~1.5cm。表面浅棕色或灰褐色，有皱纹和瘤状突起侧根痕。顶端无残基而有突起的芽，质坚硬难折断，断面较平坦。类白色，富粉性。气微弱，味辛辣而有麻舌感，有毒。

白及

(药典品种)

【来源】本品为兰科植物白及 *Bletilla striata* (Thunb.) Reichb. f. 的干燥块茎。

【产地分布】主产于贵州、四川、安徽、江西、湖北、湖南等地。贵州、四川产者为最佳。

【采收季节】夏、秋二季采挖。

【规格与加工炮制】

1. 白及 挖取块茎，除去须根，洗净，置沸水中煮或蒸至无白心，晒至半

干，除去外皮，晒干。

2. 白及片 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切薄片，晒干。

【性状】

1. 白及 本品呈不规则扁圆形，多有2~3个爪状分枝，长1.5~5cm，厚0.5~1.5cm。表面灰白色或黄白色，有数圈同心环节和棕色点状须根痕，上面有突起的茎痕，下面有连接另一块茎的痕迹。质坚硬，不易折断，断面类白色，角质样。气微，味苦，嚼之有黏性。

2. 白及片 本品呈不规则的薄片。外表皮灰白色或黄白色。切面类白色，角质样，半透明，维管束小点状，散生。质脆。气微，味苦，嚼之有黏性。

【外观质量评价】药材以个大坚实、色白明亮、光洁者为佳。干枯、发黑者，品质较差，属于劣品不宜入药。

【性味归经】苦、甘、涩，微寒。归肺、肝、胃经。

【功能主治】收敛止血，消肿生肌。用于咯血，吐血，外伤出血，疮疡肿毒，皮肤皲裂。

【地方习用品】

黄花白及 本品为同属植物黄花白及 *Bletilla ochracea* Schltr. 的块茎。在四川、甘肃等地作白及使用。其性状与正品相似，惟形较瘦小，长不过3.5cm，外皮有纵皱，棕黄色或黄色。

白前

(药典品种)

【来源】本品为萝藦科植物柳叶白前 *Cynanchum stazcentonii* (Dec - ne.) Schltr. ex Levl. 或芫花叶白前 *Cynanchum glaucescens* (Decne.) Hand. - Mazz. 的干燥根茎和根。

【产地分布】主产浙江、江苏、安徽、湖北、湖南等省。

【采收季节】秋季采挖。

【规格与加工炮制】

1. 白前 拔起全株，除去地上部分，洗净，晒干。

2. 白前段 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切段，干燥。

3. 蜜白前 取炼蜜，加适量开水稀释，淋入净白前段内拌匀，稍闷，文火炒至深黄色，不粘手时，取出晾凉。白前每100kg，用炼蜜25kg。

【性状】

1. 白前 柳叶白前根茎呈细长圆柱形，有分枝，稍弯曲，长4~15cm，直径1.5~4mm。表面黄白色或黄棕色，节明显，节间长1.5~4.5cm，顶端有残茎。