


彩色中藥大典

編輯

劉接實 洪禎徽 張蔚炎 李坤城 邱德明 廖桂榮 詹台杰

洪禎權 劉焜明 謝炫禕 傅鳳嬌 李金串 李喜昌 賴天旺 李正興

2



益大書局出版社

臨床實用
彩色中藥大典

2

益大書局出版社

臨床實用
彩色中藥大典

全書共四大冊特價：4000元

2

編輯：劉接寶 洪禎徽 張蔚炎 李坤城 邱德明

廖桂榮 詹台杰 洪禎儷 劉焜明 謝炫緯

傅鳳嬌 李金串 李喜昌 賴天旺 李正興

發行人：陳振東

出版者：益大書局出版社

登記證：局版台業字第2443號

總經銷：益大書局

地址：台北市八德路一段51號樓下83號

電話：(02)3911267・3519356

郵撥：0537202~9 蕭天岳帳戶

封面設計：蕭鳴


製版：興旺彩色製版有限公司

印刷所：沅立彩色製版印刷股份有限公司

中華民國七十七年八月出版

本書如有缺頁破損，請寄回更換

版權所有



翻印必究

第二冊目錄

清熱藥

① 清熱瀉火藥

梔子·····	6
知母·····	10
天花粉·····	14

② 清肝明目藥

菊苣·····	20
千里光·····	24
熊膽·····	28
青蒿·····	32
決明子·····	36

③ 清熱涼血藥

紫草茸·····	42
地膽草·····	46
玄參·····	50
赤芍·····	54

④ 清熱燥濕藥

龍膽·····	60
黃蘗木·····	64
臭椿皮·····	68
黃柏·····	72
牛頓草·····	76
黃芩·····	80
苦參·····	84
白鮮皮·····	88
秦皮·····	92
黃連·····	96

⑤ 清熱解毒藥

穿心蓮·····	102
錦燈籠·····	106
龍葵·····	110
白英·····	114
翻白草·····	118
蒲公英·····	122
馬蘭草·····	126
山豆根·····	130
射干·····	134
白薇·····	138
金果欖·····	142
鳳尾草·····	146
漏蘆·····	150
敗醬草·····	154
蟾酥·····	158
金銀花·····	162
土茯苓·····	166
白頭翁·····	170
半支蓮·····	174
馬薊子·····	178
魚腥草·····	182
鴨膽子·····	186
天蕎麥根·····	190
苦木·····	194
木芙蓉·····	198

祛風濕藥

菝葜·····	204
---------	-----

獨活·····	208
絲瓜絡·····	212
銀環蛇·····	216
油松節·····	220
吳茱萸·····	224
老鸛草·····	228
八角楓·····	232
秦艽·····	236
梧桐葉·····	240
徐長卿·····	244
木瓜·····	248
虎骨·····	252
尋骨風·····	256
青風藤·····	260
伸筋草·····	264
威靈仙·····	268
海桐皮·····	272
小茴香·····	276
雪上一枝蒿·····	280
豨薟草·····	284
八厘麻·····	288
水蘇·····	292

臨床實用
彩色中藥大典

2

益大書局出版社

臨床實用 彩色中藥大典

第一冊～第四冊

補益藥(1)補氣藥(2)助陽藥(3)養血藥(4)滋陰藥

解表藥(1)發散風熱藥(2)發散風寒藥

芳香化濕藥

利水滲濕藥

清熱藥(1)清熱瀉火藥(2)清肝明目藥(3)清熱涼血藥

(4)清熱燥濕藥(5)清熱解毒藥

祛風濕藥

溫裏藥

瀉下藥(1)潤下藥(2)峻水逐下藥(3)攻下藥

開竅藥

安神藥

平肝息風藥

理氣藥

理血藥(1)活血祛瘀藥(2)止血藥

消導藥

化痰止咳藥(1)溫化寒痰藥(2)清化熱痰藥(3)止咳平喘藥

收斂藥

驅蟲藥

其他藥(1)催吐劑(2)外科藥(3)強心藥

第二冊目錄

清熱藥

① 清熱瀉火藥

梔子·····	6
知母·····	10
天花粉·····	14

② 清肝明目藥

菊苣·····	20
千里光·····	24
熊膽·····	28
青蒿·····	32
決明子·····	36

③ 清熱涼血藥

紫草茸·····	42
地膽草·····	46
玄參·····	50
赤芍·····	54

④ 清熱燥濕藥

龍膽·····	60
黃蘗木·····	64
臭椿皮·····	68
黃柏·····	72
牛頓草·····	76
黃芩·····	80
苦參·····	84
白鮮皮·····	88
秦皮·····	92
黃連·····	96


⑤ 清熱解毒藥

穿心蓮·····	102
錦燈籠·····	106
龍葵·····	110
白英·····	114
翻白草·····	118
蒲公英·····	122
馬蘭草·····	126
山豆根·····	130
射干·····	134
白薇·····	138
金果欖·····	142
鳳尾草·····	146
漏蘆·····	150
敗醬草·····	154
蟾酥·····	158
金銀花·····	162
土茯苓·····	166
白頭翁·····	170
半支蓮·····	174
馬薊子·····	178
魚腥草·····	182
鴨膽子·····	186
天蕎麥根·····	190
苦木·····	194
木芙蓉·····	198

祛風濕藥

菝葜·····	204
---------	-----

獨活·····	208
絲瓜絡·····	212
銀環蛇·····	216
油松節·····	220
吳茱萸·····	224
老鸛草·····	228
八角楓·····	232
秦艽·····	236
梧桐葉·····	240
徐長卿·····	244
木瓜·····	248
虎骨·····	252
尋骨風·····	256
青風藤·····	260
伸筋草·····	264
威靈仙·····	268
海桐皮·····	272
小茴香·····	276
雪上一枝蒿·····	280
豨薟草·····	284
八厘麻·····	288
水蘇·····	292



清熱藥

(1)清熱瀉火藥


梔子

別名	木丹，鮮支，卮子，越桃，小后子，黃鷄子，黃荑子，黃梔子，梔桃
基源	爲茜草科植物山梔的果實。
性味	苦，寒。“味苦，寒。”“大寒，無毒。”“苦酸，寒。”
一般用量	2～4 錢
主治·效能	清熱，瀉火，涼血。治熱病虛煩不眠，黃疸，淋病，消渴，目赤，咽痛，吐血，衄血，血痢，尿血，熱毒瘡瘍，扭傷腫痛。
採取·加工	10 月間果實成熟果皮呈黃色時採摘，除去果柄及雜質，曬乾或烘乾
藥用部份	果實

藥理作用

- (1)利膽作用 梔子水提取液及醇提取液給予家兔口服，對輸膽管導出的膽汁量及固形成分無影響，但有人用同樣製劑注射於家兔，15～30 分鐘膽汁分泌開始增加，持續 1 小時以上。給兔靜脈注射藏紅花素和藏紅花酸鈉後，膽汁分泌量增加。梔子水煎劑或沖服劑給入口服後作膽囊拍片，證明服藥後 20 及 40 分鐘膽囊有明顯的收縮作用。家兔總輸膽管結紮後，口服梔子提取液則血中膽紅素減少，用藥愈多，減少愈顯著（如結紮後每隔 24 小時口服 1 次，則結果甚爲明顯），尤其連續服用適量藥物以後結紮，所得效果最佳，醇提取液亦具有相同的作用，但較水提取液作用稍弱。

參考圖鑑





梔子 *Gardenia jasminoides* Ellis

【古籍記載】

(1)《本草衍義》：“仲景治（傷寒）發汗吐下後，虛煩不得眠；若劇者，必反覆顛倒，心中懊憹，梔子豉湯治之。虛故不用大黃，有寒毒故也。梔子雖寒無毒，治胃中熱氣，既亡血、亡津液，腑臟無潤養，內生虛熱，非此物不可去。又治心經留熱，小便赤澀，用去皮山梔子、火煨大黃、連翹、甘草（炙），等分，末之，水煎三錢服，無不利也。

(2)《丹溪心法》：“山梔子仁，大能降火，從小便泄去。其性能屈曲下降，人所不知。亦治痞塊中火邪。”“大凡心膈之痛，須分新久。若明知身受寒氣、口吃寒物而得病者，於初得之時，當與溫散或溫利之藥。若曰病得之稍久則成鬱，久鬱則蒸熱，熱久必生火，《原病式》中備言之矣，若欲行溫散溫利，寧無助火添病耶！古方中多以山梔子爲熱藥之嚮導，則邪易伏、病易退、正易復而病安。”

(3)《湯液本草》：“或用梔子利小便，實非利小便，清肺也，肺氣清而化，膀胱爲津液之腑，小便得此氣化而出也。梔子豉湯治煩躁，煩者氣也，躁者血也，氣主肺，血主腎，故用梔子以治肺煩，用香豉以治腎躁。躁者，懊憹不得眠也。”

【化學成份】

含黃酮類梔子素（Gardenin）、果膠、鞣質、藏紅花素（Crocine）、藏紅花酸（Crocetin）、D-甘露醇、廿九烷、 β -谷甾醇。另含多種具環臭蟻醛結構的苷：梔子苷（Gardenoside）、去羥梔子苷〔Geniposide，即格尼泊素-1-葡萄糖苷（Genipin-1-glucoside）〕、格尼泊素-1- β -D-龍膽二糖苷（Genipin-1- β -D-gentiobioside）及小量的山梔子苷（Shanzhiside）。山梔的果實還含梔子新苷（Gardoside），雞屎藤次苷甲酯（Scandoside methyl ester）。膽鹼（Choline）和熊果酸（Ursolic acid）。後者具明顯的安定與降溫作用，爲梔子的解熱、降溫有效成分。

【臨床應用】

(1)治傷寒發汗、吐、下後，虛煩不得眠，心中懊憹：梔子十四個（剖），香豉四合（綿裹）。上二味，以水四升，先煮梔子得二升半，納豉，煮取一升半，去滓，分爲二服。溫進一服，得吐者止後服。

(2)治傷寒大病瘥後勞復者：枳實三枚（炙），梔子十四個（剖），豉一升（綿裹）。上三味，以清漿水七升，空煮取四升，納枳實、梔子，煮取二升，下豉，更煮五、六沸，去滓，溫分再服，覆令微似汗。若有宿食者，納大黃如博棋子五、六枚。

(3)治傷寒身黃發熱：肥梔子十五個（剖），甘草一兩（炙），黃柏二兩。上三味，以水四升，煮取一升半，去滓，分溫再服。

(4)治濕熱黃疸：山梔四錢，雞骨草、田基黃各一兩。水煎，日分三次服。

(5)治尿淋，血淋：鮮梔子二兩，冰糖一兩。煎服。

(6)治小便不通：梔子仁二七枚，鹽花少許，獨顆蒜一枚。上搗爛，攤紙花上貼臍，或塗陰囊上，良久即通。

(7)治急性胃腸炎，腹痛，上吐下瀉：山梔三錢，盤柱南五味（紫金皮）根五錢，青木香二錢。上藥炒黑存性，加蜂蜜五錢。水煎，分二次服。

(8)治口瘡、咽喉中塞痛，食不得：大青四兩，山梔子、黃柏各一兩，白蜜半斤。上

切，以水三升，煎取一升，去滓，下蜜更煎一兩沸，含之。

(9)治目赤：取山梔七枚，鑽透，入煆灰火煨熟，以水一升半，煎至八合，去滓，入大黃末三錢匕，攪勻，食後旋旋溫服。

(10)治胃脘火痛，大山梔子七枚或九枚，炒焦，水一盞，煎七分，入生薑汁飲之。

(11)治鼻中衄血：山梔子燒灰吹之。

(12)治肺風鼻赤酒瘡：老山梔爲末，黃蠟等分溶和。爲丸彈子大。空心茶、酒嚙下。忌酒、炙博。

(13)治赤白痢並血痢：山梔子仁四七枚。銼，以漿水一升半，煎至五合，去滓。空心食前分溫二服。

(14)治熱水腫：山梔子五錢，木香一錢半，白朮二錢半。細切，水煎服。

(15)治婦人子腫濕多：炒山梔子一合。爲末，米飲吞下，或丸服。

(16)治折傷腫痛：梔子、白麵同搗，塗之。

(17)治火丹毒：梔子，搗和水調敷之。

(18)治火瘡未起：梔子仁灰，麻油和封，惟厚爲佳。

(19)治瘡瘍腫痛：山梔、蒲公英、銀花各四錢。水煎，日分三次服。另取生銀花藤適量，搗爛，敷患處。

(20)治燒傷：梔子末和鷄子清濃掃之。

【治療體會】

(1)治療急性黃疸型肝炎取山梔製成10%及50%兩種煎劑，每天3次飯後服用。一部分病人用10%煎劑每次10毫升，以後逐漸遞增至50毫升；另一部分病人用50%煎劑，每次10～15毫升。共治19例，7例痊癒，10例接近痊癒。住院9～63天不等，平均30.3天。

(2)治療扭挫傷將山梔子搗碎，研成粗粉，以溫水調成糊狀，加入少許酒精，包敷傷處。一般3～5天更換1次，如腫脹明顯可隔天更換1次。骨折者不宜使用，脫臼者應先整復後再用。如有肢體麻痺，應配合理療及針灸治療。治療407例，24小時內疼痛消失者328例；48小時內消失者66例；72小時內消失者13例。疼痛平均消失時間爲30小時。腫脹消退時間平均爲2.5天；血腫吸收時間平均爲7.8；功能恢復時間平均爲5.1天。或用黃梔子、明乳香加適量黃酒，攪拌後放鍋內蒸成糊膏狀，待微溫時敷於患部，厚度以1～1.5厘米爲宜。用時先在局部塗凡士林1層，然後再敷藥，上蓋油紙，綑帶包紮。間隔2～3天換藥。治療56例，除2例療效不佳外，54例均治癒。亦可用黃梔子粉2兩，麵粉4兩，鷄蛋1個，燒酒適量，調成糊狀敷於局部，待藥乾後更換新藥。一般在敷藥2次後即見效果。

(3)用於止血取黃梔子粉100克，以20%明膠液調成膏狀，烘乾碾成100號細粉，再加適量苯甲酸，高壓消毒備用。對一般上消化道出血每次服3～6克，每日3次。亦可用作局部止血劑。

【禁忌】

脾虛便溏者忌服。


知母


別名	蚺母、連母、野蓼、地參、水參、水淩、貨母、蜚母、芪母、提母、菰母、女雷、女理、兒草、鹿列、韭逢、兒踵草、東根、水須、苦心、昌支。
基源	爲百合科植物知母的根莖。
性味	苦，寒。
一般用量	2～5錢
主治·效能	滋陰降火，潤燥滑腸。治煩熱消渴，骨蒸勞熱，肺熱咳嗽，大便燥結，小便不利。
採取·加工	春、秋均可採挖，以秋季者較佳。
藥用部份	根莖。

藥理作用

- (1) 抗菌作用 知母煎劑在瓊脂平板上對葡萄球菌、傷寒桿菌有較強的抑制作用，對痢疾桿菌、副傷寒桿菌、大腸桿菌、枯草桿菌、霍亂弧菌也有抑制作用，在沙伯氏培養基上，對某些常見的致病性皮膚癬菌也有些抑菌作用。乙醚浸膏及在此浸膏中經丙酮處理所得之粗結晶對在普、拜二氏培養基上的 $H_{37}RV$ 人型結核桿菌亞種有較強的抑制作用，前者的最低有效濃度爲 1：64000（無血清）或 1：16000（加血清）；後者爲 1：16000～1：8000，前人所得之皂苷無此作用。
- (2) 解熱作用 浸膏 2 毫升／公斤（1 毫升相當生藥 2 克），與大腸桿菌（0.03%）2.3 毫升，同時注射於家兔皮下，或先注射大腸桿菌，隔 15 分鐘後再注入浸膏，體溫均不升高，故認爲有解熱作用。
- (3) 血糖下降作用。

參考圖鑑





知母 *Anemarrhena asphodeloides* Bge.

【古籍記載】

(1)《綱目》：“腎苦燥，宜食辛以潤之；肺苦逆，宜食苦以瀉之。知母之辛苦寒涼，下則潤腎燥而滋陰，上則清肺金瀉火，乃二經氣分藥也；黃柏則是腎經血分藥，故二藥必相須而行，昔人譬之蝦與水母，必相依附。

(2)《本草通玄》：“知母苦寒，氣味俱厚，沉而下降，為腎經本藥。兼能清肺者，為其肅清龍雷，勿使潛上，則手太陰無銷燦之虞也。瀉有餘之相火，理消渴之煩蒸，凡止咳安胎，莫非清火之用。多服令人泄瀉，亦令人減食，此惟實火燔灼者，方可暫用。若施之於虛損之人，如水益深矣。蓋苦寒之味，行天地肅殺之令，非長養萬物者也。”

(3)《本草正》：“古書言之母佐黃柏滋陰降火，有金水相生之義。蓋謂黃柏能制膀胱、命門陰中之火，知母能消肺金，制腎水化源之火，去火可以保陰，是即所謂滋陰也。故潔古、東垣皆以為滋陰降火之要藥。繼自丹溪而後，則皆用以為補陰，誠大謬矣。夫知母以沉寒之性，本無生氣，用以清火則可，用以補陰，則何補之有？”

(4)《藥品化義》：“知母與黃柏併用，非為降火，實為助水；與貝母同行，非為清痰，專為滋陰。”

(5)《本草新編》：“黃柏未嘗不入氣分，而知母未嘗不入血分也。黃柏清腎中之火，亦能清肺中之火，知母瀉腎中之熱，而亦瀉胃中之熱，胃為多氣多血之腑，豈止入於氣分，而不入於血分耶？是二藥不必兼用。”

(6)《本經逢源》：“知母，《本經》言除邪氣肢體浮腫，是指濕熱水氣而言。故下文云下水，補不足，益氣，乃濕熱相火有餘，燦灼精氣之候，故用此清熱養陰，邪熱去則正氣復矣。”

(7)《重慶堂隨筆》：“知母，清肺胃氣分之熱，則津液不耗而陰自潛滋暗長矣。然仲聖云，胃氣生熱，其陽則絕。蓋胃熱太盛，則陰不足以和陽，津液漸乾，而成枯燥不能殺谷之病，其陽則絕者，即津液涸竭也，清其熱，俾陽不絕，則救津液之藥，雖謂之補陽也可。乃後人以為寒涼之品，非胃家所喜，諄諄戒勿輕用，輒從事於香燥溫補之藥者何哉！”

(8)《本經疏證》：“知母能益陰清熱止渴，人所共知，其能下水，則以古人用者甚罕，後學多不明其故。……《千金》、《外台》兩書用知母治水氣各一方。《千金》曰，有人患水腫腹大，其堅如石，四肢細，少勞苦足脛即腫，少飲食便氣急，此終身之疾，服下藥不瘥者，宜服此藥，微風除濕，利小便，消水穀，歲久服之，乃可得力，瘥後可長服。其所用藥，則加知母於五苓散中，更增鬼箭羽、丹參、獨活、秦艽、海藻也。《外台》曰，《古今錄驗》澤漆湯，療寒熱當風，飲多暴腫，身如吹，脈浮數者。其所用藥，則澤瀉、知母、海藻、茯苓、丹參、秦艽。

【化學成份】

主含皂苷。根莖含總皂苷約6%，從中檢出6種皂苷，分別稱為知母皂苷(Timosaponin) A-I、A-II、A-III、A-IV、B-I和B-II，其中知母皂苷A-III是薩爾薩皂苷元(Sarsasapogenin)與知母雙糖[Timobiose，即β-葡萄糖(1-2)β-半乳糖]結合而成的雙糖苷，知母皂苷A-I是薩爾皂苷元β-D-吡喃半乳糖苷。知母根莖中的皂苷元主要是薩爾薩皂苷元，乾根中的含量約0.5%，此外還有嗎爾考皂苷元(Markogenin)、新芰脫皂苷元(Neogitogenin)。以前從知母根莖中分出的皂苷曾稱為知母寧(Asphonin)，推測是嗎爾考皂苷、知母皂苷A-III、A-IV、B等的混合物。根莖尚含多量的還原糖和黏液質、鞣酸、脂肪油等，又每克含尼克酸188微克，尼克酰胺12微克。另含芒果苷(Mangiferin, Chimonin) 0.5%。

地上部分含芒果苷和異芒果苷(Isomangiferin)。葉含芒果苷約0.7%。花含皂苷，水解後得熔點為246~248℃的苷元 $C_{27}H_{42}O_4$ 。

【臨床應用】

(1)治傷寒邪熱內盛，齒牙乾燥，煩渴引飲，目昧唇焦：知母五錢，石膏三錢，麥門冬二錢，甘草一錢，人參八錢。水煎服。

(2)治溫瘧壯熱，不能食：知母、鱉甲(炙)、地骨皮各三兩，常山二兩，竹葉(切)一升，石膏四兩(碎)。上六味切，以水七升，煮取二升五合，去滓，分三服。忌蒜、豬肉、菹菜、生葱、生菜。

(3)治火衝眩暈，暴發倒仆，昏不知人，甚則遺尿不覺，少頃汗出而輕，仍如平人，右關脈細數，脾陰不足者：知母、黃柏、黃芪、當歸身。水煎服。

(4)治消渴：生山藥一兩，生黃芪五錢，知母六錢，生鷄內金(搗細)二錢，葛根錢半，五味子三錢，天花粉三錢。水煎服。

(5)治氣虛勞傷，面黃肌瘦，氣怯神離，動作倦怠，上半日咳嗽煩熱，下午身涼氣爽，脈數有熱者：知母三錢，黃柏三錢，人參二錢，麥冬五錢，廣皮一錢，甘草五分。水煎服。

(6)治肺勞實熱，面目苦腫，咳嗽喘急，煩熱煩赤，骨節多痛，乍寒乍熱：知母、貝母(去心膜)、杏仁(去皮尖，炒)、甜葶藶(略炒)、半夏(湯泡七次)、秦艽(去蘆)、橘紅各一兩，甘草(炙)半兩。上細切，每服四錢，水一盞半，薑五片，煎至五分，去滓溫服，不拘時候。

(7)治肺家受燥，咳嗽氣逆：知母、石膏、桔梗、甘草、地骨皮。水煎服。

(8)妊娠子煩，因服藥致胎氣不安，煩不得臥者：知母一兩，洗焙為末，棗肉丸彈子大。每服一丸，人參湯下。醫者不識此病，作虛煩治，反損胎氣。

【禁忌】

脾胃虛寒，大便溏泄者忌服。

【鑒別】

知母、黃柏，均有清火之功，且常同用。然：知母清胃熱，清胃滋陰，守而不走，且有潤腸通便之功。黃柏，偏清下焦濕熱，而不滋陰。