

萬有文庫

種百七集二第

王雲五主編

廣羣芳譜

(三)

清聖祖敕教撰

商務印書館發行

廣 羣 芳 譜

(三)

撰 教 祖 聖 清

庫文有萬

種百七集二第

者纂編總
五雲王

行發館書印務商

廣羣芳譜卷第十

穀譜

大豆按黑豆黃豆皆名大豆原譜分而二今從齊民要術併合爲一

原豆者莢穀之總名也大者謂之菽

增本草】大豆有黑白黃褐青斑數色。

原黑豆處處有之苗高

三四尺蔓生莖葉蔓延葉圓有尖色青帶黑上有小白毛秋開小白花成叢結莢長寸餘多者五六粒亦有一二粒者經霜乃熟緊小者爲雄豆入藥良大者止堪食用作豉及喂牲畜味生則平炒則熱煮則寒作豉主發散造醬及生黃卷平牛食之溫馬食之冷一體之中用之數變小兒以炒豆同豬肉食多壅氣致死十歲以上則無妨服華麻子及厚朴者並忌炒豆犯之脹滿致死黃豆亦有小大二種種耘收穫苗葉莢其與黑豆無異惟葉之色稍淡結角比黑豆稍肥其豆可食可醬可豉可油可腐腐之滓可喂猪荒年人亦可充饑油之滓可糞地其可然火葉名藿嫩時可爲茹

增廣志】有黃落豆有御豆角其豆長有場

豆葉可食有青有黃者

【齊民要術】今世大豆有黑白二種及長梢牛踐之名又有黑高麗豆蠶豆大豆類也

冀考增【詩幽風】七月亨葵及菽【小雅】中原有菽庶民采之采菽采菽筐之筥之【傳】菽所以芼

太牢而待君子也。【箋】采之者采其葉以爲藿。三牲牛羊豕以藿。王饗賓客有生俎。乃用鉶羹。故使采之。【原】大雅。蘡之荏苒。荏苒施施。【增】禮記檀弓。啜菽飲水盡其歡。【月令】孟夏之月。天子食菽與雞。【注】菽實孚甲堅合屬水。雞木畜時熟食之。亦以安性也。【原】左傳。周子有兄而無慧。不能辨菽麥。【注】菽。大豆也。豆麥殊形易別。故以爲癡者之候。【增】戰國策。張儀爲秦連橫說韓王曰。韓地險惡山居五穀所生非麥而豆。民之所食大抵豆飯藿羹。【注】藿。菽之少者。姚云。史記後語作飯藿而麥。下文亦作菽。古語只稱菽。漢以後方呼豆。【史記周后稷本紀】棄爲兒時。屹如巨人之志。其游戲好種樹麻菽。麻菽美。【前漢書鮑宣傳】漿酒藿肉。【注】師古曰。藿。豆葉也。【楊惲傳】惲報孫會宗書詩曰。田彼南山。蕪穢不治。種一頃豆。落而爲萁。人生行樂耳。須富貴何時。【後漢書馮異傳】王郎起。光武自薊東南馳。晨夜草舍。至饒陽蕪蕘亭。時天寒烈。衆皆餓疲。異上豆粥。明日光武謂諸將曰。昨得公孫豆粥。饑寒俱解。後帝卽位。使中黃門賜以珍寶。詔曰。倉卒蕪蕘亭豆粥。滹沱河麥飯。厚意久不報。【晉書良吏傳】吳隱之介立有清操。雖日晏歎菽。不饗非其粟。【隱逸傳】霍莊端居篳門。歎菽飲水。州府禮命及公車徵。並不就。【北齊書庫狄伏連傳】冬至之日。親表稱賀。其妻爲設豆餅。伏連問此豆因何而得。妻對向於食馬豆中分減充用。伏連大怒。典馬掌食之人並加杖罰。【唐書韋貫之傳】貫之居貧。噉豆糜自給。【揚子】子有含菽縕絮。而致滋美其親。將以求孝也。【列子】周諺曰。晨出夜入。自以性之恒。啜菽茹

藿，自以味之極。【呂氏春秋】得時之豆，長莖短足，其莢二七爲族，多枝數節，競葉蕃實。【淮南子】河水中濁而宜菽。【焦氏易林】中原有菽，以待饗食飲御諸友，所求大得。旦樹菽豆，暮成藿羹，心之所樂，志快心歡。

【孝經援神契】赤土宜菽。

【春秋佐助期】豆神名靈殖，姓樂長，七尺大目，通於時節。

圓【東觀漢紀】劉平嘗爲餓賊所劫，叩頭曰：老母饑少氣力，待平爲命，願得還飯食母，馳來就死。涕泣發

於肝膽，賊卽遣去。乃撫三斗豆以謝賊恩。

閔貢字仲叔，大原人也。與周黨相友，黨每過仲叔，共啜菽飲

水無菜茹。【古今注】宣帝元康四年南陽雨豆。【世說】石崇爲客作豆粥，咄嗟便辦，恒冬天得韭萍

蘿，王愷爲搥腕，乃密貨崇帳下都督，問所以，都督曰：豆至難煮，唯預作熟末，客至作白粥以投之，韭萍蘿是搗韭根雜以麥苗爾。

壇【鵠冠子】兩葉蔽目，不見泰山；雙豆塞耳，不聞雷霆。【拾遺記】樂浪之東

有背明之國，宜種百穀，有繞明豆，其莖弱，自相縛纏，有傾離豆，言其豆見日，葉垂覆地，食者不老不疾。

【益都耆舊傳】朱倉字卿雲，之蜀從處士張寧受春秋，糴豆十斛，屑之爲糧，閉戶精誦，寧治之，斂得米二十石，倉不受一粒。【爾雅翼】八月雨爲豆花雨。

原【雙槐歲抄】溫陵人家中元前數日，以水浸黑豆

暴之，及芽以糠皮實盆內，鋪沙植豆，用板壓長，則覆以桶，曉則曬之，欲其齊而不爲風日損也。中元則陳於祖宗之前，越三日出之，洗焯瀆以油鹽苦酒香料，可爲茹，捲以麻餅尤佳，色淺黃，名鵝黃豆生。

弘治

乙卯六月，夥歛雨豆。隆慶六年四月，陝西西寧衛天降黑豆，偏地人食之，則氣閉。

集藻【賦】**增**【晉張華豆羹賦】乃有孟秋嘉穀，垂枝挺英。是刈是穫，充簞盈篋。香鑠和調，周疾赴急。時御一杯，下咽三嘆。時在下邑，頗多艱難。空匱之厄，固不輟懼。追念昔日，啜菽永安。

【頌】增【宋蘇軾食豆粥頌】道人親煮豆粥，大眾齊念般若。老夫試挑一口，已覺西家作馬。

【五言古詩】原【魏曹植應詔作】煮豆然豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。
【晉陶潛歸園田居】種豆南山下，草盛豆苗稀。晨興理荒穢，帶月荷鋤歸。道狹草木長，夕露沾我衣。衣沾不足惜，但使願無違。

【七言古詩】增【宋蘇軾豆粥】君不見滹沱流澌車折軸，公孫倉皇奉豆粥。濕薪破竈自燎衣，饑寒頓解劉文叔。又不見金谷敲冰草木春，帳下烹煎皆美人。萍蘚豆粥不傳法，咄嗟而辦石季倫。干戈未解身如寄，聲色相纏心已醉。身心顛倒自不知，更識人間有真味。豈如江頭千頃雪色蘆茅簷，出沒晨煙孤地碓。春光似玉沙瓶煮，豆軟如酥。我老此身無著處，賣書來向東家住。臥聽雞鳴粥熟時，蓬頭曳履君家去。
【方岳豆苗】江南之筍天下奇，春風匆匆催上籬。秦郵之薑肥勝肉，遠莫達之長負腹。先生一鉢同僧居，別有方法供齋蔬。山房掃地布豆粒，不煩勤荷煙中鋤。手分瀑泉灑作雨，覆以老瓦如穹廬。平明發視玉鬚磔，一夜怒長堪冰苴。自親火候淪魚眼，帶生芼入晴雲椀。碧絲高壓涎滑蕡，脆響平欺辛蟹蔊。晚菘早韭各一時，非時不到詩人脾。何如此雋咄嗟辦，庾郎處貧未爲憤。

【詩散句】原【唐杜甫】相攜行豆田秋花露霏霏。增【宋楊萬里】道邊籬落半遮眼。白白紅偏豆花。

【唐張九齡】場藿已成歲。【杜甫】豆子雨已熟。【宋蘇軾】秋霖暗豆莢。

【陸游】宿雨飽豆莢。

豆莢雨中肥。【林景熙】蟲響豆花秋。

原【唐杜甫】南山豆苗早荒穢。

增【許渾】童子遙迎種豆歸。

【溫庭筠】桑竹參差映豆花。【宋陸游】籩實傍籬收豆莢。

【楊萬里】晚紫豆花初總角。

【元李孝光】豆遺晨壠茅齊白。

【明高啓】白豆花開片雨餘。

原【孟淑卿】豆花雨過晚生涼。

別錄

原【種植】槐無蟲宜豆。夏至前後下種。上旬種則花密莢多。宜甲子丙子戊寅壬午及六月三卯日。

忌西南風。及申卯日肥地宜稀。薄地宜密。纔出便鋤草淨爲佳。使葉蔽其根。不畏旱。穫宜晚。莢赤莖蒼葉。

微黃方穫。

增【崔寔月令】二月可種大豆。又二月昏參夕杏花盛。桑椹亦可種大豆。謂之上時。四月時。

雨降可種大小豆。【雜陰陽書】大豆生於槐。九十日秀。秀後七十日熟。豆生於申壯於子長於壬老於

丑死於寅惡於甲乙忌於卯午丙丁。

【齊民要術】春大豆次植穀之後。二月中旬爲上時。一畝用

上旬爲中時。用子一斗。四月上旬爲下時。用子一升。歲宜晚者五六月亦得。然稍晚稍加種子。地不求熟。

子八升。三月

種地過熟者。一斗。此不零落。必須耩下。

耩欲深故豆性強。苗深則及澤。鋒耩各一鋤。不過再葉落盡。然後刈。則難治。

刈訖則速耕。

大豆怕雨。秋土厚。不耕則無澤。種茭者。用麥底。一畝用子三升。先漫散訖。犁細淺。甽而勞之。旱則苗莖不高。深則葉不盡。

不生。若澤多者。先深耕訖。逆垡擲豆。然後勞之。

澤少則否。爲其浥鬱不生。九月中候近地葉有黃落者速刈之。葉少不必浥。

落盡遇雨澤爛不成

氾勝之書曰大豆保歲易爲宜古之所以備凶年也謹計家口數種大豆率人五

畝此田之本也三月榆莢時有雨高田可種大豆土和無塊畝五升土不和則益之種大豆夏至後二十

日尚可種戴甲而生不用深耕大豆須勻而稀豆花憎見日見日則黃爛而根焦也 穂豆之法莢黑而莖蒼輒收無疑其實將落反失之故曰豆熟於場於場穫豆卽青莢在上黑莢在下 氾勝之區種大豆

法坎方深各六寸相去二尺一畝得千六百八十坎其坎成取美糞一升合坎中土攪和以內坎中臨種沃之坎三升水坎內豆三粒覆上土勿厚以掌抑之令種與土相親一畝用種一升用糞十六石八斗豆

生五六葉鋤之旱者溉之坎三升水丁夫一人可治五畝至秋收一畝中十六石

【農政全書】種大豆鋤成行壠春穴下種早者二月種四月可食名曰梅豆

【吳下田家志】種豆宜甲子乙丑壬申丙子戊寅壬午壬寅

【原服食】【博物志】人食豆三年則身重行動難

左慈荒年法用大豆粒細調勻者生熟接之令有光暖徹豆心內先日不食以冷水頓服訖

一切魚肉菜果不得復食渴飲冷水初小困十日後體力壯健不思食

【抱朴子】相國張文蔚莊內有鼠狼穴養四子爲蛇所吞鼠狼雌雄情切乃於穴外坌土壅穴俟蛇出頭度其回轉不便當腰咬斷而劈腹銜出四子尚有氣寘於穴外銜豆葉嚼而敷之

皆活後人以豆葉治蛇咬蓋本於此

【延年祕錄】服大豆令人長肌膚益顏色填骨髓加氣力補虛能食不過兩劑大豆五升如作醬法取黃搗末以猪肪煉膏和丸梧子大每服五十九至百丸溫酒下神驗

祕方也肥人忌服。【輟耕錄】黃山谷煮豆帖云：煮黑豆法，確豆一升，按沙極淨，用貲衆一斤，細剉如骰子，同豆斟酌水多少，慢火煮豆香熟，日乾之，翻覆令展盡餘汁，簸取黑豆去貫衆空心，日唱五七粒，食百草木枝葉皆有味，可飽也。【荆湖近事】陶華以鹽煮黑豆常食之，云能補腎，蓋豆乃腎之穀，其形類腎，黑色通腎，引之以鹽，所以妙也。李守愚侵晨井華水吞黑豆五七粒，謂之五臟穀，至老視聽不衰。

【製用】六月六日以洗淨大黃豆煮熟，取出候冷，以麪爲衣，攤於席上，以衣蓋之，又用青蒿燒一七，取出曬乾，搓去麪黃，入缸煎紫蘇鹽湯候冷，浸豆與水平，每豆一斤，用鹽六兩，浸過一夜，取出和食香拌勻，裝淨罈內，令日曬四五日，從新搜過一次，再曬再搜，四五次用。

附
綠稻豆

原稻豆本草云：稻乃自生稻，一名蠶豆，一名蠶菽，一名治蠶，一名鹿豆，一名驢豆，黑豆中最細者，即黑小豆也，野生今下地亦種之，小科細粒，葉如葛，霜後熟，可蒸食，甘溫無毒，炒焦黑熟，投酒中，治產後冷血。

赤小豆按廣雅云：小豆荅也。統而名之也。齊民要術云：小豆有綠赤白三種。疇豆、荅豆、蠶豆、留豆，亦其類也。今照本草分別於後。

原赤小豆一名赤豆，一名紅豆，處處種之，夏至後下種，苗高尺許，葉本大末尖，至秋開花，淡銀褐色，有腐氣，莢長二三寸，比綠豆莢稍大，色微白帶紅，三青二黃時卽收之，可煮可炒，可粥飯，可作麪食餡，並良久服，則津血滲洩，令人肌瘦身重，合魚鮮食，成消渴，其稍大而鮮紅淡紅者，止可食用，色赤黯而粒緊小者。

入藥甘酸平無毒。心之穀也。性下行能入陰分。行津液。利小便。消脹除腫。止吐。治下痢腸澼。解酒病。除寒熱。排膿散血。通乳汁。下胞衣。利產難。水氣脚氣最爲急需。花名赤腐婢。解酒毒。明目下水。治小兒丹毒。葉去煩熱。煮食明目。

薦考原【吳志趙達傳】達治九宮一算之術。使人取小豆數升。播之席上。立處其數。驗覆果信。【晉書郭璞傳】璞至廬江。愛主人婢。無由而得。乃取小豆三升。繞主人舍散之。主人晨見赤衣人數千圍其家。就視則滅。甚惡之。請璞爲卦。璞曰。君家不宜畜此婢。可於東南三十里賣之。慎勿爭價。則此祟可除。主人從之。【歲時雜記】共工氏有不才子。以冬至日死。爲疫鬼。畏赤豆。故是日作赤豆粥厭之。【田家五行】十二月二十五日夜煮赤豆粥。大小人口皆食之。在外之人亦留分以俟其歸。謂之口數粥。亦驅瘟鬼之意。

別錄增【齊民要術】赤豆三月種。六月旋摘。遲者四月種亦可。宜稀稠得所。太密不實。

綠豆

原綠豆。本草云。綠以色。圓小者佳。大者名植豆。功用頗同。四月下種。苗高尺許。葉小而有毛。至秋開小白花。莢長二三寸。比赤豆莢微小。有二種。粒麤而色鮮者爲官綠。又名明綠。皮薄粉多。粒小而色暗者爲油綠。又名灰綠。皮厚粉少。早種者名摘綠。可頻摘也。遲種者名拔綠。一拔而已。其用甚廣。可作豆粥。豆飯。豆

酒燜食炒食水泡磨爲粉澄濾作餅蒸糕盪皮壓索爲食中要物亦可喂牲畜真濟世良穀也性甘寒無毒肉平皮寒用宜連皮解金石砒霜草木一切諸毒生研新汲水服反榧子殼害人合鯉魚鮮食久則令人肝黃成渴病花及芽解酒毒莢治赤痢

策考【增】**湘山野錄**真宗深念稼穡聞古城稻耐旱西天菉豆子多而粒大各遣使以珍貨求其種占城得種二十石至今在處播之西天中印土得菉豆種二石不知今之菉豆是否始植於後苑秋成日宣近臣嘗之仍賜占稻及西天菉豆御詩【孫公談圃】張文定嘗苦脚疾無藥可療一日遊相國寺有賣藥者得菉豆兩粒服之遂愈原唐公之夔號抱一西粵人也言其地無綠豆每承舍入京包中止帶斗餘多則至某江輒遇風浪不能渡到彼中比於藥物凡患時疾者用等秤買一家煮豆香味四達兩鄰對門患病人聞其氣輒愈

別錄原【種植】綠豆宜刈了麻地上種之太早不生莢若其年李不蛀則豆有收忌卯日下種
樹書【種菉豆地宜瘦四月種六月收子再種八月又收
原【製用】豆蘊先取濕沙納甕器中以綠豆勻撒其上如種藝法深桶覆藏室中勿令見風日一次掬水灑透俟其苗長可尺許摘取蟹眼湯綽過以料蘊供之赤豆亦可然不如綠豆之佳

白豆

原白豆一名飯豆。小豆之白者也。亦有土黃色者。大如綠豆而差長。粥飯皆可用。四五月種。苗葉似赤小豆而微尖嫩者可作菜。亦可生食。味甘平。調中補五臟。暖腸胃。腎之穀也。腎病宜食。浙東一種。味更勝。作醬作腐極佳。北方水白豆相似而不及。

增本草一種蓑豆葉如大豆亦其類也。

豌豆

原豌豆本草綱目云其苗柔弱宛宛故得豌名豌舊作躉音列以戎菽偏布於天下一名畢豆崔寔月令作蹕豆廣雅作蹕豆又名曰留豆一名胡豆本草經云張騫使外國得胡豆種一名戎菽爾雅云戎菽謂之莊菽注云即胡豆管子云桓公伐山戎一名回鶻唐書云畢豆出回鶻地飲膳一名淮豆農書云俗呼豌豆大者爲淮豆一名國豆鄭中記云石勒改爲國豆種出西戎北土甚多八九月下種亦有春種者蔓生有鬚葉似蒺藜葉兩兩相對嫩時可食三四月開小花如蛾形淡紫色結莢形圓長寸許子圓如藥丸嫩時可煮食老則可炒食可作麵食餡磨粉麵甚白而細膩出西戎者大如杏仁百穀之中最爲先熟又耐久藏宜多種可和醬作澆豆去黴點令面光澤亦可喂馬性甘平無毒調營衛平氣益中治消渴淡煮食之良煮食殺鬼毒心病下乳汁研末塗癰痘瘡

集蘿狀增唐陸贊請依京兆所請折納事狀京兆府先奏當管蟲食豌豆全然不收請據數折納大豆奉勅宜依度支續奏稱據時估豌豆每斗七十價已上大豆每斗三十價已下京兆府所請將大豆替豌豆望令各據估計錢數折納則冀免損官司者求瘼救災國之令典求瘼在知其所患救災在恤其所

無只如螟蜮爲殃，豌豆全損。檢覆若非虛謬，地稅固合免徵。直道而行，大體斯在。司府折納充數，已爲尅下從權。度支準估計錢，乃是幸災規利所得，無幾。其傷實多，傷風得財，非謂理道。且豌豆爲物，入用甚微。舊例所支，唯充畜料準數，廻給大豆。諸司誰曰不然？計價剩徵，義將安在？理無所據，事不可從。望依前勅處分，未審可否。

別錄增【農政全書】玄扈先生曰：豌豆與蠶豆各種，蠶豆之利倍於豌十倍。其耐陳則一也。

蠶豆以下四種原列蔬譜

蠶豆今從本草移入於此。
原蠶豆一名胡豆。本草綱目云：豆英狀如老蠶，故名。王禎農書謂其蠶時始熟，故名。亦通。吳瑞本草以此
蠶使外國得胡豆爲碗豆誤矣。此種豆亦自西胡來，雖與豌豆同名，同時種，而形性迥別。太平御覽云：張
呼此爲胡豆，而碗豆不復名胡豆矣。今蜀人呼此爲胡豆。南北皆有，蜀中尤多。八月下種，冬生嫩苗，可茹。莖方而肥，中空葉
狀如匙。頭圓而下尖，面綠，背白，柔厚。一枝三葉。二月開花，如蛾狀，紫白色。結莢連綴。蜀人收其子備荒，性
甘微辛，平無毒，快胃和臟腑，解酒毒，誤吞金銀等物者，用之皆效。

興蘿【七言律詩】**增**宋楊萬里招陳益之李兼濟二主管小酌，益之指蠶豆云：未有賦者，戲作七言。【翠
英中排淺碧珠甘，欺崖蜜輞欺酥沙。瓶新熟西湖水，漆樞分嘗曉露腴。味與櫻梅三益友，名因蠶蘿一絲
絢。老夫稼圃方雙學，譜入詩中當稼書。】

別錄增【農桑通訣】蠶豆百穀之中，最爲先登。【農政全書】玄扈先生曰：蠶豆種花田中，冬天不拔，花

積用以拒霜至清明後拔之。蠶豆八月初種臘月宜厚壅之此種極救農家之急且蝗所不食。

豇豆

原豇豆一名蔴藪音絳雙本草綱目云此豆紅色居多莢必雙處處有之生故有豇蔴藪之名廣雅指爲胡豆誤矣。處處有之穀雨前後下種者六月子便可種一年可兩收四月種者七八月收一種蔓長丈餘一種蔓短懸架則蕃鋪地則不甚旺宜灰壅其葉俱本大末尖嫩時可茹其花有紅白二色莢有白紅紫赤斑駁數色長者至二尺生必兩兩並垂有習坎之義子微曲如人腎形所謂豆爲腎穀者宜以此當之性甘鹹無毒理中益氣補腎健胃和五臟調營衛生精髓止消渴吐逆泄痢小便數與諸疾無禁但水腫忌補腎不宜多食此豆嫩時充菜老則收子可穀可果可菜取用最多豆中上品也。

別錄原【本草】昔盧廉夫教人補腎氣每日空心煮豇豆入少鹽食之大有益。【袖珍方】中鼠莽毒者以豇豆汁飲卽解欲試者先刈鼠莽苗以汁潑之便根爛不生此則物理然也。

附 黎豆

原黎豆一名狸豆一名黎沙一名獵沙今注見古爾雅云擗虎桑注云今虎豆江東即狸豆也古人謂藤爲桑後人訛桑爲狸矣又云黎黑色也此豆英老則黑有毛露筋如虎刺指爪其子亦有點如虎狸之斑煮之汁黑故有諸名野生山中人亦有種之者三月下種生蔓葉如豇豆但文理偏斜六七月開花成簇紫色狀如扁豆花一枝結莢十餘長三四寸大如

拇指有白茸毛。老則黑而露筋。宛如乾熊指爪之狀。其子大如刀豆。淡紫色。有斑點。如狸文。煮去黑汁。同豬雞肉再煮食。味乃佳。

附
錄馬豆

增【古今注】馬豆一名馬沙似虎豆而小實大如指亦可食也。

翼考增【雲仙散錄】品物類聚曰。白馬豆食之齒醉。虢國夫人廚吏鄧連以洗豆皮作靈沙臘供翠鴛堂。

蘿豆

原蘿豆一名沿籬豆。一名蛾眉豆。本草云。蕓本作扁。英形扁也。沿籬蔓延也。蛾眉象豆脊白路之形也。二月種蔓生。人家多種之籬邊。或以竹木架起。每叉三枝。一居頂二對生。一枝三葉。亦一居頂二對生。葉大如杯圓而有尖花。有紫白二色。狀如小蛾。有翅尾形。莢生花下。花卸而莢現。及老長寸餘。有青白二色。形凡十餘樣。或長或圓。或如龍爪虎爪。或如豬耳刀鏟。種種不同。皆纍纍成枝。一枝十餘莢成穗。白露後實更繁衍。子有黑白赤斑四色。本草經云。黑者名鵠豆。蓋以其間有白道如鵠羽也。每莢子或一或二三。一種莢硬不堪食。惟豆子蟲圓而色白者可入藥。微炒用。氣味甘微。溫無毒。和中下氣。消暑暖脾胃。除濕熱。止消渴。解酒毒。河豚魚毒一切草木毒。

集解增【明王伯稠涼生豆花】豆花初放晚涼淒碧葉陰中絡緯噦噦與鄰翁棚底話不知新月照清溪。別錄原【月令廣義】芒種前扁豆開花主水。
【種植】清明下種。以草灰蓋之。不用土覆。芽長分栽搭棚。

引上。增【農政全書】玄扈先生曰：以口向上種之，粒粒出。若扁種十不出一，蓋豆瓣重頂土不起故也。

刀豆

圓刀豆一名挾劍豆。拾遺記云：樂浪之東有融澤，有挾劍豆，其莢形似人挾劍橫斜而生，即此。人家多種之。蔓引一二丈，葉如豇豆葉而稍長。五六七月開紫花，結莢長者近尺，微似阜莢扁而劍脊三稜，嫩青煮食，醬醃蜜煎皆佳。老則微黑子大如拇指，頂淡紅色，同雞豬肉煮食甚美。氣味甘平無毒，溫中下氣利腸止飢逆，益腎補元。

別錄原【本草綱目】一人病後飢逆不止，聲聞鄰家，或令取刀豆燒存性，白湯調服二錢即止。此亦取其

下氣歸元而逆自止也。【種植】將地鋤鬆深半尺，熟糞拌勻。清明時先用布濕微水潤豆令脹，將見芽鋤前土作穴，每穴一粒，側放入不可深。此豆體重，深則難出。上用鋸末拌土薄蓋一層。一云用草灰日日澆令濕，俟生蔓，竹木架起。

大靈豆

增【貴耳錄】大靈豆華山陳搏有靈豆服一粒四十九日不饑，筋力如故。顏色若嬰兒，世罕得服之者。

木豆

增【交州記】木豆出徐僮間，子美似烏頭，大葉似柳。一年種，數年採。

靈光豆