

offcn 中公·事业单位 严格依据江苏省事业单位招聘考试大纲编写

江苏省事业单位

(省、市、县、乡) 公开招聘工作人员考试专用教材

护理学专业知识

李永新◎主编

中公教育江苏医疗卫生系统考试研究院◎审定

2014 最新版

权威·专业·高效·实用



- ✓ 一个会员账号，备考资料视频**无限学**
- ✓ 一张现金支票，凭此书报班**立减50元**

兴界图书出版公司

offcn 中公·事业单位
给人改变未来的力量

严格依据江苏省事业单位招聘考试大纲编写

2014 / 最新版

权威·专业·高效·实用

江苏省事业单位公开招聘工作人员考试专用教材

护理学专业知识

李永新 主编

中公教育江苏医疗卫生系统考试研究院 审定

世界图书出版公司

图书在版编目(CIP)数据

护理学专业知识 / 李永新编. —北京: 世界图书出版公司北京公司, 2013.12

江苏省事业单位公开招聘工作人员考试专用教材

ISBN 978-7-5100-7225-3

I. ①护… II. ①李… III. ①护理学-医药卫生人员-聘用-资格考试-教材 IV. ①R47

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 289521 号

江苏省事业单位公开招聘工作人员考试专用教材·护理学专业知识

主 编: 李永新

责任编辑: 夏 丹 张保珠

装帧设计: 中公教育设计中心

出 版: 世界图书出版公司北京公司

出 版 人: 张跃明

发 行: 世界图书出版公司北京公司

(地址: 北京朝内大街 137 号 邮编: 100010 电话: 64077922)

销 售: 各地新华书店

印 刷: 三河市华东印刷装订厂

开 本: 850 mm×1168 mm 1/16

印 张: 30.5

字 数: 732 千

版 次: 2014 年 2 月第 1 版 2014 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5100-7225-3

定 价: 48.00 元

版权所有 翻印必究

江苏省事业单位公开招聘工作人员考试《护理学专业知识》**应试攻略**

《事业单位公开招聘人员暂行规定》规定,自2006年1月1日起,事业单位新进人员,除国家政策性安置、按干部人事管理权限由上级任命及涉密岗位等确需使用其他方法选拔任用的人员外,都要实行公开招聘。公开招聘由用人单位根据招聘岗位的任职条件及要求,采取考试、考核的方法进行。考试内容为招聘岗位所必需的专业知识、业务能力和工作技能。考试科目与方式根据行业、专业及岗位特点决定。

通过对江苏省各地区招聘考试的情况分析,我们发现《护理学专业知识》的考试已经成为医院护士招聘考试必考和常规考试的科目。护理学专业知识主要是护理专业的考生学习的一些主干课程,主要考查考生对护理基础知识的掌握情况。为帮助广大考生在短期内高效、便捷、准确地把握考试的基本特点,中公教育集团一线专家通过对近年江苏省各地区事业单位考试真题的分析和研究,总结出事业单位考试《护理学专业知识》的命题规律和发展趋势。

考试特点

一、基础护理学

基础护理学不仅是所有护理类招聘考试的必考科目,而且在考试中占有绝对重要的地位,同时,在考核到内、外、妇产、儿科重要疾病的护理措施时,也会考查到基础护理学的知识。考试基本上每章都有涉及,重点为生命体征、给药、静脉输液与输血、危重患者的抢救与护理等。

例:【单选题】患者,女性,52岁,因“风湿性二尖瓣狭窄、心房颤动”入院。患者心律极不规则,心音强弱不等。护士为其测量心律和脉搏,方法是()。

- A.一名护士先测心率,后测脉率
- B.一名护士先测脉率,后测心率
- C.两名护士同时测量,一人听心率,另一人测脉率
- D.两名护士分别测脉率和心率,取平均值
- E.两名护士分别测量心率和脉率3次,取平均值

【答案】C。

【解析】脉搏短绌是指在单位时间内脉搏少于心率,听诊时心律完全不规则,多见于房颤。测量心率时需两名护士同时测量,一人测脉搏,一人测心率,由听心率者发出口令,计数一分钟。

例:【单选题】在输血过程中患者主诉头部胀痛,四肢麻木,胸闷,腰背剧痛,护理体检:脉搏细弱较快,血压下降。首先应考虑()。

- A.发热反应
- B.过敏反应
- C.肺水肿
- D.溶血反应
- E.出血倾向

【答案】D。

【解析】溶血反应过程分三个阶段:①开始阶段:血浆中的凝集素和所输血中红细胞的凝集原发生凝集反应,导致红细胞凝集成团,阻塞部分小血管,从而造成组织缺血缺氧。病人表现为头部胀痛、四肢麻木、胸闷、腰背部剧烈疼痛等。②中间阶段:凝集的红细胞发生溶解,大量的血红蛋白散布到血浆中,病人发现黄疸和血红蛋白尿(酱油色),并有寒战、高热、呼吸急促、血压下降等。③最后阶段:大量血红蛋白从血浆进入肾小管,遇到酸性物质变成结晶体,从而阻塞肾小管。病人急性肾衰,表现为少尿、无尿,严重者可致死亡。从题干的描述可判断该患者出现了溶血反应。

例:【单选题】用吸痰管进行气管内吸痰,正确方法是()。

- A.自上而下抽吸
- B.自下而上抽吸
- C.左右旋转向上提吸
- D.上下移动导管进行抽吸
- E.上下移动进行抽吸

【答案】C。

【解析】吸痰时,吸痰管应自下慢慢上提,并左右旋转,以吸净痰液。防止固定一处或上下提插吸引而损伤粘膜。

二、内科护理学

内科护理学是考查的重点科目,涉及内容较多,可以结合其他科目出题,而且试题难度稍大,重点为消化系统、循环系统、泌尿系统、呼吸系统、神经系统等。

例:【单选题】肝性脑病患者不应该给予的治疗是()。

- A.肥皂水灌肠
- B.静脉注射葡萄糖
- C.给予谷氨酸或谷氨酸钠
- D.静脉点滴精氨酸
- E.鼻饲 50%硫酸镁

【答案】A。

【解析】肝性脑病患者禁用肥皂水灌肠,因其可使肠腔内呈碱性,使氨离子弥散入肠黏膜进入血液循环至脑组织,使肝性脑病加重。

例:【单选题】急性肾炎水肿多由何处开始()。

- A.眼睑
- B.面部
- C.腰部
- D.胫前区
- E.踝部

【答案】A。

【解析】急性肾炎水肿主要为肾小球率过滤下降导致水钠潴留所引起,首先聚集在肌肉组织比较疏松的部分,多表现为晨起眼睑水肿。

例:【单选题】脑出血和脑梗死最主要的鉴别点是()。

- A.发病年龄
- B.既往病史
- C.起病的速度及状态
- D.是否伴有头痛、呕吐、嗜睡等全脑症状
- E.发病患者性别

【答案】B。

【解析】脑出血大多数在情绪激动或过分兴奋、劳累、用力排便或脑力紧张活动时发病,突然起病,表现为剧烈头痛、头晕、呕吐,迅速出现意识障碍、昏迷等。脑梗死多在睡眠或安静等血流缓慢、血压降低的情况下发生,次晨发现不能说话,一侧肢体瘫痪。

三、外科护理学

外科护理学主要围绕着麻醉前后、手术前后的护理,以及外科重要疾病的病因病理、临床表现与并发症、治疗与护理等内容展开,重点在于麻醉手术、损伤感染、骨科、普外等。

例:【单选题】各种休克共同病理生理变化是()。

- A.心脏射出血量减少
- B.血管张力降低
- C.有效循环血量锐减
- D.血浆容量减少
- E.血液粘稠度下降

【答案】C。

【解析】虽然导致各种休克的原因不同,在各自发生发展过程中都各有特点,但微循环障碍(缺血、淤血、播散性血管内凝血)致微循环动脉血灌注不足,重要的生命器官因缺氧而发生功能和代谢障碍,是它们的共同规律。

例:【单选题】患者,女性,30岁,车祸后,腹部有少量肠管脱出,下列现场的处理正确的是()。

- A.给予立即回纳并包扎
- B.送回腹腔
- C.现场找块清洁纱布覆盖
- D.不作处理
- E.用盐水冲洗后送回腹腔

【答案】C。

【解析】腹部开放性损伤伴肠管脱出,不可将肠管还纳入腹腔,因为会加重感染;不可加压包扎,因为会挤压肠管,影响血供;敞开伤口亦不可取,加重感染同时极易损伤肠道组织。应现场找纱布覆盖尽快转运医院。

例:【单选题】某患者在胃大部分切除术后15天,饮加糖牛奶20分钟后,出现上腹部不适,恶心呕吐,并心悸,出冷汗,最有可能发生()。

- A.低血糖综合症
- B.早期倾倒综合症
- C.反流性胃炎
- D.术后出血
- E.吻合口瘘

【答案】B。

【解析】倾倒综合征系是由于胃大部分切除术后,失去对胃排空的控制,导致胃排空过快所产生的一系列综合征。根据进食后症状出现的时间可分为早期与晚期两种。早期倾倒综合征多发生在进食后半小时内,晚期倾倒综合征多为餐后2~4小时发生,又称为低血糖综合征。

四、妇产科护理学

妇产科护理学由妇科护理学、产科护理学两大部分组成,产科重点为妊娠期、分娩期、产褥期以及各期并发症的护理;妇科重点为女性生殖系统炎症、妊娠滋养细胞疾病、腹部手术的护理等内容。

例:【单选题】产妇在产后第1天的生命体征变化是()。

- A.体温↑脉搏↑呼吸↓血压↓
- B.体温↑脉搏↑呼吸↑血压↑
- C.体温↑脉搏↑呼吸↑血压↓
- D.体温↑脉搏↓呼吸↓血压正常
- E.体温↓脉搏↑呼吸↑血压正常

【答案】D。

【解析】产妇产后24小时内体温略有升高,但一般不超过38℃;产后脉搏在正常范围内略缓慢,约60~70次/分;产后呼吸深而慢,约14~16次/分;血压一般无变化。

例:【单选题】患者,32岁,已婚,放节育环3年,停经48天,阴道少量出血3天,突然右下腹剧烈撕

裂样疼痛,检查:血压 80/40 mmHg,右下腹压痛,反跳痛明显,但肌紧张不明显。妇科检查:后穹窿饱满,宫颈举痛(+),宫口闭,子宫正常大小呈漂浮感,双附件触诊不满意。本病例最可能的诊断是()。

- A.急性阑尾炎
- B.黄体破裂
- C.卵巢囊肿扭转
- D.输卵管妊娠
- E.先兆流产

【答案】D。

【解析】输卵管妊娠的主要症状是停经、腹痛、阴道流血,未发生流产或破裂前,常表现为一侧下腹隐痛或酸胀感;输卵管妊娠流产或破裂时,患者突感一侧下腹撕裂样疼痛。胚胎死亡后,常有不规则阴道流血,一般不超过月经量。根据题干的描述,符合输卵管妊娠的表现。

例:【多选题】绒毛可继发于()。

- A.子宫肌瘤恶变后
- B.葡萄胎后
- C.流产后
- D.足月产后
- E.避孕后

【答案】BCD。

【解析】绒毛病史临床上常有葡萄胎、流产或足月产后。

五、儿科护理学

儿科护理学重点考查新生儿及新生儿疾病、营养性疾病、消化系统、血液系统、循环系统、常见小儿急症的护理等。

例:【单选题】患儿,日龄 3 天,上颚中线和牙龈部有黄白色斑点,即“马牙”,护士应护理的方法是()。

- A.切开
- B.用软布擦净
- C.生理盐水清洗
- D.不需要处理,可自行消失
- E.2%碳酸氢钠溶液清洗

【答案】D。

【解析】新生儿上颚中线和齿龈切缘上常有黄白色小斑点,民间称“马牙”,是上皮细胞堆积或黏液腺分泌物积留所致,又称“上皮珠”,数周后可自然消失,不需处理。

例:【单选题】新生儿出生后 2~3 天应接种()。

- A.麻疹减毒活疫苗
- B.百日咳菌苗、白喉、破伤风类毒素混合制剂
- C.卡介苗
- D.脊髓灰质炎疫苗
- E.麻疹疫苗

【答案】C。

【解析】出生 2~3 天应第一次接种乙肝疫苗,基础免疫接种时间可用口诀记忆:出生乙肝卡介苗,二月脊髓炎正好,三四月百白破,八月麻疹岁乙脑。

例:【单选题】预防上呼吸道感染患儿发生惊厥的主要措施是()。

- A.保持安静、减少刺激
- B.按医嘱应用抗生素
- C.按医嘱应用镇静剂
- D.积极控制体温
- E.密切观察及时发现惊厥前兆

【答案】D。

【解析】热性惊厥是儿童时期最常见的惊厥性疾病,多发生于上呼吸道感染感染的初期,体温骤升

至 38.5~40℃。及时控制体温是预防惊厥的关键。

考试指南

针对江苏省各地事业单位护理学专业知识的考试情况,我们建议考生从以下四个方面来着手进行复习备考:

1. 研读公告及真题,熟知考试内容。

一般公告中会告知考试内容或考试范围,但是一般来说公告中规定考试内容比较广泛,例如 2013 年下半年扬州市宝应县卫生局招聘公告中提及笔试“主要考核考生专业基础知识,考试以闭卷的形式进行”。而且考试一般不指定大纲和复习教材。这时,建议考生研读近年来考试真题,从中分析具体考试范围与考试重难点。

2. 结合自身情况,制定合理可行的复习计划。

由于事业单位护理考试内容较多,而通常复习时间相对来说较少。建议考生在复习之前先给自己一个定位,客观的评估自己对知识的掌控情况,了解自己哪个部分掌握较好,哪个部分比较薄弱。再结合可利用的时间,个人的学习能力制定出阶段性的复习计划。在备考时分阶段学习,合理分配时间,按计划复习。

3. 知识点复习与习题模拟训练相结合。

护理学知识很多是记忆型知识点,记忆不准确,是很难得出正确答案的。想要在考试中获胜,做题也是必不可少的。练习做题不仅可以全面熟悉考试内容、形式、结构、流程,而且可以从实践中摸索和总结作答技巧。考生在做真题的基础上,可以辅之以质量较高的模拟题。在做题的过程中巩固记忆。

4. 注重临床实践,复习护理三基三严操作。

护理学是一门实践性很强的学科,考试也特别注重与临床的结合,操作是护理学的重点难点。考虑到我们考试初试以笔试为主的性质,直接考察流程的极少,多为考核重点数据、注意事项及操作细节。考生在复习操作时,就可以略读繁琐的操作步骤,主要把握涉及的敏感数据、注意事项与操作细节,这样复习起来就事半功倍了。

2013年4月13日江苏卫生厅直属事业单位卫生类 《护理学专业知识》真题

以下每道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 支气管扩张最常见的原因是()。
A. 肺部肿瘤压迫
B. 肺囊性纤维化
C. 继发性肺结核
D. 呼吸系统感染
E. 先天性软骨缺乏症
2. 用于早期食管癌普查的方法是()。
A. CT 检查
B. 食管镜检查
C. X 线钡餐检查
D. 食管拉网检查
E. 癌胚抗原检查
3. 成人门齿距离食管的起点约()。
A. 5 cm
B. 10 cm
C. 15 cm
D. 20 cm
E. 25 cm
4. 有关获得性免疫缺陷综合征的治疗是()。
A. 首选青霉素
B. 首选第二代头孢菌素
C. 首选氟尿嘧啶
D. 可用换血疗法
E. 目前尚无特效药
5. 中毒型细菌性痢疾的传播途径是()。
A. 血液
B. 消化道
C. 呼吸道
D. 皮肤接触
E. 昆虫媒介
6. 胆道 T 管引流期间,观察胆汁性状正常的是()。
A. 胆汁稀薄且颜色淡黄
B. 胆汁清晰呈棕黄色
C. 胆汁混有泥沙样沉淀
D. 胆汁混浊呈淡黄色
E. 胆汁黄色有絮状沉淀
7. 预防手术后切口裂开应除外()。
A. 手术前后加强营养支持
B. 手术时延长拆线时间
C. 强行缝合切口
D. 切口外应用腹带包扎
E. 切口使用减张缝线
8. 风湿性心脏病根本的治疗措施是()。
A. 抗感染
B. 抗心衰
C. 抗风湿
D. 外科手术
E. 介入治疗

9.判断身材矮小的标准为()。

- A.身高低于同种族、同性别、同年龄均值以下 1 个标准差
- B.身高低于同种族、同性别、同年龄均值以下 2 个标准差
- C.身高低于同种族、同性别、同年龄均值以下 3 个标准差
- D.身高低于同种族、同性别、同年龄均值以下 4 个标准差
- E.身高低于同种族、同性别、同年龄均值以下 5 个标准差

10.细胞外液的主要阳离子是()。

- A.Na⁺
- B.K⁺
- C.Ca²⁺
- D.Mg²⁺
- E.H⁺

11.绞窄性疝和嵌顿性疝的区别主要是在于()。

- A.腹部突起包块的形状
- B.疝内容能够回纳
- C.有无肠梗阻的表现
- D.疝块有无压痛
- E.疝内容物有无血液循环障碍

12.急性腹膜炎提示病情恶化的重要指征是()。

- A.腹胀加重
- B.腹痛加重
- C.呕吐频繁
- D.肛门停止排气
- E.肠鸣音亢进

13.支气管扩张症大咯血时,常用的止血药物是()。

- A.氨基己酸
- B.垂体后叶素
- C.酚磺乙胺(止血敏)
- D.卡络磺钠(安络血)
- E.甲胺苯酸(止血芳酸)

14.营养性缺铁性贫血患儿服用铁剂的正确方法是()。

- A.饭前服用
- B.饭后服用
- C.两餐之间服用
- D.可与牛奶同服
- E.可与辅食同服

15.结核病的传染性最大的是()。

- A.原发型肺结核
- B.浸润性肺结核
- C.慢性纤维空洞性肺结核
- D.活动性肺结核
- E.血行播散型肺结核

16.符合短暂性脑缺血发作的是()。

- A.持续时间不超过 3 周
- B.持续时间不超过 1 周
- C.持续时间不超过 2 天
- D.持续时间不超过 24 h
- E.持续时间不超过 1 h

17.出院病人的护理,正确的是()。

- A.病情好转后通知病人办理出院手续
- B.如需继续服药可让病人到药房领取
- C.用红笔在遗嘱上填写出院时间
- D.床垫、被褥在日光下曝晒 3 h
- E.征求病人和家属的意见

18.急性上呼吸道感染病室内相对湿度宜维持在()。

- A.30%~35%
- B.35%~40%
- C.40%~45%
- D.45%~50%
- E.50%~60%

- 19.表示“临睡前给药”的外文缩写是()。
- A.hs B.ac C.st D.sos
E.pc
- 20.术后早期出现恶心、呕吐的常见原因为()。
- A.低钾血症 B.麻醉反应
C.颅内压增高 D.麻痹性肠梗阻
E.手术刺激内脏神经
- 21.护理病案的组成不包括()。
- A.医嘱执行单 B.护理记录单
C.病人入院护理评估单 D.住院病人护理评估单
E.病人出院护理评估单
- 22.及时倾倒吸痰储液瓶内的吸出液,不应超过瓶的()。
- A.1/3 B.1/2 C.2/3 D.3/5
E.3/4
- 23.世界卫生组织规定白天病区较理想的声音强度是()。
- A.25 dB~30 dB B.35 dB~40 dB C.45 dB~50 dB D.55 dB~60 dB
E.65 dB~70 dB
- 24.对肠胀气病人正确的护理措施是()。
- A.鼓励多喝豆浆 B.减少活动
C.协助更换体位 D.腹部冷敷
E.多食油炸食品
- 25.有关尿培养标本采集正确的是()。
- A.留取首段尿送检 B.标本在1小时内送检
C.用消毒剂清洗外阴部 D.宜在抗生素应用后收集标本
E.为得到尿液鼓励病人多饮水
- 26.血栓闭塞性脉管炎局部缺血期的症状是()。
- A.下肢溃疡 B.指端坏死
C.静息痛 D.间歇性跛行
E.足背动脉搏动消失
- 27.脑疝患者排便困难者错误的措施是()。
- A.高压大量灌肠 B.口服缓泻剂
C.低压小量灌肠 D.增加纤维素摄入
E.喂食蜂蜜
- 28.毕I式胃大部切除术,与残胃吻合的器官是()。
- A.上段空肠 B.下段空肠
C.下段回肠 D.上段回肠
E.十二指肠
- 29.导致外阴、阴道创伤的主要原因是()。
- A.分娩 B.外伤 C.初次性交 D.性生活粗暴
E.手术意外

30. 肛痿的治疗原则是()。

- A. 冷冻治疗
- B. 注射治疗
- C. 抗生素治疗及理疗
- D. 切开痿管, 重新缝合
- E. 切口痿管, 敞开创面

31. 慢性型特发性血小板减少性紫癜的易发人群是()。

- A. 儿童
- B. 青年女性
- C. 青年男性
- D. 老年男性
- E. 老年女性

32. 脑死亡的判断标准不包括()。

- A. 心电波消失
- B. 脑电波消失
- C. 自发呼吸停止
- D. 脑干反射消失
- E. 不可逆的深度昏迷

33. 胰岛素的作用是()。

- A. 代替胰岛 β 细胞
- B. 促进肝糖原消化
- C. 抑制肾小球滤过率
- D. 促进肾小管重吸收
- E. 促进组织对糖的利用

34. 胎盘剥离的征象不包括()。

- A. 宫底升高
- B. 少量阴道出血
- C. 外露的脐带自行延长
- D. 于耻骨联合上方压子宫下段, 脐带回缩
- E. 宫体变硬

35. 新生儿护理中, 不正确的方法是()。

- A. 喂乳后喂少量温开水清洗口腔
- B. 大便后用清水洗臀部, 以免发生臀红
- C. 上腭中线及牙龈边缘的黄白小点, 须挑割
- D. 皮肤褶皱处的胎脂宜轻轻擦去
- E. 为小儿洗澡时, 可用中性肥皂

36. 肝性脑病前驱期的主要表现是()。

- A. 浅昏迷
- B. 深昏迷
- C. 昏睡、神经错乱
- D. 轻度性格、行为异常
- E. 意识错乱、睡眠障碍

37. 关于慢性肾炎的治疗错误的是()。

- A. 低蛋白低磷饮食
- B. 选用肾毒性小的抗生素
- C. 降压治疗以钙离子拮抗剂首选
- D. 利尿消肿
- E. 长期服用血小板药物

38. 血管紧张素转换酶抑制剂能降低高血压的机制是()。

- A. 直接扩张血管
- B. 减少左室输出
- C. 促血中水分由肾脏排除
- D. 松弛小动脉壁平滑肌
- E. 抑制血管紧张素 II 的生成

39. 关于肾性水肿的护理措施, 正确的是()。

- A. 每日测量体重
- B. 隔日测量腹围
- C. 通常用速利尿尿
- D. 尽量不要变换体位
- E. 尿量增多时注意低血钾

51. 急性胃扩张的患者容易出现的酸碱平衡失调是()。

- A. 代谢性酸中毒
- B. 代谢性碱中毒
- C. 呼吸性酸中毒
- D. 呼吸性碱中毒
- E. 呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒

52. 肝性脑病患者的护理措施正确的是()。

- A. 给予高脂肪饮食以保证患者能量摄入
- B. 快速使用精氨酸降低血氨
- C. 失眠患者按常规给予安眠药物
- D. 便秘患者予以肥皂水灌肠
- E. 遵医嘱使用抗生素抑制肠道细菌生长

53. 多器官功能障碍中最常见的器官是()。

- A. 脑
- B. 肝
- C. 肺
- D. 肾
- E. 心

54. 用纯乳酸加等量水消毒病房,每立方米乳酸的量及消毒时间是()。

- A. 0.012 ml, 10~100 min
- B. 0.12 ml, 15~150 min
- C. 0.12 ml, 30~120 min
- D. 1.2 ml, 15~150 min
- E. 1.2 ml, 30~120 min

55. 肾病综合征病人宜选用的饮食是()。

- A. 高蛋白饮食
- B. 低蛋白饮食
- C. 低脂肪饮食
- D. 低胆固醇饮食
- E. 高膳食纤维饮食

56. 因颅内内容物体积增加而引起颅内压增高的是()。

- A. 脑积水
- B. 狭颅症
- C. 颅内肿瘤
- D. 颅内血肿
- E. 凹陷性骨折

57. 某孕妇,妊娠 34 周,因抬举重物后 3 小时出现不规则宫缩伴少量阴道流血,诊断为先兆早产收住院保胎,在护理中最佳的体位是()。

- A. 仰卧位
- B. 左侧卧位
- C. 右侧卧位
- C. 半卧坐位
- E. 臀高头低位

58. 初产妇,24 岁,因子宫收缩乏力发生滞产,经处理无效行剖宫产术。对该产妇术后 2 小时内的护理正确的是()。

- A. 了解产妇对剖宫产的心理感受
- B. 密切观察生命体征的变化
- C. 指导产妇进流质饮食
- D. 鼓励产妇勤翻身活动
- E. 指导产妇取半卧位

59. 患儿女,14 岁,阑尾炎,经治疗痊愈,整理衣服、水杯、书刊等个人物品准备出院,其出院护理适宜的是()。

- A. 病室开窗通风
- B. 书刊燃烧灭菌处理
- C. 枕芯日光曝晒 2 小时
- D. 水杯用酒精浸泡消毒后能带出
- E. 衣服用环氧乙烷灭菌后能带出

60.患者女,26岁,头发稀疏,面颊部蝶形红斑伴瘙痒感,反复口腔溃疡。抗 sm 抗体阳性。健康指导正确的是()。

- A.避免日光直射
B.使用碱性肥皂洗浴
C.避免温水湿敷红斑处
D.不宜用生理盐水漱口
E.可用化妆品遮盖面部红斑

61.患者女,因尿频、尿痛3天,白带增多呈脓性就诊;查体:外阴红肿,宫颈充血、水肿、有脓性分泌物。经细菌学检查为淋病,应告知患者治愈的标准是()。

- A.治疗结束后细菌学检查为阴性
B.治疗结束后1个月细菌学检查为阴性
C.治疗结束后每月复查连续2次细菌学检查为阴性
D.治疗结束后每月复查连续4次细菌学检查为阴性
E.治疗结束后每月复查连续4次细菌学检查为阴性

62.新生儿出生后4天皮肤巩膜黄染,以后逐渐加深,吃奶及反应均好。7天后黄疸开始减退,10天后消退。应考虑为()。

- A.生理性黄疸
B.病理性黄疸
C.感染性黄疸
D.新生儿肝炎
E.ABO 溶血

63.患者女,28岁,产后3周发热乳房胀痛,出现炎性肿块,有压痛,局部红肿,有波动感。此时局部处理正确的是()。

- A.热敷
B.按摩
C.切开引流
D.外敷中药
E.红外线辐射

64.患者女,50岁,右上腹疼痛1天,体温39℃,皮肤巩膜黄染,B超示胆总管结石,为警惕发生重症胆管炎,应注意观察()。

- A.体温
B.腹部体征
C.恶心、呕吐
D.血压、神志
E.白细胞计数

65.10个月患儿,因腹泻2天于12月5日入院。2天前曾患上呼吸道感染,大便为蛋花汤样,一日9次,精神尚好。大便镜检见大量脂肪球。诊断应考虑为()。

- A.大肠埃希菌肠炎
B.轮状病毒肠炎
C.金黄色葡萄球菌肠炎
D.细菌性痢疾
E.生理性腹泻

66.患者女,60岁,因肺癌晚期十分悲哀,情绪低落,消沉,有轻生念头。此时患者的心理反应阶段属于()。

- A.忧郁期
B.接受期
C.协议期
D.否认期
E.愤怒期

67.患者女,因皮肤过敏,护士遵医嘱给予10%葡萄糖酸钙10毫升稀释后静脉缓慢推注,在注射过程中感觉推药阻力大,抽无回血,可能的原因是()。

- A.压力过大
B.静脉痉挛
C.药液粘稠
D.针头阻塞
E.针头滑出血管外

68. 患者女, 25 岁, 停经 8 周突然出现左下腹撕裂样腹痛, 有阴道少量流血, 阴道后窟窿穿刺抽出暗红不凝血。应首先考虑为()。

- A. 葡萄胎 B. 异位妊娠 C. 先兆流产 D. 难免流产
E. 卵巢囊肿蒂扭转

69. 初产妇, 26 岁, 停经 38 周, 临产 18 小时, 宫缩间歇 7~8 分钟, 持续约 20 秒, 宫口开大 2 cm, 无头盆不称, 最可能发生了()。

- A. 正常产程 B. 协调性宫缩乏力
C. 协调性宫缩过强 D. 不协调性宫缩乏力
E. 不协调性宫缩过强

70. 女, 妊娠 39 周, 第二产程初期听胎心为 110 次/分, 胎心监护偶见晚期减速, 顺娩一婴儿, 生后 1 分钟 Apgar 评分为 3 分, 诊断为重度窒息。引起该状况最可能的原因是()。

- A. 产力过强 B. 产道狭窄
C. 药物因素 D. 胎儿窘迫
E. 孕妇紧张

71. 患者女, 38 岁, 四肢大小关节肿痛, 诊断为类风湿关节炎 12 年, 随诊 X 线示双手指关节及腕关节有多处骨质破坏, 关节检查仍有多个关节肿痛, 脾肋下 2 cm 触及质中偏硬。实验室检查, WBC 为 $2 \times 10^9/L$, 血小板为 $60 \times 10^9/L$, ESR 为 56 mm/h, 尿常规(-), 10 年来一直服用非甾体抗炎药。护士应重点检查下列哪项药物不良反应的可能是()。

- A. 肝损害 B. 胃肠道反应
C. 骨髓抑制 D. 皮疹
E. 口腔炎

72. 患者男, 30 岁, 患肺炎链球菌性肺炎, 一周来体温波动在 39.5~40 °C 之间, 其热型是()。

- A. 稽留热 B. 弛张热
C. 间歇热 D. 回归热
E. 不规则热

73. 患者女, 32 岁, 因车祸发生脾破裂、开放性气胸、闭合性胫腓骨骨折。抢救时首先应()。

- A. 输血、输液 B. 固定骨折肢体
C. 镇静、止痛 D. 封闭胸壁伤口
E. 应用抗生素

74. 患者男, 35 岁, 因下肢水肿入院, 诊断慢性肾炎。则其尿液检查结果中必然出现()。

- A. 血尿 B. 菌尿
C. 管型尿 D. 脂肪尿
E. 蛋白尿

75. 患者男, 60 岁, 慢性支气管炎, 痰液黏稠不易咳出。按医嘱给予超声雾化吸入以稀释痰液, 操作正确的是()。

- A. 水槽内加入温水 B. 先开电源再开雾量
C. 雾化时间为 10 分钟 D. 雾化结束时先开电源
E. 结束后雾化罐浸泡消毒 30 分钟

76. 患者男, 78 岁, 生活不能自理, 为其床上擦浴应()。

- A. 调节室温在 18 °C 左右

- B.脱衣时,先脱近侧后脱远侧
 C.若有伤口,先脱患侧后脱健侧
 D.未达到按摩效果,擦洗力度宜重
 E.若患者出现面色苍白,应加快擦洗动作

77.患者男,68岁,因慢性心衰,需要服用地高辛,护士发药时在核对后应特别注意()。

- A.与病人沟通
 B.嘱病人饭后服药
 C.服药前测心率和脉搏
 D.注意发药到口
 E.服药后观察不良反应

78.将血压计放入甲醛箱内熏蒸消毒,在37%~40%甲醛中需要加入的氧化剂为()。

- A.乳酸钾
 B.乳酸钠
 C.氯化钾
 D.高锰酸钾
 E.氢氧化钾

79.患者男,38岁,因慢性痢疾住院,护士为患者进行保留灌肠常采用的体位是()。

- A.左侧卧位
 B.右侧卧位
 C.头高足低位
 D.头低足高位
 E.侧卧屈膝位

80.患者女,28岁,患类风湿性关节炎8年,经治疗关节肿痛减轻,但双侧腕、掌指关节强直、畸形、固定于屈位。护理措施错误的是()。

- A.注意休息
 B.关节制动
 C.热敷理疗
 D.遵医嘱用药
 E.关心理解患者

81.患者女,30岁,产后20天出现右侧乳房胀痛,全身寒战、发热、脉快。体检:39.1℃;右侧乳房皮肤红肿明显,可扪及一压痛性硬块,同侧腋窝淋巴结肿大并有触痛,明确诊断脓肿形成的检查是()。

- A.乳房X线平片
 B.穿刺抽出脓液
 C.乳房B超检查
 D.乳房红外线扫描
 E.乳房X线钼靶摄片

82.患者女,38岁,已婚。因葡萄胎清宫术后1年,阴道不规则出血伴咳嗽、血痰2周就诊,临床诊断为绒毛膜癌,予甲氨蝶呤治疗,最常见的不良反应是()。

- A.脱发
 B.骨髓移植
 C.口腔溃疡
 D.胃肠反应
 E.出血性膀胱炎

83.患者女,30岁,人流手术后反复左下腹疼痛,未避孕,2年未孕,月经规律,基础体温呈双相性,为明确不孕原因首选检查是()。

- A.排卵检测
 B.诊断性刮宫
 C.阴道镜检查
 D.宫腔镜检查
 E.输卵管通畅试验

84.患儿,6个月,因腹泻出现脱水,医嘱口服ORS液,现有氯化钠、碳酸氢钠、葡萄糖,按世界卫生组织推荐的配方还具有成分的是()。

- A.氯化钙
 B.乳酸钠
 C.氯化钾
 D.葡萄糖酸钙
 E.葡萄糖酸锌