


护理学专业 (主管护师)

同步精选题集与解析

卫生专业技术资格考试命题研究专家组 编写

让您用 **30%** 的时间 掌握 **80%** 的知识

- 紧扣考纲 精选真题 透视命题规律
- 同步练习 精心解析 指点解题技巧
- 模拟试卷 精编题库 把脉复习方向



多平台终端考试软件
人机对话

— 全国卫生专业技术资格考试用书 —

护理学专业(主管护师)

同步精选题集与解析

卫生专业技术资格考试命题研究专家组 编写

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书为全国卫生专业技术资格考试用书之一，书中根据护理学专业中级职称评定考核中的考点和题型要求，精选试题 2000 余道，按学科分章节整理并做全面解析。书中题型全面，题目针对性强，覆盖高频考点、重点、难点，有助于考生全面掌握考点内容。另外还附有两套模拟试卷，方便考生考前复习和自测，提高答题和应试能力，在短期内高效复习、一举过关。该书是参加 2015 年护理学专业（主管护师）职称考试读者的首选参考书。

图书在版编目 (CIP) 数据

护理学专业（主管护师）同步精选题集与解析/卫生专业技术资格考试研究专家组编写 . —北京：中国医药科技出版社，2015. 1

全国卫生专业技术资格考试用书

ISBN 978 - 7 - 5067 - 7166 - 5

I. ①护… II. ①卫… III. ①护理学 - 护士 - 资格考试 - 题解 IV. ①R47 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 278729 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行：010 - 62227427 邮购：010 - 62236938

网址 www. cmstp. com

规格 787 × 1092mm¹/₁₆

印张 23 1/2

字数 412 千字

版次 2015 年 1 月第 1 版

印次 2015 年 1 月第 1 次印刷


印刷 三河市百盛印装有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 7166 - 5

定价 58.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换



编 委 会

(按姓氏笔画排序)

王 嶙	王和平	韦 冠	包淑英
刘少梅	许 光	李 燕	张知非
周家莉	钟秀明	徐 娟	徐丽华
高 媛	黄发祥	傅 红	童微星
潘 燕			

编写说明

主管护师资格考试是卫生专业技术资格考试之一，属于一种职称考试。由人力资源和社会保障部、卫计委共同组织，卫计委人才交流中心负责报名、资格审核等全部考务工作。考试原则上每年进行一次，一般在5月中旬举行。护理学专业（主管护师）资格考试分4张卷，分别为基础知识卷、专业知识卷、相关专业知识卷和专业实践能力卷。每张试卷100题，全部为选择题，题型包括A1、A2、A3、A4、B1和X型题。考试内容包括基础护理学、内科护理学、外科护理学、妇产科护理学、儿科护理学、社区护理学和护理管理学等科目。

为了帮助胸怀梦想的你顺利地通过2015年的护师资格考试，我们根据最新版大纲的要求，结合多年从事考前辅导和基础教学工作的实践经验，编写了这本《护理学专业（主管护师）同步精选题集与解析》。

在本书编写过程中，我们对护理学专业（护师）资格考试的历年考题做了细致的梳理，针对不同的学科及其考点，分章节编排，并逐题做了精辟解析，有助于备考读者了解护士执业资格考试的基本要求，深入理解知识要点，熟悉解题思路。此外，在深入研究历年考题各部分内容比重基础上，按照新考纲要求编写了两套模拟试卷，题目考点覆盖面广，出题角度多样，具有很好的针对性；体例与实考试卷相同，答案编排便于查找，利于考生身临其境，有效备考。

相信本书定会为您的执业资格考试提供强大助力，助你一招制敌，一举过关！

编者
2014年12月

目录

第一篇 内科护理学	(1)
第一章 呼吸系统疾病病人的护理	(1)
第二章 循环系统疾病病人的护理	(10)
第三章 消化系统疾病病人的护理	(20)
第四章 泌尿系统疾病病人的护理	(29)
第五章 血液及造血系统疾病病人的护理	(37)
第六章 内分泌与代谢性疾病病人的护理	(44)
第七章 风湿免疫性疾病病人的护理	(51)
第八章 理化因素所致疾病病人的护理	(54)
第九章 消化系统疾病病人的护理	(57)
第十章 神经系统疾病病人的护理	(63)
第二篇 外科护理学	(70)
第一章 水、电解质、酸碱代谢失调病人的护理	(70)
第二章 外科休克病人的护理	(72)
第三章 多器官功能障碍综合征病人的护理	(74)
第四章 麻醉病人的护理	(76)
第五章 复苏	(77)
第六章 外科重症监护	(78)
第七章 外科围手术期护理	(79)
第八章 疼痛病人的护理	(81)
第九章 外科营养支持病人的护理	(81)
第十章 外科感染病人的护理	(82)
第十一章 损伤病人的护理	(83)
第十二章 器官移植病人的护理	(84)
第十三章 肿瘤病人的护理	(85)
第十四章 颈部疾病病人的护理	(85)

第十五章 乳房疾病病人的护理	(88)
第十六章 腹外疝病人的护理	(89)
第十七章 急性化脓性腹膜炎病人的护理	(90)
第十八章 腹部损伤病人的护理	(92)
第十九章 胃、十二指肠疾病病人的护理	(93)
第二十章 肠疾病病人的护理	(96)
第二十一章 直肠肛管疾病病人的护理	(99)
第二十二章 门静脉高压症病人的护理	(100)
第二十三章 肝脏疾病病人的护理	(102)
第二十四章 胆道疾病病人的护理	(103)
第二十五章 胰腺疾病病人的护理	(104)
第二十六章 外科急腹症病人的护理	(106)
第二十七章 周围血管疾病病人的护理	(107)
第二十八章 颅内压增高病人的护理	(108)
第二十九章 颅脑损伤病人的护理	(110)
第三十章 常见颅脑疾病病人的护理	(112)
第三十一章 胸部损伤病人的护理	(112)
第三十二章 胸腔病人的护理	(114)
第三十三章 肺部疾病外科治疗病人的护理	(115)
第三十四章 食管癌病人的护理	(116)
第三十五章 心脏疾病病人的护理	(117)
第三十六章 泌尿、男性生殖系统疾病的主要症状和检查	(117)
第三十七章 泌尿系损伤病人的护理	(119)
第三十八章 泌尿系结石病人的护理	(120)
第三十九章 泌尿、男性生殖系结核病人的护理	(121)
第四十章 泌尿系梗阻病人的护理	(122)
第四十一章 泌尿、男性生殖系肿瘤病人的护理	(123)
第四十二章 骨科病人的一般护理	(124)
第四十三章 骨与关节损伤病人的护理	(125)
第四十四章 骨与关节感染病人的护理	(128)
第四十五章 腰腿痛及颈肩痛病人的护理	(129)
第四十六章 骨肿瘤病人的护理	(130)
第三篇 妇产科护理学	(132)
第一章 女性生殖系统的解剖与生理	(132)
第二章 妊娠期妇女的护理	(134)

第三章 分娩期妇女的护理	(138)
第四章 产褥期妇女的护理	(141)
第五章 新生儿保健	(144)
第六章 高危妊娠妇女的护理	(145)
第七章 妊娠期并发症妇女的护理	(147)
第八章 妊娠期合并症妇女的护理	(151)
第九章 异常分娩的护理	(155)
第十章 分娩期并发症妇女的护理	(156)
第十一章 产后并发症妇女的护理	(158)
第十二章 遗传咨询与产前检查	(159)
第十三章 妇科护理病历	(160)
第十四章 女性生殖系统炎症病人的护理	(160)
第十五章 月经失调病人的护理	(164)
第十六章 妊娠滋养细胞疾病病人的护理	(168)
第十七章 妇科恶性肿瘤化疗病人的护理	(170)
第十八章 妇科腹部手术病人的护理	(171)
第十九章 外阴、阴道手术病人的护理	(176)
第二十章 不孕症妇女的护理	(178)
第二十一章 计划生育妇女的护理	(179)
第二十二章 妇女保健	(181)
第二十三章 妇产科常用护理技术	(182)
第二十四章 妇产科诊疗及手术病人的护理	(182)
第四篇 儿科护理学	(184)
第一章 生长发育	(184)
第二章 小儿保健	(187)
第三章 小儿营养与喂养	(188)
第四章 小儿心理、用药护理及护理技术	(190)
第五章 新生儿及新生儿疾病患儿的护理	(191)
第六章 营养性疾病患儿的护理	(194)
第七章 消化系统疾病患儿的护理	(196)
第八章 呼吸系统疾病患儿的护理	(199)
第九章 循环系统疾病患儿的护理	(201)
第十章 血液系统疾病患儿的护理	(203)
第十一章 泌尿系统疾病患儿的护理	(205)
第十二章 内分泌系统疾病患儿的护理	(208)

第十三章	神经系统疾病患儿的护理	(209)
第十四章	免疫缺陷病和结缔组织病患儿的护理	(211)
第十五章	遗传性疾病患儿的护理	(212)
第十六章	常见传染病患儿的护理	(213)
第十七章	结核病患儿的护理	(215)
第十八章	寄生虫病患儿的护理	(217)
第十九章	急性中毒和常见急症患儿的护理	(218)
第五篇	社区护理学	(220)
第一章	社区护理学概论	(220)
第二章	社区护理基本工作方法	(222)
第三章	社区家庭护理	(225)
第四章	社区重点人群保健	(228)
第五章	社区常见慢性疾病的护理与管理	(230)
第六章	社区常见精神疾病病人的护理与管理	(233)
第七章	社区常见传染病病人护理与管理	(235)
第八章	社区急重症病人的急救与转诊	(237)
第九章	社区病残者的康复护理	(239)
第十章	社区临终病人关怀与护理	(241)
第六篇	护理健康教育学	(242)
第一章	健康教育与健康促进	(242)
第二章	人类行为与健康相关行为	(243)
第三章	健康传播的方法与技巧	(244)
第四章	健康教育的步骤	(248)
第五章	医院健康教育	(250)
第七篇	医院感染护理学	(252)
第一章	医院感染护理学绪论	(252)
第二章	医院感染的微生物学原理	(253)
第三章	医院感染监测	(255)
第四章	消毒与灭菌	(256)
第五章	手、皮肤的清洁和消毒	(260)
第六章	医院环境的消毒	(261)
第七章	隔离与防护	(263)
第八章	合理使用抗感染药物	(265)
第九章	医院感染与护理管理	(268)
第十章	特殊病原菌的感染途径及消毒	(269)

第八篇 护理管理学	(272)
第一章 绪论	(272)
第二章 管理理论在护理管理中的应用	(272)
第三章 计划	(273)
第四章 组织工作	(275)
第五章 护理人力资源管理	(277)
第六章 领导工作	(278)
第七章 组织沟通	(281)
第八章 控制工作	(282)
第九章 护理质量管理	(282)
模拟试卷一	(285)
模拟试卷二	(326)

第一篇

内科护理学

第一章 呼吸系统疾病病人的护理

1. 下列关于库式呼吸困难的描述，正确的是
 - A. 呼吸表浅，频率较快
 - B. 呼吸变深，节律
 - C. 呼吸与呼吸暂停相交替
 - D. 呼吸急促，有屏气现象
 - E. 呼吸急促、快慢不一
2. 关于慢性支气管炎的描述，哪项错误
 - A. 指气管、支气管黏膜的慢性感染性炎症
 - B. 主要表现为咳嗽、咳痰或伴喘息
 - C. 常并发阻塞性肺气肿
 - D. 吸烟是其主要病因
 - E. 临床可分为单纯型、喘息型
3. 支气管哮喘的基础病变是
 - A. 气道高反应性慢性炎症
 - B. 气道不反应性慢性炎症
 - C. 气道低反应性慢性炎症
 - D. 气道不反应性急性炎症
 - E. 气道低反应性急性炎症
4. 患者，男性，28岁，检查发现器官向左侧移位，右侧胸廓饱满，触觉语颤减弱，叩诊浊音，应考虑最可能的原因是
 - A. 肺气肿
 - B. 气胸
 - C. 胸腔积液
 - D. 肺炎
 - E. 肺脓肿
5. 某人原有慢性阻塞性肺疾病，呼吸困难，发绀，近日咳嗽加剧，突然发生右侧胸痛，约30分钟后呼吸困难突然加剧，患侧胸壁叩诊呈鼓音，听诊呼吸音消失。该变化是
 - A. 自发性气胸
 - B. 肋间神经痛
 - C. 胸腔积液
 - D. 腹水
 - E. 肋骨骨折
6. 指导慢性阻塞性肺气肿患者做腹式呼吸时，吸气与呼气时间之比为
 - A. 1:1
 - B. 1:1.5

- C. 1:2 或 1:3
D. 2:1
E. 1.5:1
7. 患者，男性，55岁，咳嗽3年，每年冬季发作，每次持续3个月，有吸烟史，本例病情继续发展，最常见的并发症是
A. 肺部感染
B. 自发性气胸
C. 肺源性心脏病
D. 阻塞性肺气肿
E. 支气管哮喘
8. 肺炎链球菌肺炎出现铁锈色痰的主要原因是
A. 痰里有大量红细胞
B. 痰里混有大量肺泡巨噬细胞
C. 是纤维蛋白和红细胞结合的产物
D. 红细胞破坏后释放含铁血黄素
E. 痰里有大量血红蛋白
9. 气管切开后最重要的护理措施是
A. 清洁伤口
B. 湿化气道
C. 取半卧位
D. 重建沟通方式
E. 预防并发症
10. 气管内吸痰时，每次插管吸痰时间不宜超过
A. 5秒 B. 10秒
C. 15秒 D. 30秒
E. 1分钟
11. 关于医院获得性肺炎，哪项不正确
A. 多继发于有各种原发疾病的危重患者，治疗困难
B. 革兰阳性球菌所占比例最高，常为混合感染
C. 耐药细菌日益增多
- D. 一些非致病菌亦常导致医院获得性肺炎
E. 在医院内感染的肺炎
12. 关于肺炎链球菌肺炎，下列哪项错误
A. 可表现为大叶性肺炎或小叶性肺炎
B. 一般不引起肺组织坏死或形成空洞
C. 肺炎消散后，多留有纤维瘢痕
D. 治疗首选青霉素
E. 少数患者可并发脓胸
13. 关于肺炎链球菌肺炎的临床表现，下列哪项是错误的
A. 最常见的症状是突发的寒战、发热、咳嗽、咳痰与胸痛
B. 咳痰呈红棕色胶胨状
C. 可出现呕吐、腹痛、腹泻
D. 严重者可出现昏迷
E. 可出现发绀与口周疱疹
14. 肺炎患儿发生严重腹胀，肠鸣音消失是因为
A. 高钾血症
B. 中毒性肠麻痹
C. 休克
D. 败血症
E. 痊形成
15. 肺结核病人在家疗养，但痰中有结核菌，最简便有效的处理痰的方法是
A. 煮沸 B. 深埋
C. 焚烧 D. 酒精浸泡
E. 消毒灵浸泡
16. 为预防肺结核的发生和流行，在下列措施中最为关键的一项是
A. 自出生后开始定期接种卡介苗
B. 隔离排菌结核患者
C. 合理化疗治愈排菌患者

- D. 加强营养，锻炼身体，增强抵抗力
 E. 为易感者及密切接触排菌患者预防性投药

17. 关于结核菌素试验检查的意义，不正确的是

- A. 阴性提示肯定没有结核分枝杆菌感染
 B. 阳性仅表示感染，不一定患病
 C. 结核分枝杆菌感染的4~8周内，结核菌素试验可为阴性
 D. 应用免疫抑制剂者可为阴性
 E. 严重结核病患者对结核菌素试验可无反应

18. 关于原发型肺结核，下列哪项是错误的

- A. 初次感染部位多在上叶底部、中叶和下叶上部
 B. 结核分枝杆菌可引起淋巴管炎和淋巴结炎
 C. 容易出现空洞和排菌
 D. 症状多轻微而短暂
 E. 多发生于儿童

19. 关于慢性呼吸衰竭的患者，下列哪项处理不利于呼吸道通畅

- A. 糖皮质激素
 B. 采用快速利尿剂
 C. 口服或雾化祛痰剂
 D. 痰液黏稠者补液
 E. 无力排痰者翻身拍背

20. 缓解肺气肿患者呼吸困难的首选措施是

- A. 胸腔引流
 B. 通畅呼吸道，持续低流量吸氧
 C. 镇静剂
 D. 强心剂

- E. 呼吸兴奋剂

21. 有关机械辅助呼吸的呼气末正压方式治疗 ARDS 原理哪项是错误的

- A. 促进肺泡水肿消退
 B. 增加功能残气量
 C. 减少肺内动静脉分流
 D. 增加吸入氧浓度
 E. 扩张萎陷的肺泡

22. 诊断呼吸衰竭的血气标准是

- A. $\text{PaO}_2 < 65\text{mmHg}$ 和（或）伴有 $\text{PaCO}_2 > 55\text{mmHg}$
 B. $\text{PaO}_2 < 50\text{mmHg}$ 和（或）伴有 $\text{PaCO}_2 > 60\text{mmHg}$
 C. $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$ 和（或）伴有 $\text{PaCO}_2 > 5\text{mmHg}$
 D. $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$ 和（或）伴有 $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$
 E. $\text{PaO}_2 < 65\text{mmHg}$ 和（或）伴有 $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$

23. 男性，50岁，发热，咳嗽，胸痛，呼吸急促，可疑急性脓胸，最有确诊意义的是

- A. 肺部叩诊浊音
 B. 肋间饱满
 C. 呼吸音减弱
 D. 胸片大片阴影
 E. 胸穿抽出脓液

24. 导致慢性肺心病的最常见病因是

- A. 支气管哮喘
 B. 慢性纤维空洞型肺结核
 C. 尘肺
 D. 慢性阻塞性肺疾病
 E. 弥漫性支气管扩张

25. 慢性肺心病机制中，导致肺动脉高压形成的最主要因素是

- A. 缺氧

- B. 毛细血管网损毁或闭塞
C. 水钠潴留，血容量增多
D. 继发性红细胞增多，血液黏稠度增加
E. 肺小动脉炎
- 26. 下列关于支原体肺炎的描述错误的是**
- A. 病人以儿童和青年人居多
 - B. 多为干咳
 - C. 有明显的肺实变体征
 - D. 血清学检查是诊断肺炎支原体感染常用的检测手段
 - E. 治疗首选红霉素类
- 27. 急性肺脓肿的治疗原则是**
- A. 止咳、祛痰、解痉和抗感染
 - B. 改善通气，积极抗感染
 - C. 积极抗感染，充分引流痰液
 - D. 支持疗法、祛痰、有效抗生素
 - E. 中西医结合，全身用药与局部用药相结合
- 28. 肺脓肿的关键性治疗方法是**
- A. 抗菌和痰液引流
 - B. 支持疗法
 - C. 手术治疗
 - D. 处理原发灶
 - E. 对症治疗
- 29. 在有效抗生素治疗下，影响肺脓肿疗效的主要原因是**
- A. 未充分休息
 - B. 脓液引流不畅
 - C. 未配合中药治疗
 - D. 未使用祛痰剂
 - E. 脓肿部位
- 30. 陈女士，28岁，发作性呼吸困难16年，多在春秋季节发病，发作前多鼻痒、打喷嚏。最可能的诊断是**
- A. 感染性哮喘
- B. 运动性哮喘
C. 外源性哮喘
D. 内源性哮喘
E. 混合性哮喘
- 31. 对中央型肺癌诊断的最有价值的检查为**
- A. 纤维支气管镜下活组织检查
 - B. 高分辨率CT
 - C. 肺部磁共振检查
 - D. 胸部X线
 - E. 开胸肺活检
- 32. 下列病因哪项与肺癌的发生无关**
- A. 吸烟
 - B. 病毒感染
 - C. 大气污染
 - D. 职业因素
 - E. 过敏因素
- 33. 关于张力性气胸，哪项错误**
- A. 常继发于慢性阻塞性肺疾病或肺结核
 - B. 胸腔压力超过大气压
 - C. 可使纵隔严重移位，影响心脏血液循环
 - D. 必须紧急抽气减压
 - E. 一般抽气减压后，胸腔内压力不再上升
- 34. 关于闭合性气胸胸腔内压力变化正确的是**
- A. 胸腔内压力持续升高
 - B. 抽气后胸腔内压力维持不变
 - C. 胸腔内压力明显超过大气压
 - D. 抽气后胸腔内压力下降不复升
 - E. 抽气后胸腔内压力下降，但又迅速回升
- 35. 进行腹式呼吸锻炼时，下列动作中应予以纠正的是**

- A. 吸气时腹部挺出
B. 呼气时腹部尽力收缩
C. 深吸快呼
D. 鼻吸口呼
E. 深吸慢呼
- 36. 下列关于气道湿化的描述错误的是**
- A. 适用于痰液黏稠、不易咳出的病人
B. 温度不可过高，一般在 35℃ ~37℃
C. 应尽可能延长湿化时间，以达到良好的湿化效果
D. 湿化装置应定期消毒
E. 湿化后应帮助病人及时排痰
- 37. 患者，女性，68岁，间断咳嗽、咳痰20年，活动后气短4年，加重1周入院。查体：神清，双肺散在湿啰音，HR 120次/分，律齐。肝肋下3cm，双下肢水肿。血常规示 WBC $12 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 80%。对该患者最重要的治疗措施是**
- A. 给利尿剂，消除水肿
B. 予呼吸兴奋剂，改善呼吸功能
C. 止咳、祛痰
D. 积极抗感染
E. 予支气管扩张剂
- 38. 患者，女性，25岁，近2个月来轻度咳嗽，咳白色黏痰，内带血丝；午后低热，面颊潮红，疲乏无力，常有心悸、盗汗，较前消瘦。经X线摄片检查，发现右上肺第2肋部有云雾状阴影，无透光区。痰菌3次检验阴性，你认为下列哪项护理措施不必要**
- A. 住院隔离治疗
B. 给予高热量、高维生素和高蛋白饮食
C. 按医嘱给予抗结核药物治疗，观
- 察药物不良反应
D. 室内开窗通风
E. 做好保健指导
- 39. 患者，男性，55岁，诊断哮喘3年，近来每当给宠物狗洗澡后即出现咳嗽、咳痰伴喘息发作，护士为其进行健康教育时应指出其可能的过敏原是**
- A. 花粉 B. 尘螨
C. 狗毛 D. 病毒感染
E. 细菌感染
- 40. 患者，50岁，男，原有慢性阻塞性肺疾病，呼吸困难、发绀，近日咳嗽加剧，突然发生右侧胸痛，约30分钟后呼吸困难突然加剧，患侧胸壁叩诊呈鼓音，听诊呼吸音消失。该变化是**
- A. 自发性气胸
B. 肋间神经痛
C. 膈下脓肿
D. 胸腔积液
E. 肋骨骨折
- 41. 应用体位引流时，护士应该根据受侵的部位安置病人体位。王先生需引流左上叶段，此时应指示病人**
- A. 向左侧卧位，在枕上稍向前方
B. 仰卧，枕垫放在髋部下
C. 向右侧卧位，枕垫放在髋部下，头部充分伸展
D. 坐在椅子上，靠向右侧
E. 坐在椅子上，背靠枕垫
- 42. 患者女性，16岁，支气管哮喘发作1小时，烦躁，发绀，呼吸26次/分，心率120次/分，律齐，以下哪项措施不当**
- A. 协助病人采取舒适的座位
B. 给予吸氧3L/min

- C. 守候病人床旁，安慰病人
- D. 忌用普萘洛尔
- E. 禁用氨茶碱

43. 患者，男性，60岁，吸烟25余年，每天2包左右，有慢性咳嗽、咳痰病史15余年，近10年来出现逐渐加重的呼吸困难，往往于受寒感冒后症状加重，并出现发热、剧咳、咳黄黏痰、气促、喘息，肺部可闻及干、湿啰音，对该患者进行健康教育时，错误的是

- A. 劝其戒烟
- B. 冬春季注意保暖，避免受寒
- C. 教其做缩唇胸式呼吸
- D. 积极预防各种呼吸道疾病
- E. 注意环境卫生，加强自我保护，消除有害物质对呼吸道的刺激

44. 患者，女性，20岁，诊断支气管扩张症5年，常反复咯血，本次因大量咯血而急诊入院，经抢救后咯血已止，下列措施错误的是

- A. 给予温或凉的流质饮食
- B. 保持大便通畅
- C. 仍需加强观察，防止病情反复
- D. 加强活动，以利恢复
- E. 咳嗽剧烈时遵医嘱给予镇咳药

(45~48题共用题干)

患者，女性，28岁，咳嗽两个月，干咳为主，有午后低热，月经不规律。胸片示右上肺淡片状阴影。为进行诊断，进行了PPD试验。

45. 关于PPD试验结果的判断，下列哪项是正确的

- A. 硬结直径≤5mm为阳性
- B. 硬结直径5~9mm为阳性
- C. 硬结直径≤10mm为阳性
- D. 硬结直径10~19mm为阳性

- E. 局部有水疱为阳性

46. 患者今日上午突然咯鲜血400ml，此时应警惕患者发生

- A. 呼吸困难
- B. 营养失调
- C. 感染
- D. 窒息
- E. 休克

47. 首要的抢救措施是

- A. 高流量吸氧
- B. 输血
- C. 清理呼吸道，保持呼吸道通畅
- D. 给予镇静药
- E. 使用止血药物

48. 一般情况下，大咯血时首选的药物是

- A. 可待因
- B. 普萘洛尔
- C. 酚磺乙胺
- D. 垂体后叶素
- E. 6-氨基己酸

(49~51题共用题干)

患者男性，25岁，突然畏寒、发热，半后胸疼痛1天，胸透见右中肺有大片炎性阴影，入院后肌注青霉素治疗，体温逐渐下降，病人临床情况也明显好转。

49. 该病人可能的诊断是

- A. 肺炎球菌肺炎
- B. 肺炎支原体肺炎
- C. 金黄色葡萄球菌肺炎
- D. 肺结核
- E. 军团病

50. 对该病人护理中，下列哪项不妥

- A. 胸痛取患侧卧位
- B. 呼吸困难取半卧位
- C. 高热者常规用退热剂
- D. 腹胀者可局部热敷或肛管排气
- E. 密切观察生命体征、神志、尿量等变化，警惕感染中毒休克

51. 该病人 2 天后体温又开始升高，血象白细胞总数升高，应考虑

- A. 抗生素剂量不对
- B. 病原菌产生耐药性
- C. 机体抵抗力低下
- D. 休克先兆
- E. 出现并发症

(52 ~ 53 题共用题干)

患者，男性，28岁，自感低热，乏力、食欲下降，有盗汗、体重下降、呼吸困难、胸痛等表现，就医诊断为浸润型肺结核，收入院抗结核治疗。

52. 关于该疾病防治及护理措施不妥的是

- A. 痰液用 20% 漂白粉溶液搅拌静置 2 小时后倒掉
- B. 护士在病室里不密切接触病人时，可不戴口罩
- C. 病室每日用紫外线照射进行空气消毒
- D. 给予异烟肼、链霉素治疗
- E. 病室通向走廊的窗子需关闭

53. 经何种检查可确定病人具有传染性

- A. PPD 试验强阳性
- B. 痰涂片找到结核菌
- C. 胸腔穿刺出 1000ml 胸腔积液
- D. X 线检查示片絮状阴影
- E. 红细胞沉降率（血沉）30mm/h

(54 ~ 57 题共用备选答案)

- A. 支气管哮喘
- B. 肺结核
- C. 支气管肺癌
- D. 支气管扩张症
- E. 阻塞性肺气肿

54. 胸部听到局限而固定的湿啰音常见于

55. 锁骨上、下部位在咳嗽后听到湿啰音常见于

56. 骨、关节病变或内分泌紊乱等常见于

57. 上腔静脉阻塞综合征常见于

(58 ~ 60 题共用备选答案)

- A. 头低足高位，头偏向一侧
- B. 去枕平卧位
- C. 平卧位，头偏向一侧
- D. 端坐位
- E. 患侧卧位

58. 结核性胸膜炎胸痛病人取

59. 支气管哮喘发作病人取

60. 咯血窒息的病人取

(61 ~ 62 题共用备选答案)

- A. 支原体肺炎
- B. 金黄色葡萄球菌肺炎
- C. 急性感染性喉炎
- D. 支气管哮喘
- E. 肺炎链球菌肺炎

61. 呼气性呼吸困难多见于

62. 吸气性呼吸困难多见于

(63 ~ 67 题共用备选答案)

- A. 末梢神经炎
- B. 高尿酸血症
- C. 过敏反应
- D. 听力障碍
- E. 球后视神经炎

63. 异烟肼的主要不良反应为

64. 链霉素的主要不良反应为

65. 吡嗪酰胺的主要不良反应为

66. 利福平的主要不良反应为

67. 乙胺丁醇的主要不良反应为

参考答案与解析

- | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 2. A | 3. A | 4. C | 5. A | 6. C |
| 7. D | 8. D | 9. B | 10. C | 11. B | 12. C |
| 13. B | 14. B | 15. C | 16. C | 17. A | 18. C |
| 19. B | 20. B | 21. D | 22. D | 23. E | 24. D |