

外科金鑑卷

六五四三

編輯外科心法要訣

百會疽圖



百會穴在頂中央自面側觀之正對耳尖

頭部

百會疽 百會疽在顛頂結經屬督脈百會穴初如粟米漸如錢甚似葡萄堅似鐵高腫熱實清毒火平塌陽虛溫補怯腫連耳項動痰聲七日不潰命必絕此百會疽又名玉頂發生在顛頂正中屬督脈經百會穴由膏梁太

過火毒凝結而成初起形如粟米漸腫根大如錢甚則形似葡萄堅硬如鐵高尖紅腫焮熱疼痛瘡根收束憎寒壯熱大渴隨飲隨乾口苦唇焦便秘煩燥脈見洪數者此屬氣實宜服黃連消毒飲以清毒火外敷冲和膏若漫腫平塌紫暗堅硬聾痛根散惡寒便瀉脈見細數者此屬陽虛宜服十全大補湯以溫補之外敷回陽玉龍膏若面赤過煩口乾不渴唇潤者屬陽虛浮泛宜服桂附地黄丸引火歸源更用生附子餅置兩足心湧泉穴各灸五壯以洩其毒初起貼琥珀膏已潰發黃靈藥太乙膏蓋貼腐盡再易生肌之藥治之若腫連耳項痰如拽鋸七日無膿不潰神昏者命必絕矣

黃連消毒飲 蘇木 甘草 陳皮 桔梗 黃芩 黃蘗 人參 梔子 防己

分五 防風 知母 羌活 獨活 連翹 黃連 生地黃 黃耆 澤瀉 防己

當歸尾 水煎食遠溫服 黃連消毒清毒火諸般火證服最良蘇木甘草陳皮桔子藥人參梔子

二防知母羌活獨活等連翹黃連生地黃黃耆澤瀉當歸尾服後最忌飲寒涼

冲和膏 回陽玉龍膏 生肌散 十全大補湯 黃靈藥 太乙膏 桂附地黄丸

附子餅 見前 琥珀膏 見後

透腦侵腦疽圖

透腦疽生在百會穴前額會穴前



侵腦疽生在透腦疽前側下五處穴

透腦疽 透腦疽生百會前形如雞子痛而堅較漫濃稀虛
 壅陷紅硬濃稠實腫尖註此證生於百會穴之前額門之際亦
 由督脈經火毒而成初如粟米漸如雞子堅硬疼痛瘡頂壅陷
 根脚漫腫色暗者屬虛若色紅腫硬頂尖膿稠者屬實速潰者
 順遲潰透腦髓者逆其腫潰內外治法俱按百會疽

侵腦疽 侵腦疽生透腦旁濕火攻發屬太陽穴名五處知

其位紅順紫逆要審詳註此疽生於透腦疽側下由太陽膀胱經濕火而成穴名五處紅腫高起焮熱疼
 痛膿色如蒼蠅者屬氣血俱實順而易治若紫陷無膿根脚散大者屬氣血兩虛逆而難治初起宜服利
 防敗毒散汗之次服內疏黃連湯下之將潰服託裏透膿湯已潰服託裏排膿湯外貼琥珀膏圍敷冲和
 膏其餘內外治法俱按癰疽潰瘍門

託裏透膿湯 人參 白朮炒 穿山甲研 白芷各一 升麻 甘草節各五 當歸二 皂角刺一

分五 生黃耆三 青皮炒五分 水三鍾煎一鍾病在上部先飲煮酒一鍾後熱服此藥病在下部先服

藥後飲酒瘡在中部藥內兌酒半鍾熱服 歌託裏透膿治癰疽已成未潰服之宜參朮甲芷升麻草

當歸黃耆刺青皮

荆防敗毒散見頂部 內疎黃連湯 冲和膏俱見腫

佛頂疽生在透腦疽之前上星穴

佛頂疽圖



佛頂疽 佛頂疽屬督上星陰陽不調熱毒成不論虛實
 皆險證潰爛黑陷必然凶註此證一名頂門疽生於頭頂
 額門之前屬督脈經上星穴由臟腑陰陽不調熱毒上壅
 而成色紫堅硬腫痛脈洪大而數者為實脈微細而數者

託裏排膿湯見頂部 琥珀膏見腫

為虛皆屬險證若爛潰黑陷六脈散大神昏語二便閉結者為逆首尾內外治法俱按百會疽

額疽



傍額疽

額疽 額疽生額火毒成左右膀胱正督經項陷焦紫無膿重高聳根收紅腫輕註此證生前額正中者屬督脈經或生左右額角者屬膀胱經總由火毒而成初起瘡頂塌陷乾焦色紫不生大膿者其勢重而屬險也若紅腫高聳瘡根收束者其勢輕而屬順也初服荆防敗毒散汗之次服仙方活命飲消之將潰氣虛者宜服託裏透膿湯氣實者宜服透膿散

外敷冲和膏已潰宜服託裏排膿湯外貼琥珀膏其餘內外治法俱按癰疽潰瘍門

荆防敗毒散

仙方活命飲

託裏透膿湯

透膿散

冲和膏

少託裏排

膿湯見項部

琥珀膏見瘡內

勇疽



勇疽生在眼角後五分童子額穴名太陽穴

勇疽 勇疽皆後太陽穴膽經怒火伏鼠形七日不潰毒攻眼黃膿為吉黑血凶註此證一名勇疽又名腦發疽屬足陽膽經怒火而成生於目小眚之後五分生在太陽穴者無論左右皆可以生初起如粟漸腫疼痛形如伏鼠面目浮腫七日信膿不潰火毒攻精腐爛損目若十一日鍼出黃膿毒從膿解為順易治若出紫黑血者係氣虛不能化毒為逆難治初服仙方活命飲清解之毒甚宜服內疎黃連湯外敷二

味拔毒散其將潰已潰內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門潰後避風忌水

仙方活命飲 內疎黃連湯 二味拔毒散

外科心法

有益齋文印

鬢疽圖



鬢疽生在左右髮角用

柴胡清肝湯 柴胡 生地 五錢

黃芩 生施子 研 天花粉

證宜血疎通解毒良四物生用柴翹茅黃芩桅粉草節防

託裏消毒散 二味拔毒散 俱見腫

天疽銳毒圖



銳毒生右耳後一寸三分高骨後

天疽生左耳後一寸三分高骨後

鬢疽 鬢疽三焦膽二經證由慾怒火凝成此經氣多而血

少潰腐惟宜少見膿註此證發於鬢角屬手少陽三焦足少

陽膽二經由於相火妄動外受風熱更因性情急怒慾念火

生凝結而成此二經俱屬氣多血少最難腐潰更兼鬢角肌

肉澆薄不宜針灸候其自潰潰後不宜多見膿膿多者過耗

血液難斂初起宜服柴胡清肝湯解之膿成者宜託裏消毒

散托之外敷三味拔毒散已潰內外治法俱按癰疽潰瘍門

當歸 赤芍 川芎 連翹 牛蒡子 各一錢 研

水二鍾煎八分食遠服 方柴胡清肝治怒

防風 各一

天疽 銳毒 天疽居左銳毒右經屬膽腑生耳後謀慮太過

鬱火成此處肉薄當急救註此二證左為天疽右為銳毒俱生

耳後一寸三分高骨之後天者不盡天年謂之天疽者如鋒刃

之銳利言毒甚也得此二證愈者甚少初起俱如黍粒漸腫如

瓜堅硬平塌紫暗不澤較諸瘡疼痛倍增名雖各異而左右耳

後俱屬足少陽膽經由謀慮不決鬱火凝結而成此處皮肉澆

薄氣多血少終屬險證急當治之遲則熱氣下入淵液前傷任

脈內黨肝肺惡證悉添必致不救若紅腫速潰者順堅硬陷者逆如果投方應證亦只十全四五也初

起服柴胡清肝湯消解之膿將成宜託裏消毒散虛者十全大補湯託補之外俱敷烏龍膏其左內治法俱按癰疽腫潰瘍門 淵液膽經穴名

柴胡清肝湯

見前

託裏消毒散

烏龍膏

俱見腫瘍門

十全大補湯

見腫瘍門

耳後疽圖



耳後疽生耳上稍之髮角發開口陷之處各相

起失於託裏或誤食寒涼則毒必不能外發遂攻耳裏膿從耳竅出者名為內潰屬虛多服十全大補湯大抵少年得此證者其愈最緩老年得此證者易於成漏 十全大補湯 見潰瘍門

耳發圖



耳發耳背間連耳輪通腫甚則膿串耳竅左右相同

耳發 耳發三焦風熱成初椒漸若蜂房形赤腫疼痛生輪後黃膿屬吉紫血凶註此證生於耳後屬三焦經風熱相搏而成初如椒粒漸腫若蜂房將腐亦多眼孔嫩赤疼痛腫連耳輪蓋發者乃癰證之毒甚者也不可聽其自潰恐潰連膿通耳竅當在十一日後剪破瘡頂出黃白膿者屬吉為順出紫鮮血者屬凶為逆初起俱宜服仙方活命飲消之外敷二味拔毒散其餘內外治法俱按癰疽潰瘍門

仙方活命飲

見腫瘍門

二味拔毒

見腫瘍門

耳根毒圖



耳根毒生在耳垂後偏上縫中左右相同

膏生肌斂口若遇虛者膿水清稀或瘡口斂遲即服香貝養榮湯補之自斂

仙方活命飲

荆防敗毒散

透膿散

託裏透膿湯

紅靈藥

生肌玉紅

膏太乙膏

香貝養榮湯

玉枕疽圖



玉枕疽生腦後在玉枕骨尖上腦戶穴在百會穴後四寸半

玉枕疽 玉枕疽屬督脈經證由積熱風邪乘枕骨微上

腦戶穴高腫為順紫陷凶註此證由督脈經積熱外受風

邪凝結而成生在玉枕骨尖微上腦戶穴初起如粟麻癢

相兼寒熱往來口渴便秘漸增堅硬大者如茄小如鵝卵

紅活高腫潰出稠膿者屬吉而順也若紫暗塌陷潰出血

水者屬凶險也初則俱服神授衛生湯消解之虛者宜服

託裏消毒散外敷神和膏其餘內外治法俱按癰疽腫潰

神授衛生湯

託裏消毒散

神和膏

癰疽門

癰疽門

腦後發圖

腦後發在玉枕骨之下



腦鑠圖

腦鑠生在腦後髮際寸風府穴天筋之中宛當中其勢如橫木



腦後發

腦後發生在督經熱結風府粟腫於紅活易滑膿稠順紫暗難潰血水凶註此證屬督脈經枕骨之下風府穴由積熱外受風邪凝結而成初如果米嫩腫作痛疼引頭項肩項氣粗鼻塞漸大如盤如盃紅活速潰出稠膿者順紫暗難潰時流血水者逆初起內外治法按玉枕疽其餘內外治法俱按癰疽腫潰瘍門

腦鑠 腦鑠項後如橫木精涸毒火上乘生黑如竈烟牛唇硬木痛未腐水流清急施桑艾法至痛火燎刺痛屬陽

經速服仙方活命飲若見七惡定然凶註此證先於督脈經風府穴由陰精枯涸毒火乘之而生初起形如板粒堅硬紫暗漸腫如橫木甚則上至顛頂下至大椎色如竈烟

硬若牛唇未膿皮先腐爛時流清水肌肉水冷輕者本痛重者毒氣將陷全不知疼宜急施桑柴烘法或艾壯灸法

以痛為度速服仙方活命飲以舒解其毒七日之後不發長不生大膿者宜服十全大補湯救之投補藥不應者難治若初起熱如火燎刺痛屬陽症連服黃連消毒飲外敷回陽玉龍膏此證若首尾純見五善之證者屬順見七惡之證者屬逆也其餘內外治法俱按癰疽腫潰瘍門

桑柴烘法 艾壯灸法 俱見前卷 仙方活命飲 見腫瘍門 十全大補湯 見潰瘍門 黃連消毒飲 見前百

陽玉龍膏 見腫瘍門

油風圖



油風生於頭面毛髮脫落皮膚色紅光澤者癢亦名養眉間及面部

油風 油風毛髮乾焦脫皮紅光亮癢難堪毛孔風襲致傷血養直海艾砭血痊註此證毛髮乾焦成片脫落皮紅光亮癢如蟲行俗名鬼刺頭由毛孔開張邪風乘虛襲入以致風盛燥血不能榮養毛髮宜服神應養真丹以治其本外以海艾湯洗之以治其標若耽延年久宜鍼砭其光亮之處出紫血毛髮庶可復生

神應養真湯

羌活 木瓜 天麻 白芍

當歸

羌活子

熟地

酒蒸

川芎

等分為末入地黃

膏加蜜丸桐子大每服百丸溫煮酒或鹽湯任下

方神應養真治油風養血消風髮復生羌歸木瓜

天麻芍藥綠熟地與川芎

海艾湯

海艾 菊花 藁本 蔓荊子

防風

薄荷

荊穗

藿香

甘松

各二錢

水五六碗同藥

煎數滾連湯共入瓶口鉢內先將熱氣薰面候湯少溫用布蘸洗日洗二三次後避風忌魚腥發物

方海艾湯治油風癢先薰後洗善消風荊穗蔓荊風薄荷藿香海艾與甘松

白屑風圖



白屑風生於頭面作癢抓起白屑皮脫去起其燥癢增

白屑風 白屑風生頭與面燥癢日久白屑見肌熱風侵成燥化換肌潤肌醫此患註此證初生髮內延及頭面耳項燥癢日久飛起白屑脫去又生由肌熱當風風邪侵入毛孔鬱久燥血肌膚失養化成燥證也宜多服祛風換肌丸若肌膚燥裂者用潤肌膏擦之甚效

祛風換肌丸

大胡麻

蒼朮炒

牛膝酒洗

石菖蒲

苦參

何首烏

生

花粉

歲靈仙

各二

當歸身 川芎 甘草 各一 右為細末陳煮酒跌丸菜豆大每服二錢白滾水送下忌魚腥發物火

酒

敷換肌丸治白屑風燥瘡日增若蟲行風燥血分失潤養疊起白屑落復生歸苦胡麻蒼朮膝膏蒲花粉草靈苦參何首烏為末煮酒跌九菜豆形

潤肌膏

香油

四兩

奶酥油

二兩

當歸

錢五

紫草

錢一

將當歸紫草入二油內浸二日文火燂焦去渣加

黃蠟五錢溶化盡用布濾傾盤內不時用柳枝攪冷成膏每用少許日擦二次

歌方潤肌膏擦白屑風

肌膚燥瘡用更靈酥香二油歸紫草燂焦加蠟濾攪凝

禿

禿瘡風熱化生蟲蟻瘡難堪却不疼白痴如錢生髮內

瘡

宜服通聖擦膏靈註此證頭生白痴小者如豆大者如錢俗名

圖

錢癬又名肥瘡多生小兒頭上驗瘡難堪却不疼痛日久延漫

禿

成片髮焦脫落成禿瘡又名癩頭瘡由胃經熱生風而成宜用

禿

防風通聖散料醋酒浸焙為細末每服一錢或二錢量其壯弱

禿

用之食後白滾湯調下服至頭上多汗為驗初起肥瘡宜擦肥

禿

油膏用久則效已成禿瘡者先宜艾葉鍋裏煎湯洗淨瘡加再用豬肉湯洗之隨擦躑躅花油以殺蟲散

禿

風蟲死則瘡止風散則髮生血潮則肌膚潤久擦甚效

禿

防風通聖散 防風 當歸 白芍 芒硝 大黃 連翹 桔梗 川芎 石膏 黃芩 薄荷

麻黃

滑石 荆芥 白朮 山梔子 甘草 共為末 歌方防風通聖治禿瘡

胃經積熱致風傷連翹梔子麻黃桔白朮歸芒滑石防黃芩甘草石膏芍薄荷荆芥并硝黃共末酒拌

晒乾碾白湯調服發汗良

肥油膏

番木鱉 當歸 蒼蘆 黃藥 苦參 杏仁 狼毒 白附子 鯉魚膽

用香油十兩將前藥入油內熬至黑黃色去渣加黃蠟一兩二錢溶化盡用布濾過罐收每用少許用

藍布裹於手指蘸油擦瘡

方肥油膏能治肥瘡散風殺蟲長髮強黃藥苦參白附子番釐狼毒杏仁良姜蘆薈歸鯉魚膽煤焦入蠟實奇方

躑躅花油方 躑躅花根四兩搗爛用菜油一盆煤枯去渣加黃蠟少許布濾候冷青布蘸擦日用三次

種帽戴之勿令見風

方躑躅花油療禿瘡驅蟲止癢擦之良躑躅花根研極爛菜油煤枯入蠟強

圖 節 站 螻



螻蛄癖 螻蛄癖即蟬拱頭勢小勢大各有由胎毒堅小多衣膜暑熱形大功易收註此證多生小兒頭上俗名絡繹未破如曲蟬拱頭破後形似螻蛄串穴有因胎中受毒者其瘡腫勢雖小而根則堅硬潰破雖出膿水而堅硬不退瘡口收斂越時復發本毒未罷他處又生甚屬纏綿難斂宜用三品一條槍插入孔內化盡堅硬衣膜換撒生肌散貼玉紅膏以收斂之不致再發也亦有暑熱成毒者大

如梅毒相聯三五枚潰破膿出其口不斂日久頭皮串空亦如螻蛄串穴之狀宜貼紺珠膏拔盡膿毒將所串之空皮剪通使無藏膿之處用米泔水日洗一次乾撒生肌散貼萬應膏甚效有因瘡口開張日久風邪襲入以致瘡口周圍作癢抓破津水相延成片形類黃水瘡者宜用敗銅散搽之忌魚腥發物

三品一條槍

白砒五錢

明礬三錢

砒礬二味共研細末入小罐內加炭火煨紅青烟已盡疊起白烟

片時約上下紅撒住火取罐安地上宿取出約有砒礬淨末一兩加雄黃二錢四分乳香一錢二分

共研極細厚糊搽成線條陰乾瘡有孔者插入孔內無孔者先用鍼連孔裏早晚搽藥二條插至三日

後孔大者每插十餘條插至七日孔內藥條滿足方住患處四邊自然裂開大縫共至十四日前後其

堅硬衣膜及片核瘰癧痔漏諸管自然落下隨用湯洗搽玉紅膏虛者兼服健脾補劑自然收斂

方神奇三品一條槍能醫堅硬衣膜瘡雄乳白砒礬生用研末殷連搽條良

敗銅散

化銅舊罐子一個研為細末用香油調敷自能滲濕祛癢瘡口易斂

敗敗銅散治潰風傷

瘡破津脂水瘡化銅舊罐研細末香油調敷最良

紺珠膏

萬應膏

生肌散

玉紅膏

俱見膏

髮際瘡圖



髮際瘡瘡後髮際內胖人多生此瘡

不瘡又兼受風寒凝結形如卧瓜破爛津水時破時斂俗名謂之肉龜經年不愈亦無傷害常用琥珀膏貼之可稍輕也

琥珀膏

定粉

血餘

輕粉

銀硃

花椒

黃蠟

琥珀

麻油

將

血餘花椒麻油煤焦搗去渣下黃蠟溶化盡用夏布濾淨傾入磁碗內預將定粉銀硃輕粉琥珀四味各研極細共合一處徐徐下入油內用柳枝不時攪之以冷為度綿脂攤貼亦可

諸瘡活瘀解毒化腐良定血輕硃椒蠟珀麻油熬膏亦瘡傷

紺珠丹

即萬靈丹

防風通聖散

見前

黃連膏

見鼻部

頭風傷目

頭風引目眉稜痛風火寒痰有四因或因楊梅毒攻項或因產後被風仁註此證畏風惡寒其痛走注不

定得煖少減者風痛也寒熱口苦大渴二便秘不眠者火痛也手足厥冷面青唇白氣不渴小水白者寒痛也身重肢痠胸煩作嘔口吐痰沫者痰痛也以上四證舊有古方羌活冲和湯倍川芎加菊花隨經形證加引治之倘若因循失治風攻眉棱痠痛眼皮跳動漸攻睛珠起藍雲遮睛多致損目若只眉棱痠痛以碧雲散常吸之甚效

羌活冲和湯

防風

白芷

各一錢

細辛

甘草

各五分

生地

蒼朮

黃芩

各一錢

羌活

五分

川

芎

錢二

引加葱頭三根生薑一片紅棗肉二枚水煎食遠服

痛由頂後起屬膀胱經倍加薑本

痛由耳後起屬膽經加柴胡痛由太陽牽引頭額兩目屬胃經倍白芷加葛根煨石膏頭痛兼有腹

痛身重屬脾經倍蒼朮頭痛兼有足冷氣逆屬腎經倍細辛甚者加麻黃生附子減黃芩頭痛兼

有嘔涎沫者手足厥冷屬肝經加吳茱萸頭痛有火熱渴倍酒洗黃芩加生石膏便秘者加生大

黃頭痛吐痰涎四肢不冷者加半夏

歌方冲和頭風傷目風大寒痰四因生日久眉棱痠痛跳遞

睛損目此能清防風白芷細辛草生地蒼朮今羌活芎詳在隨加引經藥葱薑紅棗水煎成

碧雲散 川芎 鵝不食草

各一兩

細辛

辛美

各二錢

青黛

錢一

共為細末患者口噤凉水令人以蘆

筒吹入左右鼻孔內取嚏為效每用少許鼻常吸之其效緩

歌方碧雲散治頭風證眉棱痠痛更堪醫

鵝不食草辛美黛芎細同研不時吸

貼兩太陽穴法 治頭痛如破 雀腦川芎 白附子

各等

研末葱汁調稠紙攤貼左右太陽穴效

產後風寒侵腦頭痛不可發汗宜用四物湯倍川芎加荆芥穗服之其效緩

楊梅毒入腦髓以致頭

痛者治在本門

四物湯見瘡瘍門

面部

顴癰 頰癰 頰癰

顴癰宜腫色赤左右同
頰癰宜腫色紫左右同



仙方活命飲

內疎黃連湯

麥靈丹 俱見腫

頰癰

頰癰色赤堅硬小根深左右同



屬迅速之證初覺即當急治遲則毒火攻心令人皆潰諸語惡證惡添多致不救

蟾酥丸 見斤

麥靈丹 見腫

黃連消毒散 見頭部

面癰

面癰毒形如豆粒色紅堅硬



顴癰頰癰 顴癰頰癰漸起形風熱積熱小腸經起故紅浮腫痛疽
紫漫硬木麻疼註此二證發於顴骨尖處屬小腸經不論左右初小漸
大如榴莢陽分者由風熱而生初起嫩紅浮腫疼痛七日即潰名為顴
癰毒輕根淺易愈陰分者由積熱而生色紫漫腫堅硬麻木疼痛
三七方潰名為顴癰毒甚根深難愈為證初宜仙方活命飲疽證初
宜內疎黃連湯或麥靈丹其餘內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

頰癰 頰癰初起粟米形證由陽明火毒生堅硬頂凹根深固
寒熱交作麻癢疼註此證生在顴骨之間屬陽明胃經不論左
右初如粟米黃色小胞次如赤豆頂凹堅硬按似斤頭麻癢疼
痛多因過食炙煖藥酒以致胃經積火成毒而生初宜蟾酥丸
或麥靈丹汁之次服黃連消毒散清之外治法同斤門凡斤皆

面癰毒 面癰毒在頰車生初少漸多赤豆形腫硬癢痛津黃
水證屬風熱客陽明註此證生面上頰車骨間初生一個漸發
數枚形如赤豆色紅癢痛堅硬似斤時津黃水由風熱客於陽
明上攻而成初宜服荆防敗毒散汗之若胃火成則唇焦口渴
便燥者即服涼膈散下之外以清涼消毒散敷之即愈

涼膈散 黃芩 薄荷 梔子 連翹 石膏 甘草 芒硝 大黃 水二鍾苦竹葉

二十片煎八分加蜂蜜三匙和服 涼膈散 醫肺胃熱渴唇燥燥結之導 梔子 石膏 芒硝 大黃 苦竹葉

清涼消毒散 白及 乳香 雄黃 天花粉 麝香 烏藥 山慈姑 黃藥 各等分共研細末雞

子清和蜜水調敷 清涼消毒散 風熱及乳雄黃花粉麝香烏藥各等分黃藥研雞清蜜調毒即滅

荆防敗毒散 見項部瘡症

面遊風像面上起白皮形似細魚鱗

面遊風圖



面遊風 面遊風燥熱濕成面目浮腫癢蟲行膚起白屑而癢極破

津黃水津血於此蠶生於面上初發面目浮腫癢若蟲行肌膚乾

燥時起白屑次後極癢抓破熱濕盛者津黃水風燥盛者津血痛楚

難堪由平素血燥過食辛辣厚味以致陽明胃經濕熱受風而成癢

甚者宜服消風散散痛甚者宜服黃連消毒散外抹摩風膏緩緩取效

摩風膏 麻黃 羌活 白檀香 升麻 白及 防風 當歸身 用香油五兩將

藥浸五日文火燂黃即撈去渣加黃蠟五錢溶化盡用絹濾過攪冷塗抹瘡上 摩風膏抹遊風證

麻黃羌活白檀升及防歸身香油泡燂黃去渣加蠟凝

消風散 見項部 黃連消毒散 見頭部

疔腮圖

疔腮



疔腮 疔腮胃熱是其端初起喉疼熱復寒高腫喉紅風與

熱平腫色淡熱濕原註此證一名髭發一名含腮瘡生於兩

腮肌肉不著骨之處無論左右總發端於陽明胃經也初起

喉痛甚熱往來若高腫色紅喉熱者係胃經風熱所發若平

腫色及不鮮者由胃經濕熱所生始則俱以柴胡葛根湯表

之若口渴便秘宜四順清涼飲解之表裏證俱解腫痛仍作者勢必成膿宜託裏消毒散託之膿熟者鍼之體虛者宜平補之其餘治法按癰疽潰瘍門此證初起若過服涼藥令毒攻喉者險

柴胡葛根湯 柴胡 葛根 石膏 花粉 黃芩 甘草 牛蒡子 連翹 桔梗

各一 升麻 水二鍾煎八分不拘時服 歌柴胡葛根發表證疔腮腫痛或平形石膏花粉黃芩

草牛蒡連翹桔梗升

四順清涼飲 防風 梔子 連翹 甘草 當歸 赤芍 羌活 大黃 水二鍾燈

心五十寸煎八分食遠服 歌四順清涼攻裏強口乾便秘疔腮瘡防風梔子連翹草歸芍燈心羌大黃

託裏消毒散 見腫瘍門

頰 瘍 圖



頰瘍生頰車骨

頰瘍 頰瘍胃經積熱生初如紅粟漸榴形膿出腫消易斂愈膿稀難斂漏因成註此證生於耳下頰車骨間由陽明胃經積熱而生始發如粟色紅漸大如榴初起宜犀角升麻湯清解之若失治或過敷寒藥以致肌冷凝結堅硬難消難潰者宜升陽散火湯宣發之將潰宜託裏消毒散膿熱鍼之膿出腫退瘡口易斂者則愈或牙關緊急不開

或旁腫不消膿水清稀因而成漏復被寒侵瘡孔致生多骨經年纏綿難愈者服桂附地黃丸外用豆豉

餅墊灸艾壯初用九壯以知熱瘡為止每日灸之以朽骨脫出膿漸少而肌漸平為度兼用紅升丹搽入

瘡口內萬應膏蓋貼每日一易患者當慎起居戒腥發等物漸漸收功

犀角升麻湯 犀角 升麻 黃芩 白附子 生甘草 白芷 川芎

羌活 防風 水三鍾煎一鍾食遠熱服 歌犀角升麻醫頰瘍色紅初起服之良黃芩白附

生甘草白芷川芎羌活防

升陽散火湯 撫芎分 蔓荊子 白芍炒酒 防風 羌活 獨活 甘草半生 人參各一錢 柴胡

香附各一錢五分 葛根一錢 升麻一錢 僵蠶分錢五 生薑一片紅棗肉一枚水三鍾煎一鍾食遠溫服

歌升陽散火過敷寒牙又拘急木痛堅撫蔓芎防羌獨草參柴香附葛升蠶

託裏消毒散觀腫 豆豉餅法內

紅升丹 萬應膏俱現潰

骨槽風 骨槽風火三焦胃耳前頰頰隱隱疼腐潰筋骨仍硬

痛牙關拘急夾邪風註此證一名牙又發一名穿腮發乃手少

陽三焦足陽明胃二經風火也起於耳前連及腮頰筋骨隱痛

日久腐潰腮之裏外筋骨仍然漫腫硬痛牙關拘急皆由邪風

深襲筋骨故也此證屬在筋骨陰分故初起腫硬難消潰後瘡

口難合多致不收初起熱不盛者內宜服清陽散火湯外以清

骨槽風圖



骨槽風腮頰浮腫牙關緊急

胃散擦牙直君妙貼散敷腮如初起發表之後人壯火盛者用皂刺大黃甘草節白芷殭蠶下之後減大

黃加生石膏以清之然亦不可過用寒涼之藥恐其凝結也有硬腫日久失治不能盡消者膿勢將成宜

中和湯託之已潰按癰疽潰瘍門治法亦有過服寒涼以致肌肉堅凝腐臭非理中湯佐以附子不能回

陽非殭蠶不能搜風如法治之諸證俱減惟牙關拘急不開宜用生薑片墊炙頰車穴二七壯其穴在耳

垂下五分陷中處日灸之兼用鍼刺口內牙盡處出血其牙關即開若寒熱不退形焦體削痰盛不食或

口內腐爛甚則穿腮落齒者俱為逆證當腐爛之初治法即同牙疳亦不過稍盡人事耳

清胃散 薑黃 白芷 細辛 川芎 各等分共研細末先以鹽湯漱口擦牙痛處 效清胃散擦牙

腫疼薑黃白芷細辛為同研先以鹽湯漱口後擦此藥有奇功