

国家级实验教学示范中心
全国高等院校医学实验教学规划教材

供临床、预防、基础、口腔、麻醉、影像、药学、检验、护理、法医、中医等专业使用

人体寄生虫学实验指导

主编 赵 瑞



科学出版社



我的应用商店
我的应用商店



国家级实验教学示范中心
全国高等院校医学实验教学规划教材

供临床、预防、基础、口腔、麻醉、影像、药学、检验、护理、法医、中医等专业使用

人体寄生虫学实验指导

主 编 赵 瑞
编 者 (以姓氏笔画排序)
万 巧 凤 王 丽 杨 玉 荣 李 燕 兵
赵 瑞 赵 嘉 庆 黄 菱

科学出版社
北京

• 版权所有 侵权必究 •

举报电话:010-64030229;010-64034315;13501151303(打假办)

内 容 简 介

人体寄生虫学实验指导是为学生学习寄生虫各期形态结构和病原学检查方法而编写的实验教材;包括医学蠕虫学、医学原虫学、医学节肢动物和实践技能以及附录等内容,全书分为10章。寄生虫学的课程教学分为形态教学和理论讲授两部分,形态教学主要在实验室以讲习课形式进行,理论教学时不再讲授形态,故实验指导具有很强的实用性。本书1~9章主要阐述寄生虫各期形态结构特征、病原学诊断的操作方法;为了提高学生分析问题的能力,部分节后增加了病例资料和思考题,供学生自学和讨论。既注重“三基”训练,又具有科学性、启发性和实用性的特点,通过综合性实验和设计性实验以增强学生动手能力、思维能力和社会交际能力的培养。为配合双语教学的需要,本书增加了寄生虫虫卵、致病性幼虫、滋养体和包囊以及与致病有关的虫体形态结构的英文表述,并力求教材内容简明扼要、重点突出、图文并茂;部分节肢动物的外形特征配有彩图以增强直观感。

本书供临床、预防、基础、口腔、麻醉、影像、药学、检验、护理、法医、中医等专业使用。

图书在版编目(CIP)数据

人体寄生虫学实验指导 / 赵瑞主编. —北京:科学出版社,2013.2

国家级实验教学示范中心·全国高等院校医学实验教学规划教材

ISBN 978-7-03-036692-4

I. 人… II. 赵… III. 医学-寄生虫学-实验-医学院校-教学参考资料
IV. R38-33

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 026815 号

责任编辑:王 颖 李国红 / 责任校对:韩 楠

责任印制:肖 兴 / 封面设计:范璧合

版权所有,违者必究。未经本社许可,数字图书馆不得使用

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

新科印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2013 年 2 月第 一 版 开本: 787×1092 1/16

2013 年 2 月第一次印刷 印张: 6 1/4 插页: 1

字数: 141 000

定价: 19.80 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前　　言

人体寄生虫学是一门实践性很强的学科,故实验教学是教学过程中的重要环节。本教材根据教学大纲的要求,紧紧围绕培养目标,遵循“三基”(基本理论、基本知识和基本技能)原则,既注重“三基”训练,又很好地将实验技能与理论有机结合,同时将科学性、先进性、启发性和适用性贯穿全书;有利于医学生拓宽视野,增强创新意识。

为适应 21 世纪现代医学教育,有效地配合双语教学的需要,本教材增加了寄生虫卵、致病性幼虫、滋养体和包囊等与致病有关虫体的形态结构的英语表述,便于学生学习和掌握寄生虫学与相关医学专业英语词汇;有助于提高学生的医学英语水平。

在教学模式中采用将验证性的实验课改变为讲习课的形式先在实验室进行寄生虫各期形态结构和常见的病原学诊断方法操作教学;配合思考题启发学生思考人体是如何感染的,可能引起哪些病变以及怎样诊断和预防等问题。带着问题去听课,充分发挥学生主动学习的积极性。为适应教学模式的改变,本教材编写的内容具有很强的针对性和实用性,并力求教材简明扼要、重点突出、图文并茂。

本教材编入的综合性实验和设计性实验旨在培养学生综合分析问题和解决问题以及社会实践的能力。在部分节后所附的病例资料和思考题供学生自学和讨论,亦可作为病案式教学之用。常见的节肢动物外形特征配有彩图以增加视觉效果。

本教材是在全体编写人员共同努力下完成的,由于我们的水平有限,书中难免有不足和错漏之处,敬请同仁提出宝贵意见。

赵　瑞

2013 年 1 月 20 日

目 录

前言		
实验室规则	(1)	第五章 鞭毛虫 (46)
光学仪器的使用	(2)	第一节 杜氏利什曼原虫 (46)
实验报告的要求	(5)	第二节 阴道毛滴虫 (47)
第一章 线虫	(6)	第三节 蓝氏贾第鞭毛虫 (49)
第一节 似蚓蛔线虫	(6)	第六章 孢子虫 (51)
第二节 毛首鞭形线虫	(10)	第一节 疟原虫 (51)
第三节 蠕形住肠线虫	(11)	第二节 刚地弓形虫和隐孢子虫 (53)
第四节 钩虫	(13)	第七章 纤毛虫 (55)
第五节 丝虫	(17)	结肠小袋纤毛虫 (55)
第六节 旋毛形线虫	(19)	第八章 昆虫纲 (56)
第七节 其他线虫	(20)	第一节 蚊 (56)
第二章 绦虫	(22)	第二节 蝇 (60)
第一节 链状带绦虫	(22)	第三节 白蛉 (63)
第二节 肥胖带绦虫	(25)	第四节 蚤 (65)
第三节 细粒棘球绦虫	(27)	第五节 虱 (68)
第四节 多房棘球绦虫	(29)	第六节 蛲蠊 (69)
第五节 微小膜壳绦虫	(30)	第九章 蛛形纲 (71)
第六节 曼氏迭宫绦虫	(32)	第一节 蝉 (71)
第三章 吸虫	(34)	第二节 螨 (73)
第一节 日本裂体吸虫	(34)	第十章 实践技能 (77)
第二节 华支睾吸虫	(38)	第一节 综合性实验 (77)
第三节 卫氏并殖吸虫	(39)	第二节 设计性实验 (79)
第四节 布氏姜片吸虫	(41)	参考文献 (83)
第四章 叶足虫	(43)	附录 (84)
溶组织内阿米巴和结肠内阿米巴	(43)	彩图

实验室规则

- (1) 实验前必须预习实验指导,以明确本次的实验内容和要求。复习课堂讲授的有关内容。
- (2) 进入实验室必须穿白大衣,携带实习指导、笔记、彩色铅笔、小刀、小尺子、橡皮等一切实验用具。
- (3) 严格遵守实验室规则,不得迟到、早退或无故缺席,有病或有事应向任课教师请假。实验室内要保持清洁、肃静。关闭手机,禁止吸烟、高声谈笑或随便走动,以免影响他人实验。
- (4) 实验中要亲自动手,独立思考,要具有实事求是、耐心严肃认真的科学态度,防止依赖他人、怕脏、抄袭等不良现象,所有用的擦镜纸、铅笔屑、牙签等放到指定的污盒内或垃圾桶内。
- (5) 要爱护显微镜和标本。实验前,要认真检查所用仪器、标本等是否完好、齐全,如有缺损应及时向教师报告,不得随意调换仪器、标本等。标本及所用器材不慎损坏或遗失零件时应立即报告老师并登记,并按学校规定进行适当赔偿。
- (6) 实验时示教标本不得任意移动,观察镜下示教标本时可适当调节小螺旋,不得转动粗螺旋和移动器,以免所示标本移位,影响其他学生观察。
- (7) 作业要在规定时间内完成。绘图时应力求正确、客观、真实。写报告要简明扼要、重点突出、字迹清楚。
- (8) 实验完毕,显微镜和标本等一定放在指定地点,每次实验课结束后留值日生进行整洁工作。值日生应做好实验室清洁,关好门、窗、水、电后再离开。

光学仪器的使用

光学显微镜是观察人体寄生虫学形态的重要仪器之一,要熟练地掌握使用方法,合理应用光线,使所观察的标本达到最佳效果。实验室使用的光学仪器主要有放大镜、解剖镜、双目生物显微镜等,其操作、使用方法和注意事项介绍如下:

一、放大镜

用于观察体积较大的虫体。放大倍数为3~10倍。使用时手持放大镜对准标本的某一部位,然后远近移动放大镜直到看清标本结构为止。

二、单目解剖镜

放大倍数为10~30倍,标本放在载物台上,转动反光镜,将光对准标本后,调节粗螺旋,直到看清标本结构为止。

三、双目解剖镜

放大倍数为10~40倍。常用于观察节肢动物及某些蠕虫结构特征,并可在镜下解剖虫体或节肢动物。接目镜为10倍,物镜1~4倍根据观察对象适时转动调节。可调节目镜间距,使两眼同时看到物像。

四、生物显微镜

由接目镜、接物镜、载物台、聚光镜和调节器组成,使用时应根据标本的颜色、厚薄经常旋转调节器依次观察标本各层的结构特征。显微镜结构见图1。

1. **接目镜** 在镜筒上端和检查着眼睛接近,故称接目镜。放大倍数为5×、10×等。
2. **接物镜** 在镜体下端接近被检物体,故称接物镜,俗称镜头。根据放大倍数不同分别为低倍镜(10×或5×),高倍镜(40×或45×)和油镜(90×或100×)。
3. **载物台** 放置被检物品。
4. **移动器** 在镜体右下方,有上、下2个旋钮,扭动时可使载物台上的观察标本左右前后移动。
5. **聚光镜** 位于载物台左下方。电光源显微镜的聚光镜可上下移动即可调节光线的强弱。普通光学显微镜利用自然光线时,翻动凹、平面反光镜可聚集光线。
6. **亮度强弱调节器** 位于镜座右下方,前后推进可调节光线强弱。
7. **机械部位** 包括镜筒、镜臂、镜座、物镜转换器、载物台、粗细调节器等。

五、显微镜的使用

- (1) 打开开关。
- (2) 将标本置于载物台上,用低倍(10×)观察,转动粗调节器(粗螺旋)至看出物像。
- (3) 调节光线:寄生虫标本大小、厚度、透明度均有差异,除切片标本外,寄生虫标本均




图 1 光学显微镜的结构

为整封标本或玻片染色标本，故常常需要用聚光镜或光源调节器调节光线，但不可关闭光圈。

(4) 低倍镜转换高倍镜的方法：在低倍镜下找到要观察的物体后，需进一步观察层次结构时，可将此物移至视野中央，转换成高倍镜头($40\times$)，转动小螺旋，使恰能看清物体，若高倍镜头太长，则用粗螺旋使镜筒上升后，再转换镜头，然后用眼侧面看，将高倍镜头调节至几乎与玻片接触时，用一只眼睛靠近接目镜观察、一面旋转大螺旋，直至看清物体为止。

(5) 油镜的使用：在低倍镜下找到可疑物后，移至视野中央，滴加镜油于标本上，将油镜头对准油滴处眼从侧方观察，缓慢转动粗螺旋使镜头浸入油中接触到玻片表面，当心勿压破玻片，然后从目镜观察，用手缓慢地转动大螺旋至看出物像再转动小螺旋，使物像清晰为止，使用油镜时光线要强一些。

六、注意事项

(1) 显微镜种类不同，结构各异，使用时首先熟悉所用显微镜的结构与性能，否则在调焦时易损坏接物镜或损坏标本。

(2) 要认清低倍镜、高倍镜和油镜头的标志，否则会因选错而影响观察，甚至发生损坏镜头或标本的事故。

(3) 观察物体不清晰时，要检查所用镜头是否黏附污物或用擦镜纸滴加二甲苯擦净镜头后再观察。

(4) 观察不同平面上的结构：寄生虫标本均为立体的、有一定厚度，故需调节焦距才能看清不同平面上的结构。

(5) 亮度强弱与观察物体透光度的关系：厚的、不透光的、颜色较深的物体，要用较强的亮度(聚光镜上升，亮度调节旋钮向前推进)；较薄的、透明的或颜色较浅的物体，应用较弱的亮度(聚光器下降或光线调节器向后移动)。

(6) 观察悬液涂片时,切勿将镜台倾斜,以免液体外流污染载物台,也不可使镜头与液面接触,万一触及,应即刻用擦镜纸擦净。

(7) 观察时避免遗漏,镜下观察玻片标本时必须按一定方向循序进行按顺序寻找物体:观察涂片标本的视野移动顺序是从上到下,从左到右地依次渐进,观察完整个玻片,观察顺序见图 2。




图 2 视野移动顺序示意图

(8) 显微镜使用完毕后,移动物镜头成“八”字形摆放,关闭电源,套好镜罩,按指定地方放好。使用油镜观察标本后,要用擦镜纸滴加二甲苯擦净油镜头。

(李燕兵)

实验报告的要求

寄生虫学是一门实践性很强的学科,形态教学是该学科的重要内容。实验内容主要以观察寄生虫各期形态标本为主。同学们要真实准确地记录所观察的标本,这对正确掌握其形态特点,加强记忆至关重要。绘图作业是为了帮助学生准确地了解寄生虫形态结构特征,亦是主要的实验基本技能之一。为完成作业应做好以下几点:

- (1) 实验课前应准备好实验报告和绘图笔。
- (2) 通过老师的讲解,认真观察标本,把寄生虫的主要形态特征用绘图的方式真实地记录下来,力求层次清晰。
- (3) 铅笔线条图:无色或浅色标本应选择铅笔绘图,用铅笔勾画标本形态结构图时,线条要清晰、圆滑。
- (4) 彩图:染色或有颜色的标本按所观察的标本实际颜色绘制。
- (5) 按所视标本大小比例绘图,并且要注意标本的长宽比例和内部结构特征,真实、准确绘制;特别注意同类标本间的大小比例,例如,蛔虫受精卵与未受精卵,溶组织内阿米巴与结肠阿米巴包囊的大小比例等。
- (6) 所有绘图必须注字,用中文或英文注字时,一律用平行线引出注字。标本名称写在图的下方;如图3所示。
- (7) 画面要求整洁,字迹清楚。
- (8) 叙述部分应详细阅读所提供的资料,经认真思考后用钢笔或圆珠笔书写。




图3 蛔虫受精卵

(赵瑞)

第一章 线 虫

线虫(nematode)属于线形动物门,线虫纲。线虫种类较多,全球约有1万余种。大多营自生生活,广泛分布于土壤和水中;少数营寄生生活,寄生于人体的有180余种,其中常见或对人体危害较大的近30余种;例如,寄生于肠道的主要有蛔虫、钩虫、鞭虫和蛲虫,寄生于组织的有丝虫、旋毛虫等。

成虫虫体呈线形或圆柱形,前端钝圆,后端较细。雌雄异体,雌虫较雄虫大,雌雄虫体前端结构相同,后端雌虫尾部尖直,雄虫尾部向腹部卷曲或膨大呈伞状。内部器官有消化系统、生殖系统、神经系统和排泄系统。

虫卵形态因种各异,一般为椭圆形,淡黄色、棕色或无色。卵壳由卵黄膜、壳质层和蛔虫层组成,卵内含有卵细胞或含幼虫。

第一节 似蚓蛔线虫

似蚓蛔线虫(*Ascaris lumbricoides*)又称蛔虫(roundworm),成虫寄生于小肠,引起蛔虫病。

【目的要求】

- (1) 熟悉蛔虫成虫的外形特征和雌雄区别。
- (2) 掌握蛔虫卵的形态特征。
- (3) 了解蛔虫的内部结构。
- (4) 掌握粪便生理盐水直接涂片法的操作技术。

【实验内容】

(一) 示教标本

1. 蛔虫成虫(adult) 大体保存标本,肉眼观察。虫体呈圆柱形,两端较细,外形似蚯蚓。活时呈淡粉红色或微黄色,经10%甲醛固定后为灰白色。体表光滑,有极细的横纹,沿虫体的背、腹中线及两侧各有从头到尾的纵线,分别称为背线、腹线和侧线,其中以两条侧线最明显。虫体头端钝圆,头顶端可见有三叉形的口孔,在其周围3片唇瓣(labial palp)呈“品”字形的排列(图1-1),唇瓣内缘具细齿,外缘有感觉乳突和头感器。

蛔虫成虫为雌雄异体(heterosexuality),雌虫较雄虫粗大,雌虫长20~35cm,尾端呈圆锥形,阴门开口于虫体前中1/3交界处的腹面,此处较细。雄虫长15~31cm,尾端向腹面弯曲,有交合刺一对(图1-1)。

蛔虫唇瓣:切片封片制成,低倍镜观察;虫体顶端“品”字形唇瓣,背唇瓣较大,2个腹唇瓣较小,中间是口孔(图1-1)。

蛔虫成虫解剖标本:肉眼观察。主要为消化系统和生殖系统。

(1) 消化系统(digestive system):虫体正中纵行的粗大管状结构为消化系统,由口腔、食道、中肠、直肠及肛门组成。标本所见主要为中肠。

(2) 生殖系统(reproductive system): 生殖器官为细长、弯曲的管状结构, 各部分界线不明显。

1) 雄虫(male): 单管型, 末端较细部分是睾丸, 依次膨大为输精管、储精囊、射精管, 末端与直肠相连而成泄殖腔(cloaca), 开口于虫体后端的腹面, 1~2根交合刺自泄殖腔背侧伸出(图 1-1)。

2) 雌虫(female): 双管型, 末端较细部分为卵巢, 依次膨大为输卵管、子宫。两支子宫末端合并形成阴道, 开口于虫体腹面的阴门(图 1-1)。




图 1-1 蛔虫解剖图

2. 蛔虫卵(egg) 虫卵封片, 显微镜观察。

(1) 受精卵(fertile egg): 短椭圆形, 大小为 $(45\sim75)\mu\text{m} \times (35\sim50)\mu\text{m}$, 平均大小为 $60\mu\text{m} \times 45\mu\text{m}$, 卵壳厚而无色透明, 有3层组织组成, 自外向内依次为受精膜(fertilized membrane)、壳质层(chitinous)和蛔苷层(ascaroside)。卵壳外黏附一层由虫体子宫分泌物形成的蛋白质膜, 表面凹凸不平, 被宿主胆汁染成棕黄色, 卵内有一个大而圆形的卵细胞, 两端与卵壳之间有半月形空隙(图 1-2)(卵细胞发育分裂后此空隙不易看出)。

The fertile egg is broadly oval in shape, brown yellow in color, and an average size $60\mu\text{m}$ by $45\mu\text{m}$. The shell is thicker, transparent and consists of fertilized membrane, chitinous layer, ascaroside and covered by a membranous albuminous coat stained brown by bile. The content is a fertilized ovum. There is a new-moon shaped space at each end inside the shell.

(2) 未受精卵(unfertilized egg): 长椭圆形、棕黄色, 平均大小 $90\mu\text{m} \times 40\mu\text{m}$, 卵壳和蛋白质膜均较受精卵薄, 卵内含大小不等折光性很强的卵黄颗粒(图 1-2)。

The unfertilized egg is long broadly oval in shape, brown yellow in color and average size

90 μm by 40 μm , the shell and albuminous coat is thinner than those of fertilized eggs. Internally their structure consists of a mass of disorganized, highly refractile granules of various sizes.

(3) 感染性卵(infective egg):受精卵被排出体外,在外界适宜条件下,经一定时间,卵细胞分裂为多细胞期,最后发育为幼虫,卵内幼虫经蜕皮后成为感染性虫卵,其余结构与受精卵相同(图 1-2)。

The fertile eggs pass out of the body in the feces. The eggs are unsegmented and require favorable condition development of about three weeks until embryo is formed and to cast the skin within the egg and become an infective egg. The egg shell structure is like with fertile egg.

(4) 脱蛋白质膜卵(deprotein-coat):受精卵、未受精卵或感染性卵有时其外面的蛋白质膜可脱落,成为脱蛋白膜卵(图 1-2)。此时卵壳光滑,无色透明,镜下观察时光线应稍暗,注意与其他线虫卵区别。

Both fertilized and unfertilized eggs at time lack their outer albuminous coat is called deprotein-coat eggs.




图 1-2 蛔虫虫卵

3. 病理标本 蛔虫寄生于肠道造成肠梗阻和蛔虫钻入胆道的病理标本。

(二) 自看标本

1. 蛔虫成虫 保存标本肉眼或放大镜观察。注意观察横纹、纵线及雌雄的区别。

2. 蛔虫受精卵、未受精卵 虫卵封片,显微镜观察。先在低倍镜下找到棕黄色、椭圆形的虫卵,再转高倍镜仔细观察其结构特征,注意辨认两种虫卵形态结构的区别。

(三) 技术操作

以粪便生理盐水涂片法(feces direct smear method)为例。

1. 器材及试剂 载玻片、盖玻片、牙签、滴管、生理盐水。

2. 适用范围 检查蠕虫卵和原虫滋养体。

3. 操作步骤

(1) 在洁净载玻片中央滴一滴生理盐水。

(2) 用牙签挑取火柴头大小的粪便(约 0.1g)于玻片上的生理盐水中涂匀,使之成为半透明混悬液,挑取大块粪渣,涂片应小于盖玻片,厚薄适当,以透过涂片能模糊看到纸上印刷字迹为宜。

- (3) 加盖玻片。
- (4) 镜检: 先在低倍镜下寻找, 找到虫卵后, 将其移到视野中央, 转用高倍镜进一步仔细观察细微结构。

(5) 注意事项:

- 1) 镜检时观察视野必须按照从上到下、从左到右的顺序(图 1-3), 依次观察完一张涂片, 以免漏检。常规需检查 3 张涂片, 一张涂片检出率为 80%, 3 张涂片检出率可达 95%。




图 1-3 观察涂片示意图

2) 各种蠕虫卵均有一定的形态、大小、颜色、卵壳的厚薄、卵内容物等特征。但有时因虫卵的体位、死活及新鲜程度等原因而有颜色、结构的变化, 观察时必须分析后作出正确的判断。

3) 粪便中有许多与虫卵相似的杂质, 如食物残渣、空气泡、脂肪滴、白细胞、动植物细胞、酵母菌、淀粉颗粒等, 需与虫卵相鉴别。

【作业】

用彩色铅笔绘蛔虫受精卵、未受精卵的图, 并注明结构名称(注意 2 个虫卵的大小比例等)。

【课堂讨论或课外作业】

1. 调查材料 某地市内和市郊小学生中腹痛很常见, 当地疾病控制中心为了查明原因, 对 13 006 名小学生的粪便进行了检查, 结果 12 070 人查到了蛔虫卵, 小学生蛔虫感染率为 92%, 男女性别之间无显著性差异。

对感染蛔虫的小学生, 一律服驱虫药物进行治疗, 于治疗后 3 个月进行复查时, 发现 80% 的小学生又感染了蛔虫。为了彻底消灭蛔虫病, 便对小学校的环境和小学生的家庭环境及个人卫生情况进行了调查, 检查结果如下:

- (1) 市内厕所为蹲坑式, 厕所土壤中 100% 检查出蛔虫卵, 学生家庭室内土壤 56.2%、室外土壤 59.4%、教室土壤 40%、操场土壤 37.5%、街道土壤 46.8% 均查到蛔虫卵, 所查到的蛔虫卵中有 28%~100% 已发育为感染性虫卵。
- (2) 小学生洗手水中 24.4% 找到了蛔虫卵, 他们饭前便后洗手习惯比例很低。
- (3) 在西红柿、萝卜、菠菜等 11 种蔬菜上均查出了蛔虫卵, 且儿童有生吃瓜果蔬菜的习惯。
- (4) 市郊厕所无门, 内无蹲坑。有的小学生有随地大便的习惯, 当地施用的人粪便, 多未经无害化处理。

2. 思考题

- (1) 这份材料说明哪些问题? 应采取哪些措施才能迅速降低儿童感染率?
- (2) 结合蛔虫病流行因素来考虑农民及小学生蛔虫感染较重的原因是什么?

第二节 毛首鞭形线虫

毛首鞭形线虫(*Trichuris trichiura*),简称鞭虫(whipworm)。成虫寄生于人体盲肠内,引起鞭虫病。

【目的要求】

- (1) 认识鞭虫成虫的形态特征。
- (2) 掌握鞭虫卵的形态特征。

【实验内容】

(一) 示教标本

1. 鞭虫成虫 保存标本,肉眼观察。虫体外形似马鞭,前3/5细长,后2/5粗圆,虫体后端可见肠管及生殖器官。雌虫长35~50mm,尾端钝圆,阴门位于虫体粗大部前方的腹面,肛门位于虫体末端。雄虫长30~45mm,尾端向腹面呈螺旋状卷曲,有交合刺1根(图1-4),藏于可伸缩的交合刺鞘内。雌雄虫的生殖系统均为单管型。




图1-4 鞭虫成虫和虫卵形态图

2. 鞭虫卵 虫卵封片,显微镜观察。虫卵呈纺锤形或腰鼓形,大小为 $(50\sim54)\mu\text{m}\times(22\sim23)\mu\text{m}$,棕黄色,卵壳较厚,两端各有一个透明塞状突起称盖塞(opercular plug)。虫卵随粪便排出时,卵内有一个尚未分裂的椭圆形的卵细胞。

The egg is typically barrel or spindle in shape, $50\mu\text{m}\times20\mu\text{m}$ in size. It is brownish and has a translucent polar plug at either ends. The double-shelled egg containing an unsegmented cell when freshly passed in the feces.

3. 鞭虫寄生于盲肠的大体病理标本 虫体前端钻入肠黏膜,后段游离于肠腔。

(二) 自看标本

1. 鞭虫成虫 保存标本,肉眼观察。
2. 鞭虫卵 虫卵封片,显微镜观察。

【课堂讨论或课外作业】

1. 病例资料 患儿,女性,13岁,因“反复上腹疼痛3年”就诊。3年前,患儿无明显诱因出现上腹痛,伴恶心呕吐,无腹泻,喜按,能忍受。经抗感染、制酸、利胆、解痉等治疗,病情无明显好转。近来患儿腹痛发作频率增加,腹痛时疼痛难忍,大汗淋漓,急诊以“腹痛待诊”入院。患病以来患儿精神萎靡,食欲不振,睡眠较差。查体:腹平软,上腹压痛,肌紧张。血常规:WBC $5.0 \times 10^9/L$, N 0.45, L 0.39, M 0.16。给予对症治疗后病情无好转,遂进行肠镜检查:在回盲部发现两条长约2cm的白色鞭形线虫。给予阿苯达唑治疗后病情迅速缓解。

2. 思考题

- (1) 鞭虫病的临床症状有哪些?
- (2) 鞭虫病常用诊断方法是什么?

第三节 蠕形住肠线虫

蠕形住肠线虫(*Enterobius vermicularis*),又称蛲虫(pinworm)。成虫寄生在人体盲肠、阑尾、结肠等处,可引起蛲虫病。

【目的要求】

- (1) 掌握蛲虫成虫和虫卵的形态特征。
- (2) 了解蛲虫卵的检查方法(透明胶纸法和棉签拭子法)。

【实验内容】

(一) 示教标本

1. 蛲虫成虫 保存标本,肉眼观察。虫体细小,呈线头状,乳白色。雌虫长为8~13mm,宽为0.3~0.5mm,虫体中部膨大,尾端直而尖细,其尖细部分约为虫体长度的1/3,生殖系统为双管型,子宫内含有虫卵,阴门开口于虫体前1/3腹面,肛门位于虫体后1/3与中1/3交界处。雄虫较小,长2~5mm,宽0.1~0.2mm,尾端向腹面卷曲呈“6”字形,生殖系统为单管型,末端有1根交合刺(图1-5)。雄虫在交配后即死亡,一般不易见到。

2. 蛲虫成虫 玻片染色标本,显微镜观察。

(1) 头翼(cephalic alae):虫体头端角皮向两侧膨大形成头翼,上具横纹。

(2) 咽管球(esophageal bulb):咽管细长,末端膨大呈球形,称咽管球。




图 1-5 蛲虫成虫和虫卵形态图