

藥物圖攷

下

楊華亭著

藥物圖考

陳立夫



中華民國二十四年八月出版

藥物圖考

定價銀五元

(國外酌加郵費)

著者 山東牟平楊華亭

出版者 中央國醫館

南京門東長生祠一號
電話 二三四七二

印刷者 仁德印刷所

南京常府街十六號
電話 二二三一

版權所有
翻印必究

藥物圖考卷四目錄

黃耆		一	三七		三八
黃芩		四	元參		四一
玉竹		七	苦參		四四
黃精		一一	知母		四七
鈎吻		一五	貝母		四九
桔梗		二〇	芎藭		五三
赤箭		二三	補骨脂		五五
秦艽		二七	益智子		五七
柴胡		二九	蛇牀子		六〇
獨活		三二	牡丹		六三
防風		三六	紫蘇		六五

莎草根……………六八

葶藶……………七〇

紫葳……………七二

葦撥……………七四

決明子……………七五

羊躑躅……………七八

蜀椒……………八〇

連翹……………八二

牛膝……………八六

虎掌……………八八

常山……………九三

蜀漆……………九三

甘遂……………九五

商陸……………九八

大戟……………一〇一

澤漆……………一〇一

瓜蒂……………一〇四

射干……………一〇六

芫花……………一〇九

葇荑子……………一二

藥物圖考卷五目錄

葛根……………一

何首烏……………五

威靈仙	七
忍冬	一〇
石斛	一二
烏藥	一六
厚朴	一八
皂莢	二〇
枳實	二三
五加皮	二七
蔓荊實	二九
桃核仁	三二
吳茱萸	三五
延胡索	三七

肉蓯蓉	三九
鬱金	四一
蓬莪茂	四三
京三稜	四五
藿香	四七
車前子	四八
菴蔚子	五〇
茵陳蒿	五四
旋覆花	五六
牛蒡子	五九
菟絲子	六一
茜根	六三

防己	六六	款冬花	九三
澤瀉	七〇	紫苑	九五
酸棗	七二	通草	九七
絲瓜	七五	敗醬	九九
薯蕷	七七	葶藶	一〇一
梔子	八〇	土茯苓	一〇三
赤小豆	八二	夏枯草	一〇六
豆豉	八四	白蘚	一〇七
薏苡仁	八六	茅根	一〇九
大棗	八七	麒麟竭	一一〇
瞿麥	九〇	白芷	一一二
白芨	九二	薤	一一三

澤蘭	一二六
白頭翁	一一九
秦皮	一二三
王瓜	一二五
冬葵子	一二七
王不留行	一二九
蕭蓄	一三一

藥物圖考卷六目錄

棟實	一
訶梨勒	三
高良薑	五

地膚子	一三二
葫蘆巴	一三四
山豆根	一三五
使君子	一三七
辛夷	一三八
沉香	一四〇
海藻	一四三
昆布	一四五

丹參	七
艾葉	九
簞竹葉	一四

粳米	一七	白前	四〇
郁李仁	一八	白薇	四一
梅實	二〇	大小薊根	四三
木瓜	一二	黃蘗	四六
山楂	二四	桑根白皮	四九
龍眼	二六	豬苓	五一
藕實莖	二九	乾漆	五二
紫花地丁	三一	續斷	五三
糯豆	三三	紅花	五六
蝦蟆草	三五	牽牛子	五九
野波菜	三七	萊菔根	六一
百部	三八	青蒿	六三

鈴羊角	犀角	石鐘乳	花蕊石	鉛丹	禹餘糧	滑石	雄黃	五色石脂	丹砂	代赭石	飴餱	鹿茸	鹿角膠	鹿角	牛黃	阿膠	龍骨	龜甲	鱉甲	鯪鯉甲	蝦蟆	蜃虫	蟲虫
.....																							
八三	八一	七九	七八	七七	七五	七四	七三	七一	六七	六六	六五	八六	八七	八七	九二	九四	九六	九九	一〇一	一〇二	一〇五	一〇八	一〇九

烏賊骨		一一一
石決明		一一三
牡蠣		一一五
文蛤		一一八
鷄內金		一一九
蜂蜜		一二〇
桑螵蛸		一二一
蟾蜍		一二三
木蠹		一二四
蜈蚣		一二五
蠍		一二七

蚯蚓		一二八
螻蛄		一三〇
鼠婦		一三一
蜣螂		一三二
白殭蠶		一三四
蛤蚧		一三六
蝮蛇		一三七
白花蛇		一三八
冬虫夏艸		一四〇
蛻皮		一四一

中央國醫館
醫藥叢刊之一

藥物圖考卷四

編審委員楊華亭撰述
編審委員周柳亭校訂

黃耆

本草經

黃耆味甘微溫主癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾五痔鼠瘻補虛小兒百病一名戴糝

名醫別錄

無毒婦人子藏風邪氣逐五臟間惡血補丈夫虛損五勞羸瘦止渴腹痛洩痢益氣利陰氣生白

水屬四川松
潘縣東境

者冷補其（莖葉）療渴及筋攣癰腫疽瘡一名戴糝一名獨糝一名芰草一名蜀脂一名百本

生蜀郡山谷白水漢中二月十月採陰乾

陶弘景

第一出隴西洮陽

在甘肅臨
潭縣西南

色黃白甜美今亦難得次用黑水宕昌

在甘肅
岷縣南

者色白肌理粗新者亦甘溫

補又有蠶陵白水者色理勝蜀中者而冷補又有赤色者可作膏貼用消癰腫俗方多用道家不須

唐本草

此物業似羊齒或如蒺藜獨莖或作叢生今出原州

今甘肅
鎮原縣

及華原

今陝西
耀縣

者最良蜀漢不復採用之

圖經本草

黃耆生蜀郡山谷白水漢中今河東陝西州郡多有之根長二三尺已來獨莖或叢生枝幹去地
二三寸其葉扶疎作羊齒狀又如蒺藜苗七月中開黃紫花其實作莢子長寸許八月中採根用其皮折之

如綿謂之綿黃耆然有數種有白水耆有赤水耆有木耆功用並同而力不及白水耆木耆短而理橫今人多以苜蓿根假作黃耆折皮亦似綿頗能亂真但苜蓿根堅而脆黃耆至柔韌皮微黃褐色肉中白色此爲異耳（下畧）

重廣補注神農本草

黃耆本出綿上者爲良故名綿黃耆非謂其柔韌如綿也今圖經所繪憲州者地與

綿上相隣也

華亭述言

【產地】 產於甘肅四川陝西等處

【形態】 豆科黃耆屬多年生草本葉互生羽狀複葉每小葉長橢圓形秋日由葉腋抽出花莖開唇形花冠色黃

紫結實成莢長寸許其根長約二三尺徑約半寸外皮微黃內白心黃體柔軟

【主治】 入藥用根無毒無臭味甘主和氣血虛勞怯症失血虛脫漏汗鼠瘻痔瘡逐惡血消癰疽排膿止痛

【考證】 凡身無疾苦惟體虛易汗出者係氣排滯過度所致以黃耆服之可阻其過於排滯之弊所謂和氣固表

之功也故於氣虛貧血者爲常用之藥本經主「癰疽久敗排膿止痛」蓋黃耆爲瘍科聖藥於瘡之初程紅腫而血液與肌肉未化膿時有阻炎止痛消腫之功如已化膿有速於攻破推陳致新之力若至末期有

免腐生肌之功在失血虛脫與瘍科均宜足分劑本經主「大風癰疾」卽今之麻風此患頗難治愈而於主治之藥亦寥寥無幾本草補遺於大楓子條云「粗工治大風病佐以大楓子油」今西醫提淨其油以作注射麻風之用雖見其功然不能爲特效良藥本經黃耆是否有効未會試驗然於他類瘡瘍實爲良藥藥徵云黃耆主「肌表之水故能治黃汗盜汗皮水又旁治身體腫」金匱用黃耆約七方傷寒論中無之而王好古云「治傷寒尺脈不至」究傷寒尺脈不至不知病竈現於何經以致尺脈不至而黃耆能醫之耶蓋金元之醫學多不究藥性好作玄虛圖經云「今人以苜蓿根假作黃耆」考苜蓿係二年生草其葉爲三小葉構成根細長一二尺微如黃耆根其質瘦而堅味苦黃耆體柔軟味甘爲異

【修治】

採於秋末洗去泥土切厚片陰乾收藏勿洩氣此藥易蛀李時珍云「槌扁以蜜炙數次以熟爲度亦有以鹽湯潤透蒸熟切用者」由斯則備要卽云「入補中藥槌扁密炙達表生用」從新又云「入補中藥槌扁



密炙如欲其稍降鹽水炒」試問以密炙之即可改黃耆性之不行於表耶以鹽水炒之即能制其不升而降耶若如此則患虛症者須服蜜患升症者須服鹽吾國醫藥學如前人妄語而後學不究即能隨聲附會良可慨矣

【分劑】煎服一至二兩

黃芩

本草經

黃芩味苦平主諸熱黃疸腸澼洩痢逐水下血閉惡瘡疽蝕火瘍一名腐腸

名醫別錄

大寒無毒療痰熱胃中熱小腹絞痛消穀利小腸女子血閉淋露下血小兒腹痛一名空腸一名

內虛一名黃文一名經芩一名妒婦其子主腸澼膿血生秣歸今湖北秣歸縣川谷及冤句三月三日採根陰乾

陶弘景

秣歸屬建平郡今第一出彭城鬱州亦有之圓者名子芩爲勝破者名宿芩其腹中皆爛故名腐腸惟

取深色堅實者爲好俗方多用道家不須

圖經本草

黃芩生稀歸山谷及冤句今川蜀河東陝西近郡皆有之苗長尺餘莖幹僂如筍葉從地四面作

叢生類紫草高一尺許亦有獨莖者葉細長青色兩兩相對六月開紫花根黃如知母蘆細長四五寸二月

八月採根暴乾用之（下畧）

化學實驗新本草

（日本學說）黃芩漢醫頗珍重之稱爲有清涼解熱利尿之効豬子氏因漢醫珍重

黃芩苦於不明其理由高橋學士發見一種結晶性物質附以（スクテリン）之名稱然於治療上無特殊之作用黃芩果爲有效與否暫時尙爲一疑問而已（中畧）和漢藥考用爲清涼解熱藥用量二、〇

至六、〇

華亭述言

【產地】產於山東河南等處

【形態】唇形科黃芩屬多年生草本莖高尺許葉對生披針形無柄秋初枝端開唇形花冠色粉紫二強雄蕊雌

蕊一枚總狀花序結實呈蓋果上殼如僧帽下殼如瓢秋末僧帽脫去惟瓢僅留枝上內含種子一至四粒色藍黑小如粟米之半其根長尺許徑數分外皮棕黑內黃

【主治】入藥用根無毒無臭味苦平主熱病肺炎痰盛膿黃清胃熱消食肝瘀血燥黃疸腸澼調經閉產後血燥

惡瘡火瘍紅腫

【考證】陶氏以質堅未枯者名子芩綱目名條芩陶氏云破者名宿芩以內爛者名腐腸別錄名空腸李東垣名

片苓備要與從新名枯苓考黃苓破裂處皆在首段由破裂而內爛者多在中段其內未枯者多在中末二段蓋陶氏所名之子苓宿苓腐腸係一根有枯實之別非一株空者純空而實者純實也李東垣以片苓治肺火以條苓治大腸火備要與從新皆從其說實無聊之甚者也此藥總主清熱本經與別錄皆未嘗以枯實分別主治也若受邪熱於枝氣管炎致津液缺乏生膿黃之痰於方內重用黃苓半至一兩取效甚速故別錄首言「療痰熱」李時珍云「予年二十時因感冒欬嗽既久且犯戒遂病骨蒸發熱膚如火燎每日吐痰盈許暑月煩渴寢食幾廢六脈浮洪遍服紫胡麥門冬荆瀝諸藥月餘益劇皆以爲必死矣先君以黃苓一兩水二鐘煎一鐘頓服次日身熱盡退而痰皆愈」其說甚是東醫豬子氏云「漢醫珍重黃苓苦於不明其理由」考東醫所用分劑二至六瓦係五分二釐至一錢五分六釐如此微劑欲解極熱之症實如杯水車薪耳此藥無毒不妨重用黃苓治肝癰（肝變硬）頗效宜與硝砂鮮蒲公英大黃丹砂牛黃苦參等藥酌用此症初程肝之包膜下或見瘀斑門靜脈盈血則肝殊受壓結締組織增多其體消瘦故變硬此病多顯黃疸症本經黃苓主黃疸逐水下血閉故與肝變硬症用之有效此症初顯消化不良嘔血面皮微黃形容枯瘦目凹含淚鼻頰處之小靜脈顯擴張尿常少酸鹽多至重即患大腦症或驚呼或昏迷或譫語此症嗜酒者患之頗多治之宜早金匱用黃苓約十四方傷寒論約十五方