

丁氏醫學叢書

司氏眼科
克氏耳科學

上海

英界泥城橋西靜安寺路三十九號

醫學書局發行

丁氏醫學叢書

司氏眼科學
克氏耳科學

上海

英界泥城橋西靜安寺路三十九號
醫學書局發行

中華民國七年一月付印
中華民國七年四月出版

(司氏眼科學)
(克氏耳科學)

每部大洋三角

編譯者

無錫丁福保

總發行所

上海英界靜安寺路三十九號
醫學書局

分售處

上海棋盤街
商務印書館

上海棋盤街
掃葉山房

各省分售處

各埠商務印書館
各埠掃葉山房

司氏眼科學

目錄

眼瞼炎或眼瞼脂腺炎及眼瞼	濕疹	麥粒腫	急性淚囊炎	慢性淚囊膿漏	結膜加太流	結膜急性膿漏	結膜格魯布及實布的里性炎	結膜外傷
一	一	三	三	三	四	六	七	七

結膜肉芽症	結膜顆粒症	結膜及角膜匍行疹	角膜潰瘍	間質(實質)角膜炎	角膜混濁	角膜擴張症	鞏膜炎	前房出血	瞳孔散大
八	八	十	十	十一	十一	十二	十二	十三	十三

虹彩毛樣體炎·····	十四
脉絡膜炎網膜炎神經炎	十五
睫炎·····	十六
化膿性全眼球炎·····	十七
綠內障·····	十七
硝子體混濁及硝子體出血·····	十七
弱視·····	十八
眼筋麻痺·····	十八

司氏眼科學

無錫丁福保仲祐編譯

●眼瞼炎或眼瞼脂腺炎及眼瞼濕疹 Blepharitis seu Blepharadenitis
und Ekzem der Lider.

存腺病或梅毒者。與以特效藥。又當於同時施皮脂漏之治療。以溫湯濕痂皮。注意除去之。而貼プルンス氏棉花。當避皮膚之乾燥。存梅毒及潰瘍性眼瞼炎及眼瞼緣之浸潤者。當注意其起因於一種之特異病毒與否。而定治療之方針。然後塗擦左方。

處方 黃降汞 〇・〇五—〇・一 華攝林 五・〇

右善使混合。爲眼瞼軟膏。

右朝夕塗擦於眼瞼緣。

眼瞼于同時存濕疹者。用左方。

處方 撒里矢爾酸 一、〇 酸化亞鉛 五、〇

澱粉 五、〇 純華攝林 一〇、〇

右混合爲軟膏。爲眼瞼軟膏。

眼瞼緣既存急性發疹。同時於眼瞼皮膚復起急性濕疹者。用左方。

處方 官粉 〇、二 純華攝林 一〇、〇

右混和爲眼瞼軟膏。

處方 新製ノベブラ氏單鉛軟膏 一〇、〇

右爲軟膏。

以上最後之軟膏。攤於眼鏡硝子大之麻布片。而從其中央截斷。貼於兩眼瞼。以繃帶固定爲最宜。

潰瘍性眼瞼炎。注意除去病的睫毛。於潰瘍面。以硝酸銀桿之尖頭摩擦之。而塗布ヘブラ氏軟膏。

於睫毛之毛蟲。用左方。

處方 灰白水銀軟膏 豚脂 各五、〇

右混和爲軟膏。塗擦於睫毛。

●麥粒腫 *Hordeolum*.

施單純溫罨法。或貼鬻布。當趁蚤時截開。遺硬結者。用黃降汞軟膏。

●急性淚囊炎 *Dacryocystitis acuta*.

急性淚囊炎。先於淚囊部加壓。試膿之排泄。有時以圓錐形消息子。擴張下小淚管之後。施上記之法。

淚鼻管中插入ボウマン氏消息子之法。不可行。

初期試冰罨法。經二三時。腫脹不著減退時。換鬻布而催進化膿。令其自然穿孔。或現波動時。可截開而排出其膿。膿尙存在之間。於開口部插入細護謨管。或狹綿紗線條。防其閉鎖。穿孔後。二三時間。當施溫罨法。

經手術後久之。而截開之癰痕周圍之皮膚尙浸潤時。貼水銀硬膏。有良効。
在急性淚囊炎之極初期。可試施壓迫繃帶。而防其化膿。

●慢性淚囊膿漏 *Blennorrhoea sacci lacrymalis chronica*.

注意於原因的事項而剷除之。內眥中撒布沃度仿謨，預裂下淚管之後，可施揮入ボウマン氏消息子於淚鼻管之法。消息子插入後，於全組織發知覺過敏。於粘膜炎起劇甚之腫脹時，一日二回行溫罨法，有佳効。

●結膜加太流 Calarthus Conjunctivae.

注意于原因的疾患。如淚囊膿漏、異物、衰弱的障礙、或眼瞼炎等。總之外來之有害事件。例如喫煙、塵埃、不潔空氣充滿之居室、摩擦等。當避之。於劇甚之刺戟症。塗布左方。

處方 硝酸銀 〇・二 蒸餾水 一〇・〇

右混和塗布於結膜。

右塗布之後。以淨水或二%食鹽溶液。洗滌結膜。而後再以淨水善洗之。刺戟症最劇甚時。以左方點眼。

處方 硫酸亞篤魯比涅 〇・〇五 蒸餾水 五・〇

右混和爲點眼水。(醫士用)

於如此症。廢塗布。却可施左方之罨法。

處方 鉛醋 一、〇 蒸餾水 一〇〇、〇

右混和爲罨法料。(當貯於冰塊或新吸水中。冷其溶液。)
朝夕施半時間之罨法。罨法中。使勉交換布片而常要冷。
慢性症 炎症症狀僅微。唯分泌物爲多量。而毫不存肥大者。用左方。

處方 硫酸亞鉛 〇、一 蒸餾水 五〇、〇

右混和爲點眼水。

處方 硼酸 三、〇 蒸餾水 一〇〇、〇

右混和爲洗眼料。

結膜之業已存肥大症者。塗布一%硝酸銀溶液。
伴眼瞼炎一側之陳舊加太流。注意於淚囊膿漏。
乾性加太流。於晡時可於眼瞼緣敷左方。

處方 華攝林 五、〇 老利爾水 五滴

右混和爲軟膏。

或撒布左方。

處方 沃度仿謨細末 五、〇 「クマリン」 〇、一

右混合爲撒布藥。

● 結膜急性膿漏 *Blephorrhoea acuta conjunctivae*.

唯一眼發病時。以格魯胃謨或絆創膏繃帶。保護健眼。若爲皮膚知覺過敏而不能兩施。或業已有發病之狀況者。以塗布純脂肪之布片。被覆於眼。可以善良適合之繃帶壓定之。

分泌物之蓄積者。以過滿俺酸加里水。晝夜勉自洗滌結膜囊。以一%—二%硝酸銀溶液。塗布於結膜一二回。

塗布硝酸銀溶液之後。一時半乃至二時間。當施冰罨法。

如全眼瞼之板硬浸潤者。唯施冰罨法。以亞篤魯比涅點眼。與貼水蛭（六條至八條）於顴顙部。

眼瞼之腫甚時。從ステルワーク氏法。施斜形眼瞼截開術。即直以剪刀。從外眥截斷連合部於下外方。

術者及介者當用眼鏡。防傳染於病毒之眼。

分泌物業已減少。而形成潰瘍伴虹彩脫垂時。塗布硝酸銀溶液後經。一時貼繃帶。而當屢屢交換。

當用意於日常食餌及便通之整調。

●結膜格魯布及實布的里性炎 *Croup und Diphtheritis der Conjunctiva*.
眼瞼之甚腫脹者。施冰罨法。以亞篤魯比涅點眼。於末期。塗布硝酸銀溶液。

●結膜外傷 *Trauma conjunctivae*.

存異物者。除去之。以煉石灰而被腐蝕者。注意以乾麻布片。清潔結膜囊。(不可用水)以濃厚砂糖溶液點眼。又以亞篤魯比涅點眼。而加繃帶。
起眼瞼癒着之始。一日二回可裂以消息子。

由於弱酸輕度之腐蝕者。清潔結膜囊。以亞篤魯比涅點眼。然後塗布油而加繃帶。由於劇甚之刺戟症者。一二時間施冰罨法。由於昇汞之腐蝕者。行嚴重之冰罨法。
由於侵入角膜之異物。以古加乙涅點眼。而以內障眼針。除去異物。注意勿搔傷角膜。然後施沃度仿謨繃帶。存刺戟症者。以亞篤魯比涅點眼。施保護繃帶。隔離患者。患者之襪布手巾等。必一定而漫無他用。并於存進行性角膜潰瘍者亦然。

●結膜肉芽症 Granulationes conjunctivae.

結膜肉芽症。爲於手術後或結膜囊穿孔之小疹之後特發者。而其治方以阿片泊芙藍丁幾反覆點眼爲最宜。有時於制腐法下。以剪刀除去。

●結膜顆粒症 Trachom.

預防傳染。

在於初期。每常塗布二%硝酸銀溶液。

在於末期而分泌物少量者。可以硫酸銅結晶之平面摩擦之。然存角膜潰瘍時。決不可用。

存結膜眼病者。於不得已之時。塗布硝酸銀溶液。否則用硫酸銅結晶。存強劇之刺戟症或角膜潰瘍者。廢結膜之治療。而以亞篤魯比涅點眼。有時貼以繃帶。

如右處置而角膜之潰瘍作用增進時。塗布一%硝酸銀溶液於結膜。一時之後。以亞篤魯比涅點眼。貼以繃帶。

同時存「ハンス」或角膜表層炎者。無殊異之治方。唯陳舊之混濁者。特施治療。（見角膜混濁條下）

無肉芽形成。癰痕顆粒症者。施左方。以硫酸銅摩擦時。每無特殊之功效。

施溫罨法。而軟化組織。一二日之後。輕於結膜摩擦。較有佳効。有陳舊之癰痕及羞明之結膜及角膜乾燥症者。用左方。

處方 沃度仿謨 〇、五 油酸 一〇、〇 華攝林 適宜

右混和爲軟膏。一日一回塗擦豌豆大於結膜囊。

又塗敷「イエキイリチ」浸。

處方 「イエキイリチ」浸(五、〇) 一〇〇、〇

右爲塗布料。

據ステルワーク氏之經驗。此法毫無佳効。患顆粒之人。與集會於一處之人。以有傳染之危險。當注意。

近時於顆粒症性結膜。如在陳舊症。賞用塗擦弱昇汞溶液(一與二〇〇〇)之法。然據ステルワーク氏及ヒフツクス氏等之經驗。此法比從前使用之藥物。無可賞之價值。

●結膜及角膜匍行疹 Herpes conjunctivae et corneae.

以亞篤魯比涅點眼。且施繃帶。

遠諸般之有害事項。且整調食餌。於虛弱之小兒。用「マラガ」酒、冷水摩擦法時。行海水浴。又注意於眼瞼濕疹及眼瞼炎。當治療之。（見同條下）

●角膜潰瘍 Ulcus corneae.

以亞篤魯比涅點眼。而施繃帶。潰瘍占居於角膜之末梢位置。且有穿孔之危險。或業已穿孔者。以「エゼリン」（一％）點眼。而施繃帶。且令就床安臥。

潰瘍波及於深部者。亦同令安臥。

潰瘍之存於角膜中心末梢及中帶部等時。以亞篤魯比涅點眼爲宜。在於腐敗性潰瘍。不可不除去腐敗之根源。於淚囊膿漏。挿入消息子。及內眥撒布沃度仿謨。而治療之。

同時有結膜病。（例如顆粒症）塗布一％硝酸銀溶液於結膜。然後經半時以亞篤魯比涅點眼。而施繃帶。唯分泌物之多量者。禁繃帶。於斯症用過滿俺酸加里水。或硼酸水。（二％—三％）不可施冷水洗滌法。

腐敗之原因。不可證明時。以上記之溶液。洗滌結膜囊。或撒布沃度仿謨。於潰瘍之進行甚速者。可用烙鐵。或施角膜穿開術。潰瘍之難治癒者。或於強劇之眼痛。施溫罨法。或濕溫罨法。一日二回乃至三回後。可易新者。有鬼眼及角膜乾燥症之角膜潰瘍。以蘸於油之布片爲繃帶。有時以絆創膏線條。閉鎖眼瞼破裂。

●間質(實質)角膜炎 Keratitis interstitialis (Parenchymatosa.)

以亞篤魯比涅點眼而施繃帶。然有角膜平坦之危險時。不可施繃帶。行溫罨法。刺戟減少時。施按摩法。

存先天梅毒者。施昇汞浴「ハルレ」沃度水塗擦療法。等之驅梅毒法。(見脉絡膜炎條下)

於虛弱且營養不良之小兒。與結膜炎及角膜匐行疹。施同一之治方。(見同條下)角膜混濁未全掃除者之治方。參照角膜混濁條下。起眼球萎縮。危險之時。今尙往往施行虹彩截除術。

●角膜混濁 Hornhauttrübungen.

淺表之混濁。用左方。

處方 甘汞 五、〇

右善爲研磨細末。爲撒布料。（決不可委於患者之手）

撒布甘汞者。以毛筆撒布粉末之細粉於角膜上。而外用甘汞之時。決不可於同時內用沃度劑。

處方 黃降汞 〇、〇五—〇、一 華攝林 一〇、〇

右混合爲軟膏。塗擦於結膜囊。

深混濁而猶有回復之望者。施黃降汞軟膏。與單按摩法。一日行二回至三回溫罨法。每回可至半時至一時。

●角膜擴張症 Keratoektasie.

從「パンヌス」來者。施壓迫繃帶。同時存眼內壓亢進時。以「エゼリン」或「ピロカルピン」(1%)點眼。

●鞏膜炎 Scleritis.

(甲) 癰麻質斯性鞏膜炎。以棉花溫包頭部。室溫須平等。以亞篤魯比涅點眼。處以左