

增注類證活人書卷十六

此一卷載雜方大率仲景證多而藥少使皆如仲景調理既正變異不生則麻黃桂枝青龍用之而有餘以後世望聖人難矣仲景藥方缺者甚多至如陰毒傷寒時行溫疫溫毒發斑之類全無方書今採外臺千金聖惠金匱玉函補而完之凡百有餘道以證合方以方合病雖非仲景筆削然皆古名方也譬猶周易參同華嚴合論步驟馳騁不外乎聖人之意又況俗學久矣一旦革之悉用古法即陽春白雪復生謗毀適足以杜絕治法今撥歸經絡裁減湯劑參以雜方庶幾庸人易曉日就月將辛甘發散酸苦湧泄之術行即俗方不革而自寢矣此余所以載雜方之意也又況五積散敗毒散升麻湯姜黠湯之類縱治不對病用之或差亦無所害載之卷末以俟采擇

升麻湯一治傷寒中風頭痛憎寒壯熱肢體痛發熱畏寒鼻乾不得睡兼治小兒大人瘡疹已發未發皆可服兼治寒暄不時人多疾疫乍暖脫著及暴熱之次忽變陰寒身體疼痛頭重如石者

升麻

白芍藥

甘草

炙

乾葛

各等分

右劉如麻豆大每服五錢以水一盞半煎至八分去滓溫服若大段寒即熱服若熱即溫服瘡疹亦准此服藥已身涼止藥小兒量度多少服如老兒喫去芍藥加柴胡一兩人參半兩雪白芍藥一分

防風白朮牡蠣湯 二治發汗多頭眩汗出筋惕肉瞤

防風

獨莖者去蘆頭

牡蠣粉

炒黃

白朮

等分

右搗羅為細末每服二錢以酒調

下米飲亦得日進二三服汗止便服小建中湯

李根湯 三治氣上衝正在心端

半夏

湯洗半兩

當歸

一分

芍藥

一分

茯苓

一分

桂枝

一兩

黃芩

一分

甘草

炙一分

甘李根白皮

二合

右劉如麻豆大每服抄五錢七生姜四片水一盞半煎至八分去滓溫服

大橘皮湯 四動氣在下不可發汗發汗則無汗心中大煩骨節疼痛目運惡寒食則

反吐穀不得入先服大橘皮湯吐止後服小建中湯

橘皮

一兩半去皮

甘草

半兩炙

人參

一分

竹茹

半升

右劉如麻豆大每服五

錢生姜四片棗子一枚以水二鍾煎取一盞去滓分二服

橘皮竹茹湯 五治噦逆

橘皮 二兩

竹茹 一升

甘草 二兩

人參 半兩

半夏 一兩

右剉如麻豆

大每服五錢 生姜六片 棗子一枚 以水二大盞 煎至一盞 去滓 溫服 日進三服

生姜橘皮湯

治乾嘔噦若手足厥冷者

橘皮 四兩

生姜 半斤

右剉如麻豆大 水七盞 煎至三盞 去滓 溫服 一盞

陰旦湯

治傷寒肢節疼痛 內寒外熱 虛煩

芍藥 二兩

甘草 二兩

乾薑 三兩

黃芩 三兩

桂 四兩

右剉如麻豆大 每服抄五錢 棗二枚 水一盞 半煎至八分 去滓 溫服 日三夜二

陰毒甘草湯 治傷寒初得病 一二日便結成陰毒 或服藥六七日已上 至十日變

成陰毒 身重背強 腹中絞痛 咽喉不利 毒氣攻心 心下堅強 短氣不得息 嘔逆唇青

面黑四肢厥冷 其脉沉細而疾 仲景云 此陰毒之候 身如被杖 喉咽痛 五六日可治

至七日不治

甘草 炙

升麻

當歸 各二

雄黃 一分

桂枝 二兩

鱉甲

一兩 半

蜀椒

一分 出汗 閉口 者及子 去之

右剉如麻豆大 每服抄五錢 水一盞 半煎至八分 去

渾服如人行五里頃更進一服溫覆取汗毒當從汗出汗出即愈若未汗再作
白朮散八治陰毒傷寒心煩煩躁四肢逆冷

白朮一兩

細辛一兩

附子一兩炮去
皮臍用

桔梗一兩去
蘆頭

乾姜半兩炮
製劉

川烏頭

一兩炮裂
去皮臍

右件藥搗為細末每服二錢以水一中盞煎至六分不計時候稍熱和滓頓服

附子散九

治陰毒傷寒唇青面黑身背強四肢冷

附子

三分炮
裂去皮

桂心半兩

當歸半兩劉
微炒

乾姜一分炮
裂劉

半夏一分湯洗
七次去滑

白朮半兩

右件搗篩為細散每服三錢以水一中盞入生姜半分煎至六分

去滓不計時候熱服衣覆取汗如人行十里未汗再服

正陽散十治陰毒傷寒面青張口出氣心下硬身不熱只額上有汗煩渴不止舌黑

多睡四肢俱冷

甘草

一分炙
微赤劉

附子一兩炮裂
去皮臍

麝香一錢細
研入

乾姜一分炮
裂劉

皂莢

一挺去皮塗酥
炙令黃色去子

右件搗羅為細末每服二錢以水一中盞煎至五分不計時候和滓熱服

肉桂散十一 治傷寒服冷藥過度心腹脹滿四肢逆冷昏沈不識人變為陰毒

肉桂 三分去
皺皮

赤芍藥 一兩

陳橘皮 一兩

前胡 一兩去
蘆頭

附子 一兩炮裂
去皮臍

當歸 一兩

白朮 三分

高良姜 三分
剉

人參 一兩去
蘆頭

吳茱萸 半兩
湯浸

厚朴 三分去皮姜
汁炙令香熟

木香 三分

右件搗為粗末每服四錢以水一

中盞入棗子三枚煎至六分去滓不計時候稍熱頻服

回陽丹十二 治陰毒傷寒面青手足逆冷心腹氣脹脉候沉細以此治之

硫黃 半兩細
研入

木香 半兩

華澄茄 半兩

附子 半兩炮裂
去皮臍

乾姜 一分炮
裂剉

乾蠟 半兩

吳茱萸 半兩湯浸七
遍焙乾微炒

右件藥搗羅為細末酒煮麴糊為丸如梧桐子大每服不計時候以生姜湯下三

十丸頻服三服復以熱酒一盞投之以厚衣蓋取汗

返陰丹十三 治陰毒傷寒心神煩躁頭痛四肢逆冷

硫黃 五兩

太陰玄精石 二兩
另研

硝石 二兩另
研用

附子 炮裂去
皮臍

乾姜 炮裂
剉

桂心 已上各
半兩

右件藥用生鉄鉋先鋪玄精末一半次鋪硝石末一半中間下硫黃末又着硝石

蓋硫黃都以玄精蓋上訖用小盞合着以三斤炭火燒令得所勿令烟出多急取瓦盆合着地面四向着灰蓋勿令烟出直候冷取出細研如麴後三味搗羅為末與前藥同研令勻用軟飯和丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸煎艾湯下頻服汗出為度病重則三十丸此方甚驗喘促與吐逆者入口便佳又服此方藥三五服服之不退便於臍下一寸灸之須是大段日夜不住手灸不限多少壯數灸之仍艾炷勿令小小則不得力若其人手足冷小腹硬即須更於臍下兩邊各一寸各安一道三處臍下灸仍與當歸四逆湯并返陰丹亦須頻服內外通透方得解退若遲慢即便死矣又若是陰證加以小便不通及陰囊縮入小腹絞痛欲死者更于臍下二寸石門穴大段急灸之仍須與返陰丹當歸四逆加吳茱萸生薑湯慎勿與尋常利小便藥也尋常利小便多是冷滑藥此是陰毒氣在小腹所致也世有醫者見小便不通使用炒鹽及裏熱藥於臍下便熨欲望小便通緣陰氣在小腹之間致被熱物熨着无處出得即便奔上衝心往往有死者

天雄散 十四 治陰毒傷寒身重背強腹中疝痛咽喉不利毒氣攻心心下堅強短氣嘔逆唇青面黑四肢厥冷其脉沉細而疾

天雄一兩炮裂去皮臍

麻黃半兩去根節

當歸半兩切微炒

白朮半兩

肉桂一兩去粗皮

半夏

半兩湯泡洗七次去滑

陳橘皮

三分湯浸去白粉炒

乾姜

三分炮

川椒

一分去目及閉口者微炒去汗

厚樸

一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟

右件藥搗為粗末每服五錢以水一大盞入生姜半

分棗子三枚煎至五分去滓不計時候稍熱服如人行十里未汗再服

續添

正元散

退陰散

出百問方

正元散

治傷寒如覺傷寒吹着四肢頭目百骨節疼痛急煎此藥服如人行五里

再服或連進三服出汗立差若患陰毒傷寒入退陰散半錢同煎或傷冷傷食頭昏

氣滿及心腹諸疾服之無有不取效者

麻黃

去節

陳皮

大黃

生用

甘草

炙

乾姜

炮用

肉桂

去皮

芍藥

附子

炮去皮用

茱萸

湯洗焙炒

半夏

洗各等分

右麻黃加一半茱萸減一

半同為末每服一大錢水一盞生薑三片棗一枚煎至七分熱服如出汗以衣被

蓋覆切須候汗乾去衣被如是陰毒不可用麻黃免更出汗

退陰散

治陰毒傷寒手足逆冷脉沉細頭痛腰重連進三服小小傷冷每服一字

入正元散內同煎入鹽一捻陰毒傷寒欬逆煎一服細細呷便止

川烏

乾薑各等分

右為粗末炒令轉色放冷再搗為細末每服一錢水

一盞鹽一捻煎半盞去滓溫服

葱熨法

十五

治氣虛陽脫體冷無脉氣息欲絕不省人及傷寒陰厥百藥不效葱以

索纏如繩許大切去根及葉唯存白長二寸許如大餅餅先以火煨一面令通熱又勿令灼人乃以熱處搭病人臍連臍下其上以熨斗滿貯火熨之令葱餅中熱氣鬱鬱入肌肉中須預作三四餅一餅壞不可熨又易一餅良久病人當漸醒手足溫有汗即差更服四逆湯輩溫其內昔曾有患傷寒冥冥不知人四體堅冷如石藥不可入用此遂差

葶藶苦酒湯

十六

治傷寒七八日內熱不解

苦酒

米醋是也一升半

生艾汁

半升無生艾煮熟艾汁或用艾根搗取汁用

葶藶

熱拌膏一合

右煎取七合作三服

陽毒升麻湯

十七

治傷寒一二日便成陽毒或服藥吐下之後變成陽毒腰背痛煩

悶不安面赤狂言或走或見鬼或下利脉浮大數面赤斑斑如錦紋喉咽痛下膿血五日可治七日不可治也

升麻 二分 犀角屑 一分 射干 一分 黃芩 一分 人參 一分 甘草 一分

右剉如麻豆大以水三升煎取一升半去滓飲一湯盞食頃再服溫覆手足出汗出則解不解重作

大黃散 十八 治陽毒傷寒未解熱結在內恍惚如狂者

川大黃 半兩 桂心 三分 甘草 一兩 炙 川芒硝 二兩 木通 切 一兩 大腹皮 切 一兩

桃仁 二十一 欸炒令微黃 右件搗為粗末每服四錢以水一中盞煎至六分

去滓不計時候溫服以通利為度

梔子仁湯 十九 治陽毒傷寒壯熱百節疼痛

梔子仁 一兩 柴胡 一兩 半 川升麻 二兩 黃芩 二兩 赤芍藥 一兩 大青 一兩

石膏 二兩 知母 一兩 甘草 半兩 炙 杏仁 二兩 湯浸去皮尖 右件搗為麤

末每服抄四錢以水一中盞入生姜半分攪百粒煎至六分去滓不計時候溫服

黑奴丸 二十 時行熱病六七日未得汗脉洪大或數面赤目瞪身體大熱煩躁狂言

欲走大渴甚又五六日已上不解熱在胸中口噤不能言為壞傷寒醫所不治為死

或人精魂已竭心下纔暖發開其口灌藥下咽即活兼治陽毒及發斑

大黃 二兩

釜底煤 研入

黃芩

芒硝

竈突墨 研入

梁上塵

小麥奴 各一兩

麻黃

去節泡一二沸
焙乾秤三兩

右件搗羅為細末煉蜜為丸如彈子大以新汲水研下一丸渴者但與冷水盡足飲之須臾當寒寒竟汗出便差若日移五尺不汗依前法服一丸差即止須微利小麥奴乃小麥未熟時叢中不成麥捻之成黑勃是也無此亦得此藥須是病人大渴倍常燥盛渴者乃可與之不渴若與之翻為禍耳

五積散 二十一 治陰經傷冷脾胃不和及感寒邪

枳殼

五兩 麩炒令色黃熟

官桂

去皮厚朴三兩 去

人參

二兩

吳白芷

四兩 洗淨焙乾

白茯苓

三兩

芍藥

三兩 洗淨當歸三兩 洗

麻黃

去節三兩

半夏

三兩 洗七遍

川芎

二兩

陳橘皮

八兩 洗

甘草

二兩 半

乾姜

三兩

蒼朮

二十四兩 新者淨洗焙乾

桔梗

十二兩 紫實白者洗淨焙乾

右件除枳殼肉桂外其餘並一處生搗為粗末分作六分於大鑊內用文武火炒令黃熟不得焦用紙攤於板床候冷入前件枳殼官桂末一處和勻入瓷合盛每服二錢水一盞生姜三片同煎至七分去滓服傷寒入蔥白一莖豆豉七粒同煎

連服出汗或脾胃不和內傷冷食渾身疼痛頭昏無力胸膈不利喫食不下氣脉不和四肢覺冷至晚心躁困倦即入鹽少許同煎或是陰經傷寒手足逆冷或睡裡虛驚及虛汗不止脉細疾面青嘔逆更宜入附子同煎加減多少並在臨時
霹靂散 二十二 治陰盛陽煩躁不飲水

附子一枚及半兩者炮熟取出用冷灰培之去皮臍為粗末真臘茶一大錢細研同和分作二服每服用水一盞煎六分臨熟入蜜半匙放溫冷服之須臾躁止得睡汗出即差

火熯散

二十三 治傷寒惡候

舶上硫黃

黑附子

去皮生用

新臘茶

已上各一兩為細末

右先用好酒一升調藥分大

新碗五口中於火上攤湯令乾合於瓦上每一碗下燒熟艾一拳大以瓦搭起無令火著直至烟盡冷即刮取却細研入瓷合盛每服二錢酒一盞共煎七分有火熯起勿訝傷寒陰毒者四肢冷脉沉細或吐或瀉五心躁煩胸中結硬或轉早伏陽在內湯水不得下或無脉先喫一服如吐却更進一服後心中熱其病已差下至臟腑中表未解者渾身壯熱脉氣洪大便宜用發表藥或表解者更不發熱便

得眠睡渾身有汗方可用調氣湯散如服此藥二服不應勿治之也

丹砂丸^{二十四} 治傷寒陰陽二毒相伏危惡形證

舶上硫黃 水銀

太陰石

太陽石

玄精石

已上各一兩研

硝石^{半兩}

右件藥為末先用無油銚子以文武火炒下諸藥末令勻如灰色

研如粉麴生薑自然汁浸蒸餅為丸如棗豆大每服五丸龍腦牛黃生薑蜜水下壓躁也若陽毒棗湯下陰毒茱萸湯下不得於屋底炒

增注類證活人書卷十七

五味子湯

^{二十五}

治傷寒喘促脉伏而厥

人參一分

五味子^{半兩}

麥門冬^{去心一分}

杏仁

^{去皮尖一分}

橘皮

^{去白一分}

右剉如麻豆大入生薑十片棗子三枚以水三大白盞煎至一盞半去滓分二服

蝦鼠糞湯

^{二十六}

療傷寒病後男子陰易方

韭菜根

^{一大把}

蝦鼠糞

^{十四枚}

右二味以水二升煎取半升去滓再煎三沸溫溫盡服必有黏汗出為效未汗再作服亦理諸般勞復鼠屎兩頭尖者是也

竹皮湯

二十七 療交接勞復卵腫腹中絞痛欲絕

刮竹青皮

一升 右一味以水三升煮一升半絞去滓分服立愈

續添乾姜湯

出百問方

療婦人得溫病雖差平復未滿一百日不可與交合交合為

陰易之病病必拘急手足拳皆死丈夫病以傷婦人名為陽易速當療之可差滿一百日不可療也宜令服此藥

乾薑

一分

右剉如麻豆大水二盞煎至六分溫服汗出得解止手足伸遂愈

續添青竹茹湯

出百問方

婦人病未平復因有所動致熱氣上衝胸手足拘急搖擗

如中風狀方

桔樓根

無黃根者二兩

青竹茹

剉半升淡竹者

右以水二升半煮取一升二合去滓溫溫作二三服喫立有效

續添當歸白朮湯

出百問方

婦人未平復因有所動小腹急痛腰膝疼四肢不任舉

身無熱發者

白朮

一分

當歸

一分

桂枝

一分

附子

一枚破分八片去皮

生薑

半兩

甘草

一分

芍藥

一分

人參

一分

黃耆

一分

右剉如麻豆大以水三升

煮取一升半去滓通口服一湯盞食頃再服一湯盞溫服微汗便差

知母麻黃湯

二十八傷寒差後或十數日或半月二十日終不惺惺常昏沉似失精神

言語錯謬又無寒熱醫或作鬼祟或作風疾多般治不差或朝夕潮熱頰赤或有寒熱似瘧都是發汗不盡餘毒在心胞絡之間所致

知母一兩

麻黃去節

甘草炙

芍藥

黃芩各半

桂枝

半兩減暑可減作一分去皮

右剉如麻豆大每服抄五錢以水一盞半煎八分去滓溫服半日可相次二三服

溫服令微汗若心煩不眠欲飲水當稍稍與之令胃中和即愈未汗須再服之

鱉甲散

二十九傷寒八九日不差名曰壞傷寒不能治者宜此療之

升麻

前胡去蘆

烏梅去核

枳實麩炒去白

犀角鎔

黃芩各半

生地黃

切兩合甘草一分

鱉甲

去裙米醋炙赤黃杼碎用半兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至八分去滓溫服

人參順氣散

三十治傷寒頭疼增寒壯熱四肢疼痛

麻黃

去節秤乾葛一兩

白朮一兩

甘草炙

桔梗去蘆

人參一兩

白姜半兩

香白芷一兩

右搗羅為細末每服三錢水一大盞生姜三片蔥

白二寸煎至八分通口服如要出汗連進二服

蒼朮散

三十一

治傷寒一二日頭疼發熱憎寒身體疼痛

麻黃

一兩湯洗過焙乾拌

蒼朮

半兩米泔浸去皮切

石膏

一兩煨

桔梗半兩

山茵陳

半兩去梗

甘草

半兩炙

右為細末每服二錢水一盞煎至八分連服出汗

麻黃葛根湯

三十二

治傷寒一日至二日頭項及腰脊拘急疼痛渾身煩熱惡寒

麻黃

用沸湯泡一二次焙乾拌

芍藥

各三兩

乾葛

四分

蔥白七莖

豉一合

右剉如麻豆大每服四錢水一盞半煎一中盞去滓溫服服了以厚衣蓋覆如人

行四五里間再服良久如未得汗出更煮蔥粥少許熱投之取汗

敗毒散

三十三

治傷風溫疫風濕頭目昏眩四肢痛憎寒壯熱項強目睛疼尋常風眩

拘攣風痰皆服神效

羌活

洗去土

獨活

去蘆

前胡

去蘆

柴胡

去苗

芎藭

枳殼

麩炒去穢

白茯苓

去皮

桔梗

去蘆頭

人參

已上各一兩

甘草

半兩炙

右件搗羅為末每服三錢

入生姜二片水一盞煎七分或沸湯點亦可老人小兒亦宜日三二服以知為度

瘴煙之地或溫疫時行或人多風痰或處卑濕脚弱此藥不可闕也

獨活散三十四治傷風溫瘴等疾

羌活去蘆頭

獨活去蘆頭

人參

細辛

去灰土華陰者佳

白茯苓去皮

枳殼

去心麩炒通黃用

防風

去蘆

黃芩

細堅者

麻黃

沸湯泡三吹焙乾秤

甘草

細剉炒赤

蔓荊子

甘菊花已上各一兩

石膏

水飛過二兩

右十三味搗羅為末每服三錢水一

盞生薑三片薄荷四五葉同煎至七分去滓微熱呷如年高者以川芎代黃芩

桂枝石膏湯

三十五

治傷寒三日外與諸湯不差脉勢仍數邪氣猶在經絡未入臟腑

者桂枝石膏湯此方可夏至後代桂枝證用若加麻黃去節半兩可代麻黃青龍湯用之也有汗脉緩為桂枝證無汗脉緊為麻黃青龍證

桂枝

半兩去皮

石膏

二兩碎

黃芩

半兩

甘草

半兩

梔子

四枚小者可用八枚

白藥子

升麻

乾葛

三分

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四

片水一盞半煎取八分去滓食頃再服若得汗即停後服

梔子升麻湯

三十六

治晚發傷寒三月至夏為晚發

梔子

十枚切碎

升麻

半兩

生地黃

半斤切碎用

柴胡

去蘆

石膏

各二兩半