

卫生专业技术资格考试辅导丛书

WEISHENG ZHUANYE JISHU ZIGE KAOSHI FUDAO CONGSHU



妇产科主治医师

资格考试历年考题纵览

与应试题库

纵览历年真题

把握命题趋势

指导复习方向

主编 孟元光 秦俭 卢瑜群 苏梅香

R71-47
2013/

阅 览

卫生专业技术资格考试辅导丛书——

2013 妇产科主治医师资格考试 历年考题纵览与应试题库

·第六版·

ISBN 978-7-3183-0033-6

主编 孟元光 秦俭 卢瑜群 苏梅香


副主编 刘文萃 韩吉晶 王雪莹

编委 (以姓氏笔画为序)

王雪莹 卢瑜群 刘文萃 苏梅香

张燕 孟元光 秦俭 顾成磊

黄柯 韩吉晶



本软件仅供考生作为参考使用，不作为商业用途。

·北京·

内容提要

本书以历年考试试题为模版,结合历年考生的应考经验和教训,以题库的形式(含往年真题)覆盖妇科主治医师资格考试大纲全部考核知识点,帮助考生在短时间内达到考核要求。模拟试题尽量接近真题风格,达到仿真练习的效果。

图书在版编目(CIP)数据

2013 妇产科主治医师资格考试历年考题纵览与应试题库/孟元光等主编. - 6 版.

- 北京:军事医学科学出版社, 2012. 10

(卫生专业技术资格考试辅导丛书)

ISBN 978 - 7 - 5163 - 0033 - 6

I. ①2… II. ①孟… III. ①妇产科学 - 医师 - 资格考试 - 自学参考资料

IV. ①R71

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 205836 号

策划编辑:赵艳霞 责任编辑:于庆兰

出版人:孙宇

出版:军事医学科学出版社

地址:北京市海淀区太平路 27 号

邮 编:100850

联系电话:发行部:(010)66931049, 66931051

编辑部:(010)66931038, 66931127, 66931039

传 真:(010)63801284

网 址:<http://www.mmsp.cn>

印 装:三河市双峰印刷装订有限公司

发 行:新华书店



开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 22

字 数: 538 千字

版 次: 2012 年 10 月第 6 版

印 次: 2012 年 10 月第 1 次

定 价: 42.00 元

本社图书凡缺、损、倒、脱页者,本社发行部负责调换

军事医学科学出版社

向广大考生赠送

人机对话系统软件体验版

下载地址：www.books8848.com

人机对话系统软件使用说明

- ☆在浏览器地址栏输入网址www.books8848.com,点击软件下载
- ☆软件下载到硬盘后双击打开
- ☆双击“模拟机考 v1.0.exe”
- ☆进入人机对话系统软件体验版界面
- ☆按提示操作,随意输入用户名和密码开始使用人机对话系统体验版。
- ☆答题完毕后静待5秒钟,系统会给出参考答案。

2018年医师类专业资格考试加入了人机对话考试的范围,全科医学、临床专业(专业代码为010)、中医(中西结合)、口腔(士)和师(师)中级(专业代码分别为002、014、091)、中医护理学中级、中医(专业代码分别为016、093)的各专业“基础知识”、“相关专业知识”、“专业知识”和“实践能力”4个科目的考试,均改用人机对话的方式进行。人机对话要求考生要具备良好的计算机操作基础,否者人机对话的考试形式对考生水平发挥有重要影响。

由于考试的第5不同的科目,人机对话考试中的某些特定情况下,考生作答操作是“不可逆”的。对于“专业知识”科类考试,在某一题型(如“单选题”)的测试过程中,考生是不可以随便更改已选择的答案,一旦选择了某个选项就不能退回上一题,继续测试题型。单选题“进行了查看和修改”后,考生无法查看或修改其“第10题”的选择)。这种

致考生

怕迷路，要记得回家的路；重难点，要重合；要重视时间管理，不要被各种干扰信息分散注意力。同时，要保持良好的心态，相信自己能够通过考试，对自己充满信心。

祝大家顺利通过考试！

(医考冲刺单) 考试 I (一)

2013 年卫生专业技术资格考试考试大纲和题型虽然不会变化，但是难度肯定有所加大，专家预计 2013 年考试通过率仍然不足 50%。这不禁使考生朋友们忧心忡忡。如何高效率地全面复习，如何掌握考试技巧，如何在短时间内熟悉考试题型、难度，是考试成败的关键。以下是编者对考生朋友们提出的几点建议，希望能对你们应考有所帮助。

一、高效率全面复习

卫生资格考试为全国统一题库，考试内容繁多，灵活性强。许多考生复习不够全面，仓促应战，结果兵败如山倒。那么应该怎样全面复习呢？

1. 制订学习计划：充足的复习时间是全面复习的首要保证，制订好的学习计划要严格执行。不要临考之前一个月才拿起书本临阵磨枪。
2. 注重基础：基础知识也要下功夫，包括药理、微生物、生理、病理等知识不能忽略。
3. 参考书选择：不能只复习《指导》，应该认真研读规划本硕连读教材和本专业权威参考书，如外科的《黄家驷外科学》，内科的《实用内科学》。
4. 多做习题：但要切忌四处乱找题。本书题库覆盖全面，是在对历年考题总结、分析、整理基础上编写的，对考生掌握命题规律十分有益。
5. 搜集信息：往年考生对于考试都有许多宝贵的经验和教训，他们对于难度、考点掌握得比较清楚，也有成功经验可以借鉴。网上也有很多这种应考的评论和经验的帖子，相互交流、信息共享对于考生是非常有帮助的。

二、熟悉人机对话考试

2008 年起卫生专业资格考试扩大了人机对话考试的范围，全科医学、临床专业（专业代码为 026 至 084）以及中药学初级（士）、初级（师）、中级（专业代码分别为 002、014、091）、中医护理学初级（师）、中级（专业代码分别为 016、098）的各专业“基础知识”“相关专业知识”“专业知识”和“专业实践能力”4 个科目的考试，均改用人机对话的方式进行。人机对话要求考生要有一定的计算机操作基础。熟悉人机对话的考试形式对考生水平发挥有着重要影响。

与传统的笔试不同的是，在人机对话考试中的某些特定情况下，考生作答操作是“不可逆”的。在进行“专业知识”科目考试时，在某一题型（如“单选题”）的测试过程中，考生是可以随时查看、修改此题型内任何一题的选择答案的，而一旦确认完成作答，进入新的题型时（如结束“单选题”，进入“多选题”），考生将不能退回到前一测试题型（“单选题”）进行查看和修改答案。在进行“专业实践能力”科目考试时，针对每道案例分析题，只有完成前一个问题才能看到下一问题，并且在确定进入下一问题后是无法对前面问题的作答进行查看和修改的（如当确认完成“第 1 问”，进入“第 2 问”后，考生无法查看或修改其“第 1 问”的选择）。这种

情况下,控制答题速度和掌握时间十分重要,既要认真、慎重,又不能在疑难问题上纠缠过多的时间。在人机对话考试整个过程中,计算机屏幕下方会显示答题进度和考试剩余时间,方便考生参考。

另外,网上可以找到人机对话机房模拟版软件,考生可下载自行练习。

三、掌握题型、难度和考核要求

(一) A1 型题(单句型最佳选择题)

每道试题由1个题干和5个供选择的备选答案组成。备选答案中只有一个是最佳选择,称为正确答案,其余四个均为干扰答案。干扰答案或是完全不正确或是部分正确,相互排斥的答案可同时提供。这类试题常常具有比较意义,在答题时,应当找出最佳的或最恰当的备选答案,排除似乎有道理而实际是不恰当的选择。

例1:能固定宫颈,并保持子宫不下垂的主要结构为

- A. 圆韧带
- B. 阔韧带
- C. 主韧带
- D. 骨盆漏斗韧带
- E. 骨盆漏斗韧带

参考答案:C

(二) A2 型题(病历摘要型最佳选择题)

每道题由一个叙述性主体(简要病历)作为题干,一个引导性问题和五个备选答案组成。例2:初产妇孕足月临产10小时,ROA,胎心136次/分,宫口开大4cm,2小时后再次肛诊宫口扩张无进展,本例的诊断是

- A. 潜伏期延长
- B. 活跃期延缓
- C. 活跃期阻滞
- D. 活跃晚期阻滞
- E. 第二产程停滞

参考答案:C

(三) A3 型题(病历组型最佳选择题)

每道题开始叙述一个以患者为中心的临床情景,然后提出2~3个相关问题,每个问题均与开始的临床情景有关,但测试要点不同,且问题之间相互独立,每个问题都是一个单句型的最佳选择题。

例3:(共用题干)不规则宫缩某孕妇中等量阴道流血入院,量同月经,持续时间约20分钟。初产妇,因第二产程延长,胎吸分娩,胎儿体重4000g,胎儿娩出后阴道持续出血,有凝血块。

(1)此时阴道出血原因最可能的是
A. 产后宫缩乏力
B. 软产道裂伤
C. 胎盘剥离不全

D. 凝血功能障碍

E. 子宫破裂

参考答案:B

(2) 最适宜的处理是

A. 注射麦角新碱

B. 注射催产素

C. 配血,输血

D. 开放静脉,手取胎盘,检查软产道

E. 仔细检查宫颈、阴道,有裂伤立即缝合

参考答案:D

(3) 产后1小时,再次出血,BP 7.5/4 kPa(70/30 mmHg),面色苍白,出冷汗,此时出血原因是

A. 胎盘剥离不全

B. 胎盘残留

C. 子宫收缩乏力

D. 凝血功能障碍

E. 软产道裂伤

参考答案:C

(四) A4型题(病历串型最佳选择题)

每道试题开始叙述一个以单一病人或家庭为中心的临床情景,然后提出3~6个相关的问题,问题之间也是相互独立的,每个问题都是一个单句型的最佳选择题。当病情逐渐展开时,可逐步增加新的信息。有时陈述了一些次要的或有前提的假设信息,这些信息与病例中叙述的具体病人并不一定有联系。提供信息的顺序对回答问题是是非常重要的。每个问题均与开始的临床情景有关,又与随后改变有关。回答这样的试题一定要以试题提供的信息为基础。

例4:(共用题干)

女性,24岁,半年前曾患乙型肝炎,目前停经49天,诊断为妊娠。检查:GPT正常,HBeAg(+),HBsAg(+),前来咨询乙型肝炎对妊娠和胎儿的影响。

(1) 妊娠对肝功能的影响哪项是正确的

A. 妊娠期肝脏血液循环量增加

B. 妊娠期肝内糖原储备量减少

C. 妊娠期血清碱性磷酸酶增高

D. 妊娠晚期血清白蛋白增高

E. 血清胆固醇下降

参考答案:C

(2) 乙型肝炎,母体传染胎儿的可能性与下列哪项有关

A. 乙型肝炎病毒不能通过胎盘传染给胎儿

B. 分娩时可传染给婴儿,但唾液、汗液不传播乙型肝炎病毒

C. 胎儿多半受感染

D. 婴儿不会成为病毒携带者

E. 按程序注射乙型肝炎疫苗可阻断母婴传播

参考答案:C

(3) 乙型肝炎对妊娠的影响主要为

A. 胎儿宫内生长受限

B. 胎方位异常

C. 羊水过多

D. 产后出血增加

E. 难产率增加

参考答案:D

(4) 妊娠合并急性肝炎产后处理中哪项是错误的

A. 肌内注射麦角新碱

B. 雌激素回奶

C. 新生儿注射乙型肝炎免疫球蛋白

D. 给予广谱抗生素

E. 继续给予保肝药物治疗

参考答案:B

(五) B1型题(配伍题)

每道题由 A、B、C、D、E 五个备选答案与 2~3 个以上题干组成,五个备选答案在前,题干在后。答题时,要求为每个题干选择一个正确答案,每个备选答案可以重复选用,也可以一次不选用。

例 5:(共用备选答案)
A. 子宫内膜炎、子宫肌炎
B. 产后下肢血栓性静脉炎
C. 急性盆腔结缔组织炎
D. 急性盆腔腹膜炎
E. 产后子宫滋养细胞肿瘤

(1) 产后 2~3 周寒战,下肢肿胀、疼痛,皮肤紧张发白

(2) 产后 3~4 天,体温 38℃,子宫体轻压痛,恶露量多且臭

(3) 产后 3 天突然畏寒,高热达 40℃,恶心,呕吐,下腹剧痛且有压痛、反跳痛、腹肌紧张感

参考答案:(1)B (2)A (3)D

(六) B2型题(配伍题)

每道题由 A、B、C、D、E、F、G、H 等若干个备选答案与三个或三个以上题干组成,备选答案在前,题干在后。答题时,要求为每个题干选择一个正确答案,每个备选答案可以重复选用,也可以一次不选用。

例 6:(共用备选答案)
A. 0 期
B. I a 期
C. II a 期
D. II b 期

E. IIIa 期

F. IVa 期

G. IVb 期

宫颈癌以下临床分期是

(1) 宫颈癌穹隆部受累

(2) 宫颈癌累及膀胱及直肠

(3) 病变仅限于上皮层内,未穿透基底膜,无间质浸润

(4) 宫颈癌宫旁增厚未达盆壁

(5) 宫颈癌镜下早期浸润,深度<5 mm

参考答案:(1)C (2)F (3)A (4)D (5)B

(七)X型题(多重是非选择题)

每道题由1个题干和5个备选答案组成,形式类似于A1型题,但正确答案不只1个,可以是2个、3个、4个、5个备选答案都正确。X型题题干可以是一个问题、一段对话、一段病史,也可以是图表或临床检查资料等。选择项提供的正确答案或错误答案都应是肯定的,不能在选择项中有部分正确、部分错误或似是而非的答案,也不能同时存在两个相互矛盾的答案。

例7:女性生殖器官的临近器官有

A. 阑尾

B. 乙状结肠

C. 输尿管

D. 膀胱

E. 直肠

参考答案:ACDE

(八)案例分析题(模拟临床场景的串型不定项选择题)

案例分析题题干为一个模拟临床情境的病例,根据临床实际工作的思维方式和内容提出平均5~6个相关问题。问题之间根据提供的信息可以具有一定的逻辑关系,随着病程的进展,不断提供新的信息,然后提出相应的问题。每问的备选答案至少6个,最多12个。考生应根据题干描述和提示信息,选出每问的全部正确选项。正确选项可能为1个或多个,根据选项的重要性而得分权重不同。选对得分,选错扣分,扣至本问得分0为止。在人机对话考试中,案例分析题答题过程是不可逆的,即进入下一问题后不能返回修改已答题目。

例8:(共用题干)

25岁初孕妇,妊娠39周,不规律宫缩有2日,阴道少许血性黏液。查血压136/96 mmHg,子宫长度38 cm,腹围106 cm,胎心158次/分,宫缩持续32秒,间隔6分钟,肛查宫口未开,缩宫素激惹试验出现早期减速。

(1)本例不恰当的诊断是

A. 宫内足月妊娠

B. 巨大胎儿

C. 足月活胎

D. 临产

E. 胎儿窘迫

F. 先兆临产

单胎足月

参考答案:EF

(2) 产妇入院后行温肥皂水灌肠,1小时后阵缩频发,宫缩持续40秒,间隔2~3分钟,胎心140次/分,宫口开大2cm,血压130/88mmHg。此时处理不当的项目应是

- A. 鼓励进食,增加营养
- B. 每隔1小时听胎心
- C. 检查有无头盆不称
- D. 左侧卧位
- E. 静滴缩宫素加速产程
- F. 行人工破膜

参考答案:EF

(3) 临产18小时再查宫缩减弱变稀,胎心150次/分,肛查宫口开大2cm,先露为0,血压120/90mmHg,尿蛋白(±),无自觉症状。此时恰当诊断应是

- A. 第一产程潜伏期延长
- B. 第一产程活跃期延长
- C. 原发性子宫收缩乏力
- D. 胎儿窘迫
- E. 妊娠期高血压
- F. 正常产程
- G. 活跃期阻滞

参考答案:A

(4) 根据上述病情,此时的不恰当处理应是

- A. 急查胎盘功能
- B. 左侧卧位
- C. 间断吸氧
- D. 阴道检查了解头盆关系
- E. 静滴肼屈嗪
- F. 给予产妇精神安慰及鼓励

参考答案:E

(5) 临产已20小时再检查,宫缩45秒,间隔3分钟,胎心监护显示胎心168次/分,频繁出现晚期减速,胎膜已破,羊水黄绿色,血压144/90mmHg,阴道检查宫口开全,先露+4。此时紧急处理应是

- A. 静滴肼屈嗪
- B. 静滴硫酸镁
- C. 行产钳术
- D. 立即行剖宫产术
- E. 静推葡萄糖液+维生素C
- F. 静滴乌拉地尔

参考答案:C

- (6)如果该新生儿出生1分钟,其心率96次/分,律齐,呼吸浅,不规律,四肢活动好,吸痰时喉部仅有轻度反射,躯干皮肤红润,四肢紫。Apgar评分为
- A. 7分
 - B. 8分
 - C. 9分
 - D. 6分
 - E. 5分
 - F. 4分

参考答案:D

第4章 主治医师资格考试采用的是标准化命题,与在医学院期间的考试题型区别很大,与医师资格考试要求的知识的广度性考核要求也有区别,更多的是以考核知识的灵活运用为目标,大量的病例分析题出现在试卷中就不足为奇了。所以总是出现五个备选答案中有两个难以决定取舍的情况。

以下附载一2012年考生的考试心得,希望对2013年考生应考能有所裨益:

2012年妇产科学考试题型较往年有所变化,四门考试各有所侧重。基础解剖骨盆结构与径线必须掌握,在基础部分要考,在产科部分也要考;盆腔淋巴血管的解剖也同样是基础部分必考的内容,妇科肿瘤部分也要考。除了要掌握妇产科的本专业内容外,还应掌握本专业更深层次的专业知识及专业技能知识——掌握这点很重要,安排复习方向,重点应放在本专业知识的学习上。

我认为准备考试应该配备三本书:教科书、人民卫生出版社的《考试指南》和一本有针对性的考试习题集。事半功倍!

上机考试为四科中难度较大的,考核的是综合能力,考核知识点较深入,为临床实践的积累,重在临床思维的建立。题型为病历分析,对临床知识要求较高,涉及该病历的所有知识均为考核点,如发病机制,临床表现,诊断,鉴别诊断,辅助检查,治疗方案等。病历分析题一定要注意所给的临床症状与体征的综合分析,如果诊断错误,处理就必然错误,尤其是妇科肿瘤、分期与后续治疗密切相关,如宫颈癌Ib期后就不再手术治疗,如果对分期不清楚,则治疗就可能出现错误。病历题每题之间都是环环相扣,前面判断错误,就会发生连锁反应,造成多个题目出错,而当你醒悟判断出错时,还不允许回头修改。上机考核较多的需要阅片,如B超,CT,MR及各种造影等,电脑中提供的片子较工作中的质量较差,不甚清晰,因此需要掌握每种疾病的特殊影像表现,同时需要工作中多多练习阅片,方可辨别。

匆忙间回想了一下,得出以上考试心得,希望对2013年考生能有所帮助。

通过前几年卫生专业技术资格考试的实践检验,本书得到了广大考生的好评。考生普遍反映我社出版的这套辅导丛书具有很好的实用性、权威性,能在短时间内提高考生的应试能力。2012年我们再接再厉,在原有基础上邀请了更多的卫生专业技术资格考试专家参与到本丛书的编写中来,同时吸收了广大考生的反馈意见,使本书的质量又有大幅度的提高。不仅题量得到扩充,无论从题型,还是知识点的覆盖都更加贴近考试内容。

为广大考生服务是我们出版本套丛书的根本目的和宗旨。考生在准备考试和复习中会对复习题和考试本身产生一些疑惑和问题。为了增强本书的互动性，同时满足考生与专家、考生与考生的直接交流，我们在军事医学科学出版社网站设立了医考论坛。考生可以在这里提出疑问，我们会不定期请专家针对一般性问题进行答疑。我社网址是 www.mmsp.cn，欢迎广大考生充分利用这个平台，学习、交流、反馈意见。同时我们还推出热线电话、热线电子信箱和热线QQ，方便考生联系我们。

电话：010—66931038

QQ：706421697, 237563664

Email：zhaoyanxia2005@sohu.com, jhwei1212@yahoo.com.cn

希望您能够借助本书的帮助，顺利通过考试！

祝广大考生考试顺利，取得理想成绩！

量大，而且对疾病的治疗效果也相对较好，但风险也相对较大，因此在选择治疗方法时一定要综合考虑。

首先，要根据患者的具体情况选择治疗方法，如年龄、性别、体质、病情等。

其次，要根据患者的具体情况选择治疗方法，如年龄、性别、体质、病情等。

再次，要根据患者的具体情况选择治疗方法，如年龄、性别、体质、病情等。

最后，要根据患者的具体情况选择治疗方法，如年龄、性别、体质、病情等。

总的来说，要根据患者的具体情况选择治疗方法，如年龄、性别、体质、病情等。

第一单元 目录

第一单元 女性生殖系统解剖	(1)
第二单元 女性生殖系统生理	(15)
第三单元 妊娠生理	(31)
第四单元 妊娠的诊断	(38)
第五单元 孕期监护与保健	(46)
第六单元 正常分娩	(59)
第七单元 正常产褥	(71)
第八单元 病理妊娠	(77)
第九单元 妊娠合并症	(113)
第十单元 妊娠合并性传播疾病	(130)
第十一单元 异常分娩	(137)
第十二单元 分娩期并发症	(153)
第十三单元 产褥期异常	(171)
第十四单元 妇科病史与检查	(179)
第十五单元 外阴色素减退疾病与外阴瘙痒	(186)
第十六单元 女性生殖系统炎症	(192)
第十七单元 女性生殖器肿瘤	(220)
第十八单元 妊娠滋养细胞疾病	(273)
第十九单元 生殖内分泌疾病	(285)
第二十单元 子宫内膜异位症和子宫腺肌病	(302)
第二十一单元 女性生殖器畸形	(311)
第二十二单元 女性盆底功能障碍性疾病及生殖器官损伤	(315)
第二十三单元 不孕症	(321)
第二十四单元 计划生育	(326)
第二十五单元 妇女保健	(334)

- C. 耻骨联合中点至髂后上棘联线上点上 1.5 cm
 D. 耻骨联合上缘中点至米氏菱形窝上角上 1.5 cm
 E. 耻骨联合上缘中点至第 5 腰椎棘突下

参考答案:E

4. 骶结节韧带位于

- A. 骶骨与坐骨棘之间
 B. 骶骨与闭孔之间
 C. 骶骨与尾骨之间
 D. 骶骨与坐骨结节之间
 E. 骶骨与耻骨联合之间

参考答案:D

5. 支持盆底最主要的组织是

- A. 泌尿生殖膈
 B. 肛提肌及其筋膜
 C. 会阴中心腱
 D. 会阴深横肌
 E. 会阴体

参考答案:B

6. 防止子宫脱垂的主要韧带是

- A. 子宫圆韧带
 B. 子宫主韧带
 C. 骶子宫韧带
 D. 子宫阔韧带
 E. 子宫系膜

参考答案:B

7. 孕妇 28 岁,孕 1 产 0 孕 29 周,骨盆测量:髂嵴间径 26 cm,髂前上棘间径 25 cm,骶耻外径 18.5 cm,坐骨结节间径 9 cm,骶岬不突,骶骨弧度中等,坐骨棘内突,坐骨切迹宽,耻骨弓角度 100°。该孕妇骨盆属于下列哪种类型

- A. 女型骨盆
 B. 男型骨盆
 C. 扁平骨盆
 D. 均小骨盆
 E. 漏斗骨盆

参考答案:A

8. 髂内动脉前干分支不直接供血的是

- A. 卵巢
 B. 子宫
 C. 输卵管
 D. 阴道
 E. 膀胱顶、膀胱颈

参考答案:A

9. 对于女性生殖器淋巴的叙述,下列哪项恰当

- A. 阴道下 1/3 段淋巴注入闭孔淋巴结
 B. 外阴淋巴大部分注入腹股沟深淋巴结
 C. 腹股沟深、浅淋巴结均汇入髂淋巴组
 D. 宫颈两侧淋巴沿圆韧带进入腹股沟淋巴结
 E. 内生殖器淋巴分为髂淋巴组、腰淋巴组和闭孔淋巴组

参考答案:C

10. 关于成人子宫,下列哪项不正确

- A. 子宫呈前后略扁的倒置梨形
 B. 宫腔容量约 5 ml
 C. 重约 50 g
 D. 长度 6~7 cm
 E. 子宫下段较上部稍窄

参考答案:D

11. 下列哪种结构没有参与会阴境界的围成

- A. 耻骨联合下缘
 B. 尾骨尖
 C. 耻骨下支
 D. 坐骨棘
 E. 骶结节韧带

参考答案:D

12. 对于阴道上段淋巴引流,下列哪项不恰当

- A. 小部分汇入髂外淋巴结

- B. 大部分汇入闭孔淋巴结与髂内淋巴结

- C. 与阴道下段引流基本相同
D. 与宫颈引流基本相同
E. 不注入腹股沟淋巴结

参考答案:C

13. 骨盆的关节包括

- A. 耻骨联合与骶尾关节
B. 耻骨联合与骶髂关节
C. 耻骨联合、骶髂关节与骶尾关节
D. 骶髂关节与骶尾关节
E. 骶尾关节

参考答案:C

14. 关于女性内生殖器的血管,下列哪项

不正确

- A. 子宫动脉为髂内动脉前干的分支
B. 右卵巢动脉可来自右肾动脉
C. 左卵巢动脉可来自左肾动脉
D. 阴部内动脉为髂内动脉前干的终支
E. 会阴动脉为阴部内动脉的分支

参考答案:B

15. 关于子宫,下列哪项正确

- A. 表面 1/3 能发生周期性变化
B. 靠近子宫肌层的内膜为功能层
C. 子宫峡部黏膜组织与宫颈黏膜相同
D. 基底层无周期性变化
E. 功能层于月经期部分脱落

参考答案:D

16. 子宫体壁的组织结构中哪层最厚

- A. 内膜层
B. 功能层
C. 基底层
D. 肌层
E. 浆膜层

参考答案:D

17. 髂骨是由

- A. 坐骨与耻骨融合而成
B. 髂骨与耻骨融合而成
C. 髂骨与坐骨融合而成

- D. 髂骨、坐骨与耻骨融合而成

- E. 髂骨与骶骨融合而成

参考答案:D

18. 手术时识别输卵管的标志是

- A. 输卵管伞
B. 输卵管漏斗
C. 输卵管系膜
D. 输卵管间质部
E. 输卵管外侧端

参考答案:A

19. 关于阴蒂,下列哪项不正确

- A. 位于两侧小阴唇顶端的联合处
B. 位于两侧大阴唇顶端的联合处
C. 具有勃起性
D. 分为阴蒂头、阴蒂体和两个阴蒂脚
E. 敏感性极高

参考答案:B

20. 对于大阴唇,下列哪项恰当

- A. 其内侧为黏膜
B. 其后端为子宫圆韧带的终点
C. 起自阴蒂,止于会阴
D. 其皮下脂肪层富含血管、淋巴管和神经
E. 以上均恰当

参考答案:D

21. 对于女性输尿管下列哪项恰当

- A. 长 25 cm, 内径最细为 3~4 mm, 最粗为 7~8 mm
B. 长 20 cm, 内径最细为 3~4 mm, 最粗为 7~8 mm
C. 长 30 cm, 内径最细为 3~4 mm, 最粗为 7~8 mm
D. 长 35 cm, 内径最细为 3~4 mm, 最粗为 7~8 mm
E. 长 40 cm, 内径最细为 3~4 mm, 最粗为 7~8 mm

参考答案:C

22. 对于子宫阔韧带,下列哪项不恰当

- A. 外 1/3 部移行为骨盆漏斗韧带

- B. 内 1/3 包围输卵管
C. 分为前、后两叶
D. 富含血管、神经及淋巴管
E. 两侧达盆壁

参考答案:B

23. 下列哪项不是组成骨盆的骨骼
A. 髋骨
B. 骶骨
C. 耻骨
D. 腰椎
E. 尾骨

24. 骨盆腔是指
A. 骨盆的入口平面和出口平面之间
B. 大骨盆以下的腔
C. 骨盆出口平面以上的腔
D. 骨盆入口平面和中骨盆平面之间
E. 中骨盆平面和出口平面之间

- 参考答案:A
25. 女性正常骨盆的坐骨棘间径为
A. 8 cm
B. 10 cm
C. 8.5~9.5 cm
D. 9.5~10.5 cm
E. 12 cm

- 参考答案:B
26. 关于女性生殖系统,下列哪项不正确
A. 内生殖器官位于盆腔腹膜内
B. 骨盆的大小、形状对分娩有直接影响
C. 骨盆底组织承托盆腔脏器
D. 外生殖器不包括阴道
E. 经产妇大阴唇受分娩的影响向两侧分开

- 参考答案:A
27. 关于子宫阔韧带,下列哪项不正确
A. 分为前后两叶
B. 内 1/3 包围输卵管
C. 外 1/3 部移行为骨盆漏斗韧带

- D. 富含血管、神经及淋巴管
E. 两侧达盆壁

参考答案:B

28. 骨盆是由本基底托最高点
A. 髋骨、骶骨、尾骨组成
B. 髋骨、坐骨、耻骨组成
C. 髋骨、骶骨、尾骨组成
D. 髋骨、耻骨、骶骨组成
E. 耻骨、骶骨、尾骨组成

参考答案:A

29. 下列哪项无腹膜覆盖
A. 子宫底部
B. 圆韧带
C. 子宫直肠陷凹
D. 膀胱子宫陷凹
E. 卵巢

参考答案:E

30. 阴道前庭包括
A. 前庭球、前庭大腺及尿道口
B. 前庭球、前庭大腺、尿道口、阴道口及处女膜
C. 阴蒂、前庭球及前庭大腺
D. 阴蒂、前庭球、前庭大腺及尿道口
E. 前庭大腺、尿道口及阴道口

参考答案:B

31. 卵巢门是指
A. 卵巢固有韧带连接于卵巢的部位
B. 卵巢系膜连接于输卵管的部位
C. 卵巢系膜连接于阔韧带后叶的部位
D. 卵巢连接于子宫的部位
E. 卵巢系膜连接于阔韧带前叶的部位

参考答案:C

32. 宫体两侧淋巴结沿圆韧带汇入
A. 腹股沟深淋巴结
B. 腹股沟浅淋巴结
C. 髂前淋巴结
D. 闭孔淋巴结

E. 骶内淋巴结

参考答案:B

33. 子宫的正常位置为

A. 轻度前倾前屈位

B. 轻度后倾后屈位

C. 前倾前屈位

D. 后倾后屈位

E. 水平位

参考答案:A

34. 做子宫与附件切除时,切断哪条韧带

最容易损伤输尿管

A. 主韧带

B. 圆韧带

C. 阔韧带

D. 骶骨韧带

E. 骨盆漏斗韧带

参考答案:A

35. 子宫动脉下支供应

A. 宫颈与阴道

B. 宫颈与阴道上段

C. 阴道

D. 宫体、宫颈与阴道上段

E. 子宫峡部、宫颈与阴道

参考答案:B

36. 阴道动脉来自

A. 腹主动脉

B. 骶总动脉

C. 骶外动脉

D. 骶内动脉

E. 肾动脉

参考答案:D

37. 关于骶棘韧带,下列哪项正确

A. 位于骶骨与坐骨棘之间

B. 位于骶髂关节与坐骨棘之间

C. 位于骶尾关节与坐骨棘之间

D. 其宽度即为坐骨切迹宽度

E. 以上均不正确

参考答案:D

38. 骨产道是指

A. 大骨盆

B. 小骨盆

C. 大骨盆 + 小骨盆

D. 骨盆入口平面以上

E. 骨盆出口平面以上

参考答案:B

39. 骨盆底组织有

A. 1 层

B. 2 层

C. 3 层

D. 4 层

E. 5 层

参考答案:C

40. 肛提肌位于骨盆底的

A. 内层

B. 中层

C. 外层

D. 浅层

E. 深层

参考答案:A

41. 右侧卵巢静脉汇入

A. 下腔静脉

B. 右肾静脉

C. 右髂内静脉

D. 右髂总静脉

E. 右髂外静脉

参考答案:A

42. 关于女性内生殖器的神经支配,下列

哪项不正确

A. 由交感神经与副交感神经支配

B. 交感神经纤维由腹主动脉前神经

丛分出

C. 卵巢神经丛与骶前神经丛均支配

内生殖器

D. 卵巢神经丛分布于卵巢、输卵管和

子宫

E. 子宫平滑肌的收缩不受神经支配

参考答案:D

43. 输卵管由内向外依次为