

中國經方

丁氏醫學叢書

中國經驗良方

上海

梅白格路宏昌里一百廿一號
即愛文義路新聞巡捕房後面

醫學書局發行

(中國經驗良方)

每部定價大洋二角

杭縣葉瑗

無錫萬鈞

西醫學局書

上海棋盤街
商務印書館

版權
所有

各省分售處

各埠商務印書館
各埠中華書局
各大書局

上海四馬路
掃葉山房
中華書局

中國經驗良方

發凡

古今方書。充箱照軫。而病因複雜。獲效殊尠。僻鄉窮戶。既無力延醫。復無術求方。喪失生命者。比比皆是。余誓發宏願。搜積良方。歲月荏苒。於茲十載。或係家藏秘法。或爲業師指授。或得於親友之傳抄。或得於報章之紀載。彙而錄之。不下五六百條。茲揀其已經試驗。及戚友中確切證明。著有實效者百餘方。先刊爲經驗良方初編公世。更當陸續搜擇。刊爲續編。以餉同好。

吾國方書。以驗方新編最爲大觀。搜羅宏富。幾於無病不備。惜乎但驚繁博。未盡精純。致抱病者。每一展卷。輒嘆望洋。靡所抉擇。或以病試方。轉滋危險。是皆過多之弊。此編雖寥寥百餘條。不及驗方新編之什一。然悉本經驗而來。稍有涉疑。概從屏削。閱者苟能按方施治。回春可券。固未敢誇多耀目。徒侈篇幅也。

吾國醫書。多尙理論。西醫書則病名藥名。知者尤鮮。故患病者。每欲求簡便良方。以期速效。於是有獨得秘方數條。遂懸壺應診。專治某某等證者。雖一時可獲厚利。而不輕

授受其製藥配方之法。久之浸至失傳。凡此之類。目見耳聞。殊難悉數。甚可悲也。苟能博採各種秘方。彙爲巨帙。則壽人壽世。功德匪淺。所望同志。合力進行。

成方多治專門簡單之病。而病情變化。或因他項關係。正復無定無窮。此書所載方劑。固多實地試驗。然病者苟照法施治後。成績如何。或於某病另有某方。效更捷於書中所載者。尙望隨時指示。定將姓名一切補登。志在利人。不敢掠美。

此書驗方。多未載傳授者之姓氏。因獲方時。既係戚友中輾轉傳抄。甚至有已傳數代者。故多將姓氏湮沒。閱者諒之。

此書方劑無多。未便分門別類。俟以後續刊增多時。再當區別部居也。

中華民國六年七月杭縣葉瑗蘊伯識

中國經驗良方目錄

治喉風神效方

治爛喉痧經驗方六條

又外治法三條

喉症初起方

喉症預防法二條

時疫辨症用藥要方

菩提救苦丸

救濟時疫十滴痧藥水

治一切陰陽痧絞腸痧中暑霍亂等症方

乾濕霍亂治法

霍亂吐瀉良方

治鼠疫神效方

治紅白痢疾方四條

治小兒紅白痢疾經驗方

又治小兒泄瀉方

治小兒吮乳久瀉綠糞方

治休息痢方

橄欖治疫痢奇驗方

治瘧疾驗方

又外治瘧疾法二條

治疟腮方二條

又疟腮外治方

走馬牙疳外治方

治夾陰傷寒秘方

又行房事後受風寒秘驗方

治吐血驗方三條

治風熱痰多聲嘶方

化痰止咳神方二條

又化痰方

治肺癰良方

治頭風方

治心胃氣痛神效方

治咽隔奇方

治口內米眼方

治暈船方二條

治水脹病方

治小兒蛔蟲方

治小兒夜啼方

治嬰兒吮乳久瀉綠糞方

肥兒丸方

治婦女紅白帶方

調經種子仙方

治耳心出膿方

治銅錢癬方

治頑癬方

治癩頭方

治疥瘡方

治黃水瘡方三條

治凍瘡方三條

治凍瘡皮破痛不可忍方

治諸蕈方

治延皮爛在小胖方

治癩犬咬傷方四條

治疔瘡方

飛馬取疔丹

拔疔散方

治陰毛八角虱方

治背癰良方

治腳了濕癢方

治漏瘡方

治臙瘡方

救服生茴香方

救吞生鴉片烟靈方

又救吞生鴉片烟或硫黃水銀洋火等毒

方

又救吞洋火毒方

救吞砒毒方

救吞金銀銅錫方

治刀傷方二條

治燙火傷方

治牙痛方二條

戒烟藥方

試婦人有無孕法

防難產法

臨產時胎兒手足先出處置法

開骨散方

蔡松汀難產神效方

中國經驗良方目錄終

中國經驗良方

杭縣葉瑗蓮伯編

治喉風神效方

不論何種危險喉症。任取大小白黑各種蜘蛛二三個。（隨使用一種足矣。小而白者爲佳。）在潔淨瓦片上焙枯。研細成末。用斜口竹筒吹入病人口中。（吹時宜斜身站立。以防傳染。）勿咽（如誤咽亦無害。）少刻毒涎滿口。吐後再吹。約五六次。涎淨即愈。瑗按焙藥時以見黑爲度。勿不及。勿太過。過則藥無力。用之不效。

治爛喉痧經驗方

初起時畏寒發熱者。以辛涼疎散之劑。

荊芥二錢

防風一錢五分

淡豆豉二錢五分

炒山梔二錢五分

蟬衣三錢

薄荷一錢五分

桔梗二錢五分

生甘草一錢五分

陳蘿卜英三錢

倘喉痧煩燥而不大便者。須加 牛蒡子三錢 馬勃三錢

熱重而煩燥甚者。加 飛滑石四錢 細生地五錢

腹泄者。牛蒡馬勃滑石生地等均不可加。但加焦山查三錢于前方內可耳。此係風邪之病。必兩星期。經許多危險。然能守定以上四法。必可轉危爲安。

又方

竹瀝六錢 猴棗一分 珠粉一分 以上三味。均須選好藥料。共研細末。用開水服。不及片刻。立即見效。

又方

土牛膝根煎湯灌下。如喉痛不能服。可將土牛膝根搗汁。以新筆蘸汁塗洗痛爛處。頗獲神效。

又方

蘿蔔菜立冬後。放於露天。使經霜雪。立春前取入風乾。患喉症者。煎服之。立效如神。卽未發喉症者。亦可服此。以免傳染。

又方

漱喉法

食鹽三錢 礪砂五分 水一杯調和用以漱喉。頗效。或用枝子花。或土牛膝或魚腥草。泡水漱喉。

又方

白礬三錢 白糖六分 共研細末調勻。服一小匙。即吐痰。若不吐。再服之。蓋患者氣多不順。使之嘔吐。誠善法也。如不服藥。則用雞毛拭油脚探吐亦妙。

又方 外治各法

用針刺少商穴見血 合谷穴不見血 曲池穴不見血

如喉閉者刺鼻見血須多

錫類散加蛛蜘蛛一個（瓦上焙枯）吹之。此法極佳。如喉外再貼異功散尤妙。（按錫類散異功散二藥藥肆均有售者）

用遊蟲一條剪斷包棗內含於口中立能開關。

喉症初起方

甯波陳氏喉症專科傳

此方治一切喉症初起。左右兩邊紅腫。嚥下困難等症。倘潰爛者忌服。其方如下。

牛蒡子二錢

浙貝母二錢

桔梗二錢

防風二錢

荊芥穗二錢

淡竹葉二錢

生甘草八分

右藥七味。以水二盞煎服。

喉症預防法

一切喉症。均由冬日鬱火。至春發出。且近年紙煙盛行。火毒愈重。一時驟發。每多不治。茲將經驗預防各法列後。伏愿仁人君子。廣爲傳佈。功德無量。

萊菔子三錢

薄荷六分

桔梗二錢

青黛五分

象貝三錢

青鹽一錢五分

右藥六味。每人預服二料。其所積火毒盡消。可不感染各種喉症。

又方

凡遇天時不正之際。若覺喉燥。不論其是否喉症。將生白蘿蔔。儘量多服。愈多愈好。惟婦女連服過冷。恐不相宜。可分多次服之。此亦預防傳染喉症之良法。

時疫辨症用藥要方

夏令所流行之時疫症。以霍亂爲最多。必須分別閉症脫症。宜通宜固。閉症舌苔或紅。或黃。脫症舌苔定係白色濕潤。認明之後。方可進藥。常見一般無識之醫生。辨症既不

分明用藥尤屬混雜。又兼針刺橫施。誤人甚衆。殊可憫也。茲將四川巴縣所傳效方。分
清眉目。詳列後方。務望仁人君子。廣爲傳佈。必使人人共曉。庶不至爲一般庸醫所誤
也。（痧症咬黃豆不腥。咬銅錢卽碎）

（閉症）（卽暑證痧證）在體實之人。只中外寒外暑。中官不傷。重者忽然昏倒。不省人
事。輕者但頭昏肚痛。總之舌苔必紅。必黃。閉久或成紫黑。乾枯起刺。吐瀉雖有亦不多
必皆熱臭。法宜開通。急用雷擊散。通關散。各樣痧藥吹鼻。並服少許。又扯刮手灣喉背。
若不醒。再用紅靈丹。生薑汁等點眼角。男左女右。卽愈。

（脫症）（卽寒陰症）在體虛之人。中官既虛。又中外寒。故大吐大瀉。皆係惡水。上爭下
奪。陽氣大傷。手足轉筋。喉中氣塞。冷汗不止。肚腹凝痛。舌苔愈白。愈重。必見滑潤。或黑
而滋潤。服藥稍輕稍緩。必致陽脫而死。治法宜固。所用各藥。定要極濃。入口極辣。一口
一口。接連進服。太猛則吐。如煎藥不及。先灌薑汁。氣不作。墜身不覺熱。急用加味理中
湯。

厚附一兩

乾薑五錢

白朮五錢

黨參五錢

安桂一錢五分

茯苓三錢

故紙二錢

炙草二錢

吳萸二錢

若心熱手足冷。加黃連一錢煎服。

嘔吐不受藥。先用

公丁香十粒

黑薑一錢

胡椒五分

安桂八分

竈心土八錢

用淨布包

烏梅二個

右藥用水一杯。須銅鐵杯煎濃。候溫。緩緩接服。俟不吐。仍服前

方。

手足極冷。大汗如雨。用四逆湯

厚附一兩

乾薑一兩

安桂三錢

炙草五錢

生薑

汁一盃。急服二三劑。方可得生。

凡口渴心煩者。用

烏梅三個

黃連一錢

煎濃湯。兌薑汁一盃。代茶飲。

面赤下寒。而眞陽上脫。名爲戴陽。或身冷自汗。但燥不煩。欲臥冷地。內寒外熱。名爲格

陽。兩證均係陰盛陽亡。眞寒假熱。急用通脉四逆湯。

厚附三兩

乾薑一兩五錢

安

桂三錢

葱白七寸

黃連一錢五分

日夜連服數劑可救。脫症回陽之後。有現身痛頭

痛者。宜遵內經先溫其裏。後攻其表。急扶正氣。以除邪氣。若見口乾舌燥。宜加豬膽汁

童便。黃連。烏梅等藥。若津液枯極。宜重加生地。阿膠。以救其陰。恐陽雖回。無陰接濟。終

歸於脫也。

外治法

用薑片。墊艾。燒臍下一寸五分。重則燒臍眼數次。再貼暖臍膏。牙關不開。手

足灣屈喉中氣塞。治法用燈火暴燒各處即止。

預防法

慎起居。節飲食。忌服消導苦寒藥。及生冷眠臥。宜暖。宜貼暖臍膏。

配送丸藥

用前加味理中湯加公丁香廿粒。膏梁子二錢。用薑汁爲丸。每用五錢。

薑湯送下。口渴者用黃連烏梅肉各五分爲引。照此配送。功德無量。

菩提救苦丸

江南製造局常年施送方

專治春夏感冒風寒。時行溫疫。暑濕頭痛。口渴。身熱。目脹。筋骨疼痛。惡心怯寒。脉息洪數等症。屢試神效。其方列下。

紫蘇四兩

葛根四兩

羌活四兩

蒼朮三兩

赤芍三兩

香附三兩

花粉三兩

元參三兩

陳皮二兩

生地二兩

白芷二兩

防風二兩

川芎二兩

黃芩二兩

厚樸二兩

甘草一兩

細辛一兩

右藥十七味。用新荷梗荷葉煎水爲丸。每丸重二錢半。內傷飲食。外感風寒者。炒神麴煎湯化下。餘俱用生薑湯。或用開水下。惟受暑勿用薑。大人每服一丸。小兒每服半丸。日久藥味發變更妙。

救濟時疫十滴痧藥水

此藥水專治時疫。危險急症。如霍亂吐瀉。吊脚痧。絞腸痧。癘螺痧。子午痧。痢疾。泄瀉。胸痛。腹痛。一切等症。每服十滴。至十五滴。小兒減半。病重者。至二十分鐘。再服。至愈爲度。用開水沖服。平時收藏。勿使洩氣。神效無比。孕婦忌服。此方由外國教士傳來。照方配合。施送有年。活人無算。真是夏令至寶。起死回生。較之市間所售普通痧藥水。價廉功倍。用特錄方於後。倘有樂善之士。照方配製。施送濟世。造福無量。

樟冰三兩

(即樟腦如升藥法
升過取精入藥)

廣木香三兩

研碎

大黃二兩

切片

廣陳皮二兩

切細絲

丁香三兩

研粗末

大茴香二兩

研粗末

剪小塊

陳大土二兩五錢

或用陳清膏烟炮一兩亦可

右藥七味。用頂好牛莊膏梁七斤。浸七天。或十天。取出藥渣澄清。去渣滓。將清者再過外國濾器。用濾紙濾極清。再加外國真原料薄荷汁十二兩。老薑汁十二兩。攪和裝瓶聽用。收藏不可洩氣。每料約價十元左右。可裝千瓶致送。再薄荷汁濾紙二物。西藥房均有出售者。

(滴法)即用瓶塞抵住瓶口。徐徐滴出。十滴約二分。

治一切陰陽痧絞腸痧中暑霍亂等症方

食鹽一握。揉擦兩手腕兩足心並心窩背心各處擦出許多紫紅點漸覺鬆快而愈。雖垂死者亦可復活。

按此外治法甚佳。且有奇效。惟揉擦時須自上而下。各種痧症均忌食薑。兼忌藿香正氣丸。

乾濕霍亂治法

無論乾濕霍亂。用食鹽一撮。放刀口上燒紅。沖一半滾水。一半冷水。共一鍾服之。立能止痛。按此方極靈。無論寒熱服之均效。

霍亂吐瀉良方

四明王振文君傳

此方專治霍亂吐瀉。腹痛絞腸痧。吊脚痧。時疫等症。

頂上川連二兩四錢

乾薑二兩一錢 薑撥六錢

丁香三錢

廣陳皮三錢

砂仁三錢

去壳

播去壳浮皮揀淨
車前子六錢

黃芩二兩一錢

炒麥芽三錢

真川貝六錢

荊芥穗三錢

右藥十一味。共爲細末。用鮮荷葉搗汁和藥爲丸。勿用蜜。每料分作二百丸。一丸。