

自适应学习系列  
示例演练实验用书

诺贝尔奖

获得者

教你轻松学数学

轻松学数学

# 几何

ZHONG XUE JI HE

第二册(下)(初二年级第二学期用)


朱新明 [美]赫伯特·西蒙(H.A.Simon)/主编

中国人民大学出版社

1310870

示例演练实验用书

(初二年级第二学期用)



朱新明  
[美] 赫伯特·西蒙(H.A.Simon) 主编



淮阴师院图书馆1010870

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

示例演练实验用书. 几何. 第二册 (下) (初二年级第二学期用)

朱新明, [美] 赫伯特·西蒙主编. 3 版

北京: 中国人民大学出版社, 2003

ISBN 7-300-04752-1/G · 984

I. 示…

II. ①朱… ②赫…

III. 几何课-初中-教学参考资料

IV. G634

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 102916 号

示例演练实验用书

几何

第二册 (下)

(初二年级第二学期用)

朱新明

[美] 赫伯特·西蒙 (H. A. Simon) 主编

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号 邮政编码 100080

电 话 010—62511242 (总编室) 010—62511239 (出版部)  
010—62515351 (邮购部) 010—62514148 (门市部)

网 址 <http://www.crup.com.cn>  
<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京市丰台区印刷厂

开 本 787×1092 毫米 1/16 版 次 2001 年 12 月第 1 版

2003 年 11 月第 3 版

印 张 17.75 印 次 2003 年 11 月第 1 次印刷  
字 数 450 000 定 价 19.00 元

## 前　　言

长期以来，中学教学普遍存在着师生负担过重的问题，学生忙于做作业，老师忙于批改作业，师生都在超负荷状态下运转，但教学效果却并不令人满意，甚至不少学生掉队厌学。如何减轻师生负担，提高教学质量是人们迫切要求解决的问题。

为探讨解决这个问题，中国科学院心理研究所在 20 世纪 60 年代曾实验过“程序教学”，结果表明其中有某些积极因素可以利用。80 年代初期，我国著名认知心理学家、国务院津贴享有者、中国科学院心理研究所朱新明教授开始从认知观点研究人的学习问题。他们与美国著名认知心理学家、诺贝尔奖获得者赫伯特·西蒙（H. A. Simon）教授从信息加工观点出发，探讨了示例学习和问题求解，研究发展了自适应产生式系统的模型，并提出了加强人对产生式条件认知和构造有效样例等思想。与此同时，他们以上述思想理论为指导，并结合“程序教学”的有利因素，编制了示例演练材料，让学生通过样例和通过问题求解进行学习，先后在我国和美国进行了实验。先是选择某些知识单元，如因式分解、幂的运算、平行四边形的性质和判定、三角形中位线、梯形中位线，以及物理学科中浮力部分等进行了试验。反复多次试验表明，这种方法能大大减轻师生负担，学生课外可以少做作业，当场消化知识，当场测试检验学习效果。实验的结果是实验班学生的平均分数比对比班高出 5 分～15 分，而且学习时间也缩短了。这项实验的部分结果及其理论研究刊登在美国《认知与教学》（Cognition and Instruction）杂志（1987）上。这一研究引起了国外认知心理学界极大的关注，特别是得到西蒙教授高度的赞扬和热情支持。在这期间，朱新明教授曾应邀赴美进行合作研究。这一研究结果，也引起了国内一些教师的兴趣，认为它为减轻师生负担、提高教学质量、缩短学时找到了一条出路。本研究的阶段成果，获中国科学院科技进步二等奖（1987）；其基础理论研究获中国科学院自然科学二等奖（1999）。本研究是全国教育科学规划“九五”和“十五”重点课题。

在实验初期，朱教授与胡奇老师合作，编写了初一至初三《代数》和《几何》的全部示例演练实验用书初稿，从 1985 年秋开始至 1987 年夏止，进行了实验，实验班学生在两年内接近学完三年的课程，与 1987 年应届初三毕业班学生进行了对比测验，获得了可喜的结果。近年又扩大了一些试点，也取得了明显的效果。从这些实验中，大家的认识越来越明确，都认为这是减轻师生负担、提高教学质量的一条行之有效的途径。因此还将继续扩大试点。

应各试点学校的要求，出版了此套示例演练实验用书。这套实验用书的最大特点是从学生学习的认知过程出发，由浅入深，循序渐进，以有指导的发现法，引导学生动脑、动手，使他们当场消化知识，当场达到一定的熟练程度。在教学上我们主张打破填鸭式和一刀切，力求体现启发式和分类推进的做法。

示例演练教材在历年修改的基础之上，今年在结构上增加了思考探究和阅读材料两部分。在材料设计上提供一些例题，创设一定的问题情景，启发学生积极思考，以学生发展为本，体现学生自主学习的过程。通过学生动手、动脑，有助于注意力的集中和知识的获取。依照新课程方案，在扩展提高部分，向学生提供一些现实、生动、有趣和富有挑战性的学习

素材，通过学习真正有意义、有价值的数学知识，激发学生学习的兴趣，提高学生的实践能力和创新意识，并且使他们提出问题、分析问题和解决问题的能力得到锻炼和提高。探索是学习的生命线，我们针对优等生选编了一些探索题和开放题，给学生探索与交流提供了素材和空间，让学生学会逻辑性思考问题，以自己的体验来获取知识和技能，使自己的潜能得到最大程度的展现与发挥。

《几何》第二册（下），是在1985年及历次试用稿的基础上编写的，于1997年、2000年、2001年和2002年作了不同程度的修改和补充，先后参加编写和修改者有：朱新明、胡奇、张海英、高素玉、周文、田凤云、乔家瑞、李亦菲、荣仪祖、耿昌敏、柳梅、张伟、韩伟、吴明铎、李志东、赵耘田、李桂军、李亚玲、林广站、李伟、齐越峰、王晓、沈晓燕、陈富光、汤剑辉、张国栋等。

本书在2003年又进行了修订和补充，参加这次修改及校对的有：张铁军、林广站、刘恒。由杨振英审稿。

**编者**

2003年10月

## 序 言

人们向来认为，数学难教、难学。因为数学在科技和人们生活中极为重要，所以必须寻求一种方法，使人们学好数学。

十多年前，在教儿童形成技能方面出现了一些新思想，主张不是对儿童讲授，而是给他们呈现例题、问题和答案，供他们学习。这种想法来自计算机学习，即让计算机具有学习能力的研究。

这项研究编制了计算机程序（所谓自适应产生式系统），使计算机能通过已经有解答步骤的例题，从中进行学习，从中发现导致成功解题的策略，最后还要修改它的程序，以便能执行这些策略，解答类似的各种问题。这一研究表明计算机能通过考察解题的样例进行学习。

计算机能以这种方式学习，那么儿童是不是也可以这样学习呢？如果可以的话，与传统的教学方法比较起来，对师生来说它是不是更省时省力？中国科学院心理研究所的朱新明教授及其同事对此甚为关注。从1983年起，他们就此问题进行了实验研究。朱教授依据理论编制了一系列示例让学生从中学习因式分解的技能，并对示例进行了精心安排。

这项实验非常成功。看来学生不必经老师讲述，就能从课题的示例中进行学习（教师着重辅导学习上有特殊困难的学生）。朱教授和我对实验结果与学生学习过程的材料进行分析、研究，形成了论文，并在美国和中国的心理学刊物上发表。这项研究成果引起了人们极大的兴趣，也引起了一些人沿着这种思路进行研究。

朱教授及其同事后来继续编写材料，编写了从初一至初三三年用的代数和几何示例演练教材。学生在课堂上处在积极的问题求解中。结果表明学生用这种方法学习，学得又快又好。一年后的追踪测验成绩表明，学生做到了真正理解，而不只是机械记忆。现在的这份教材就是在几次成功实验的基础上编成的。目前这项研究及其应用还只是在中国进行。类似这种规模的实验在其他国家还没有进行。这项研究已为认知心理学及其在教学中的应用作出了重要的贡献。

当然，已经做的工作还只是开始，这种方法还有待完善。另外，还要探讨其他学科，如物理、化学、生物乃至写作和阅读等应用这种方法的可能性。我希望其他国家也有人同他们协同努力。

最后，我想说：我和中国科学院心理研究所的协作已十年了，我为一直能参加这些工作而感到非常高兴。我于1983年春夏访问中华人民共和国，随后连续多次访问，我看到这些工作的进展是令人感到鼓舞的。科学是国际性的活动，我高度地评价同朱教授和其他同仁的合作，并祝愿他们继续进行他们的重要研究工作。

美国宾州

卡内基—梅隆大学

赫伯特·西蒙<sup>①</sup> (H. A. Simon)

1992年10月12日

① 赫伯特·西蒙 (H. A. Simon) 是前中美科技交流委员会美方主席，是当代认知科学的权威和人工智能创始人。他曾获诺贝尔奖、计算机科学的图灵奖和美国总统科学奖。1994年被中国科学院聘为首批外籍院士。

# 本书使用说明

本书在编写形式上是以例题和练习题的形式出现的，但不是习题集，它是一本使学生通过例题和解决问题来获取知识和技能的教材，称为《示例演练实验用书》。它是以现行中学数学教学大纲为基础，根据现代认知心理学和教育心理学关于人的学习机制的理论与原则，结合数学教学的特点，由中国科学院心理研究所的研究人员与具有丰富教学经验的数学教师合作编写又几经修改而成的。

示例演练的学习是一种新型的学习方法，它的特点是根据学生获取知识的心理机制，以有指导的发现法，引导学生进行积极主动的学习，使他们当堂消化知识，并能运用这些知识解决具体问题，达到一定的熟练程度。为了用好这套教材，学生和教师需要注意以下几点。

## 对学生的要求：

1. 在学习前，要准备好一支铅笔（用于做练习）、一支红笔（用于改错）、一块纸片（用于在学习时把书中右边的答案盖上）、一些草稿纸（用于演算）。
2. 在学习过程中，首先要认真看例题，弄清例题中条件与结论的联系，然后根据例题做下面的练习题。每做一个小题，就与右边的答案进行核对，做对了，继续往下做；做错了，想想错在什么地方，可用红笔改过来。
3. 在做练习时，要积极思考，自己得出结果后再核对答案；如果通过自己思考得不出结果，可以参考答案，并弄清答案为什么是正确的；如果不理解，可以举手问老师（或与同学讨论）。
4. 每一节课后的“课堂测验”是没有答案的，要求用草稿纸在课堂上独立完成，做完后立即可由学生照教师的答案互批，然后交教师审阅。
5. 在学习时要注意坐姿，保持眼睛与课本的适当距离。

## 对教师的要求：

1. 在刚开始用实验教材时，建议教师用3节至5节课的时间进行领学，使学生学会用这种新的教材进行示例演练学习（参见上面“对学生的要求”），使学生养成良好的学习习惯。
2. 如班级中学生的程度较好较齐（基本上没有差生），可以让学生自定步调进行学习，教师则进行个别辅导，并在课堂上对学习效果进行检测。在这种情况下，要防止学生单纯比速度的倾向。
3. 对一般的班级，可以采用精讲多练的方式组织教学。即在每节课的开始作引导性讲解（5分钟左右），激发学生的学习兴趣；然后让学生进行演练，教师作巡回辅导（30分钟左右）；剩下的时间可以总结本节课的知识，并对学习效果进行检测（10分钟左右）。这种方法要求学生保持大体一致的学习进度。
4. 教师在课堂上要调动每个学生的主动性和积极性，并重点辅导那些学习不认真和学习上有困难的学生。要纠正学生不动脑思考、见答案就抄的坏习惯，培养他们正确的学习态度和良好的学习习惯；在学生遇到困难时及时引导和鼓励，避免他们因受挫折而失去学习的信心和兴趣，要让学生得到一种学习成功的体验。

5. 学习材料是按课时设计的，每节课的题量较多，不要求每个学生都要完成。有少数标有星号的题目较难，教师可以只让部分较好的学生选做。

6. 在每堂课的学习内容后安排有课堂测验题，用来检测学生在这堂课中的学习效果。这些测验题主要适合于大多数中等程度的学生，为了适应学生的个别差异，教师可以让较好的学生做带●或\*的课堂测验题，以分类推进。教师也可以从各地的目标测试题和同步练习题中挑选一些题作为检测和补充练习。

这套教材既适合于学生课堂上在教师的辅导下进行学习，也适合学生或其他读者自学使用：希望它能够达到“减轻师生负担，提高教学质量”的目的，为我国的教学改革作出应有的贡献。欢迎广大教师使用这套教材，并在使用过程中积极参与教材的修改和编写工作，使这套教材不断完善。

凡新购买“示例演练”教材并参加实验班实验的学校及老师，请与“北京西蒙示例演练教育研究中心”联系，本中心将定期给学校邮寄“示例演练”实验通讯，并将有关活动（如教学观摩课，地区性研讨会及年度研讨会等）及时通告大家，以便各学校能派人参加。

联系地址：北京海淀区知春路 17 号 2 号楼 1203 室

邮政编码：100083 电话：(010) 82332362, 82311949

网 址：[www.simonedu.com](http://www.simonedu.com)

E-mail：[public @ simonedu.com](mailto:public@simonedu.com)

# 目 录

<b>第四章 四边形</b> .....	(1)
4.1 四边形 .....	(1)
4.2 多边形的内角和 .....	(8)
4.3 平行四边形及其性质.....	(13)
4.4 平行四边形的判定.....	(23)
4.5 矩形、菱形 .....	(40)
4.6 正方形.....	(66)
4.7 中心对称和中心对称图形.....	(79)
4.8 梯形.....	(92)
4.9 平行线等分线段定理 .....	(101)
4.10 三角形、中位线 .....	(106)
小结与复习.....	(130)
复习参考题四.....	(132)
检测题 4A .....	(144)
检测题 4B .....	(145)
检测题 4C .....	(147)
检测题 4A 答案 .....	(149)
检测题 4B 答案 .....	(150)
检测题 4C 答案 .....	(152)
<b>第五章 相似三角形</b> .....	(155)
5.1 比例线段 .....	(155)
5.2 平行线分线段成比例定理 .....	(168)
5.3 相似三角形定理 .....	(199)
5.4 三角形相似的判定 .....	(204)
5.5 相似三角形的性质 .....	(226)
小结与复习.....	(254)
复习参考题五.....	(256)
检测题 5A .....	(263)

检测题 5B .....	(264)
检测题 5C .....	(266)
检测题 5A 答案 .....	(267)
检测题 5B 答案 .....	(268)
检测题 5C 答案 .....	(269)
总检测题 .....	(271)
总检测题答案 .....	(273)

# 第四章

## 四边形

### 4.1 四边形

#### 1. 例题填空

(1) 如图 4—1, 正方形是由不在同一直线上的四条线段首尾顺次相接组成的图形, 它是四边形.




图 4—1

1.

(1)

(2) 如图 4—2, 长方形是由不在同一直线上的\_\_\_\_条线段首尾顺次相接组成的图形, 它是\_\_\_\_边形.




图 4—2

(2)

四

四

(3) 如图 4—3, 梯形是由\_\_\_\_\_线段首尾顺次相接组成的图形, 它是\_\_\_\_边形.




图 4—3

(3) 不在同一直线上的四条

四

(4) 如图 4—4, 是由不在同一直线上的\_\_\_\_条线段首尾顺次相接组成的图形, 它是\_\_\_\_边形.




图 4—4

(4)

四

四

**小结:** 在平面内, 由不在同一条直线的\_\_\_\_\_条线段首尾顺次相接组成的图形, 叫做四边形(如图 4—4).

四

#### 2. 四边形的顶点

(1) 组成四边形的各条线段叫做四边形的**边**;

2.

(1)

(2) 每相邻的两条边的公共端点叫做四边形的**顶点**.

(2)

(3) 如图 4—1, 正方形有\_\_\_\_条边, 有\_\_\_\_个顶点.

(3) 四; 四

(4) 如图 4—2, 长方形有\_\_\_\_条边, 有\_\_\_\_个顶点.

(4) 四; 四

(5) 如图 4—3, 梯形有\_\_\_\_条边, 有\_\_\_\_个顶点.

(5) 四; 四

(6) 如图 4—4, 它有\_\_\_\_条边, 有\_\_\_\_个顶点.

(6) 四; 四

小结:四边形有\_\_\_\_条边,有\_\_\_\_个顶点.

四;四

### 3. 四边形的表示法

(1)如图 4—4,四边形有四个顶点 A、B、C、D,记作:四边形 ABCD.

(2)如图 4—5 中,有\_\_\_\_个四边形,它们分别为:\_\_\_\_\_.




图 4—5

3.

(1)

(2)三;

四边形 ABFE,四边形 EFCD,四边形 ABCD.

小结:用字母表示四边形时,要按顺时针或逆时针的顺序依次写出顶点字母.

### 4. 四边形的对角线

(1)如图 4—6 中,顶点 A 与 C, B 与 D 为不相邻的顶点,连结 AC、BD,则 AC、BD 是四边形 ABCD 的对角线.




图 4—6

4.

(1)

(2)

不相邻  
对角线;CE,DF

(2)如图 4—5 中,四边形 ABFE 中,顶点 A 与 F, B 与 E 为\_\_\_\_的顶点,连结 AF、BE,则 AF、BE 是四边形 ABFE 的\_\_\_\_\_;四边形 EDCF 中,\_\_\_\_是对角线.

小结:在四边形中连结不相邻两个顶点的线段叫做四边形的\_\_\_\_\_.

对角线

### 5. 四边形的内角

(1)如图 4—4,四边形 ABCD 的边 AB 与 BC 所组成的角是\_\_\_\_\_;边 AB 与 AD 所组成的角是\_\_\_\_\_;边 CD 与 AD 所组成的角是\_\_\_\_\_;边 CD 与 BC 所组成的角是\_\_\_\_\_,这些角都是四边形 ABCD 的内角,也称四边形 ABCD 的角.

(2)如图 4—5,四边形 AEFB 的内角为\_\_\_\_\_,四边形 CDEF 的内角为\_\_\_\_\_.

5.

(1)

$\angle ABC, \angle BAD$

$\angle ADC$

$\angle BCD$

(2) $\angle A, \angle B, \angle AEF, \angle EFB$   
 $\angle C, \angle D, \angle DEF, \angle EFC$

小结:①四边形\_\_\_\_两边所组成的角叫做四边形的内角,简称四边形的角.

①相邻

②四边形有\_\_\_\_个内角.

②四

### 6. 四边形的内角和

(1)正方形四个内角的和等于\_\_\_\_\_度.

6.

(1)360°

(2) 长方形的四个内角的和等于\_\_\_\_\_度.

(3) 如图 4—7, 对角线 AC 分四边形 ABCD 为\_\_\_\_个三角形,

即:  $\triangle$ \_\_\_\_\_,  $\triangle$ \_\_\_\_\_.

$$\therefore \angle 1 + \angle 2 + \angle B = \text{_____},$$

$$\angle 3 + \angle 4 + \angle D = \text{_____},$$

$$\therefore \angle 1 + \angle 2 + \angle B + \angle 3 + \angle 4 + \angle D = \text{_____},$$

$$\because \angle 1 + \angle 4 = \text{_____}, \quad \angle 2 + \angle 3 = \text{_____},$$

$$\therefore \angle B + \angle BCD + \angle D + \angle BAD = \text{_____}.$$

(4) 四边形 ABCD 的四个内角的和等于这两个三角形的内角的\_\_\_\_; 即等于  $2 \times 180^\circ = \text{_____}$ .

**定理:** 四边形内角的和等于\_\_\_\_\_.

**注意:** 将四边形分割为三角形是解决四边形问题的一种方法.

7. 如图 4—8, 已知直线 CB  $\perp$  AB, 垂足为 B, 直线 CD  $\perp$  AD, D 为垂足.

$$\text{求证: (1)} \angle A + \angle 1 = 180^\circ;$$

$$\text{(2)} \angle A = \angle 2.$$

证明:




图 4—8

(2)  $360^\circ$

(3)

二

ABC; ACD

$180^\circ$

$180^\circ$

$360^\circ$

$\angle BAD; \angle BCD$

$360^\circ$

(4)

和;  $360^\circ$

**360°.**

7.

(1)

$\because CB \perp AB, CD \perp AD,$

$$\therefore \angle ABC = 90^\circ, \angle ADC = 90^\circ,$$

$$\text{又} \because \angle A + \angle ABC + \angle 1 + \angle ADC = 360^\circ,$$

$$\therefore \angle A + \angle 1 = 360^\circ - 90^\circ - 90^\circ = 180^\circ;$$

(2)

$$\because \angle A + \angle 1 = 180^\circ,$$

$$\angle 2 + \angle 1 = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle A = \angle 2.$$

## 课堂测验一

### A 组

1. 四边形有\_\_\_\_条边, \_\_\_\_个顶点, \_\_\_\_个内角, \_\_\_\_条对角线.

2. 什么叫做四边形的对角线?


3. 什么叫做四边形的内角?

4. 四边形内角和的定理是什么?

### B组

1. 四边形  $ABCD$  中, 共有\_\_\_\_条对角线, 它们是\_\_\_\_.
2. 四边形的一条对角线将这个四边形分成\_\_\_\_个三角形.
3. 若一个四边形四个内角度数之比为  $1:2:3:4$ , 则四个内角的度数分别为\_\_\_\_\_.
4. 四边形中, 最多可以有\_\_\_\_个内角为锐角, 最少有\_\_\_\_个内角为钝角.
5. 若一个四边形的四个内角都相等, 则每个内角的度数等于\_\_\_\_.
6. 如图, 已知在四边形  $ABCD$  中,  $\angle BAD$  与  $\angle ABC$  平分线交于  $E$  点,


求证:  $\angle C + \angle D = 2\angle AEB$ .



6题图

### C组

1. 什么叫做四边形?
2. 四边形  $ABCD$  中, 若  $\angle A=80^\circ$ ,  $\angle C=90^\circ$ , 则  $\angle B+\angle D=$ \_\_\_\_\_.
3. 四边形  $ABCD$  中, 已知  $\angle A=60^\circ$ ,  $\angle B=100^\circ$ ,  $\angle C$  比  $\angle D$  的 2 倍还多  $20^\circ$ ,  
求:  $\angle C$  和  $\angle D$  的度数.
4. 如图, 已知在四边形  $ABCD$  中,  $CD \parallel AB$ ,  $\angle D=100^\circ$ ,  
 $\angle C:\angle B=3:2$ , 求  $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$  的度数.



4题图

### ☆思考与探究

1. 如图 1, 在四边形  $ABCD$  内任取一点  $O$ , 连结  $OA$ 、 $OB$ 、 $OC$ 、 $OD$ . 根据图形, 你怎样求出四边形  $ABCD$  的内角和?




图 1

2. 如图 2, 在四边形  $ABCD$  的边  $BC$  上任取一点  $M$ , 连结  $MA$ 、 $MD$ . 根据图形, 你能推导出四边形内角和定理吗?




图 2

8. 填空

- (1) 如图 4—9, 四边形 ABCD 中,  $\angle 1$  的一边 AD 与另一边 BA 的延长线所组成的角  $\angle \alpha$  是四边形 ABCD 的一个外角.
- (2)  $\angle 2$  的一边 BA 和另一边 CB 的延长线所组成的角  $\angle \beta$ , 是四边形 ABCD 的一个\_\_\_\_\_.
- (3)  $\angle 3$  的一边 CB 和另一边 DC 的\_\_\_\_\_所组成的角  $\angle \gamma$  是四边形 ABCD 的一个\_\_\_\_\_.
- (4)  $\angle 4$  的一边 DC 和另一边 AD 的\_\_\_\_\_所组成的角  $\angle \delta$  是四边形 ABCD 的一个\_\_\_\_\_.




图 4—9

8.

(1)

(2)

外角

(3) 延长线

外角

(4) 延长线

外角

小结: ①四边形的角的一边与另一边的延长线所组成的角叫做四边形的\_\_\_\_\_.

②四边形的外角是与它有公共顶点的内角的\_\_\_\_\_.

①

外角

②邻补角

9. 如图 4—9, 已知四边形 ABCD 的四个外角分别为  $\angle \alpha$ 、 $\angle \beta$ 、 $\angle \gamma$ 、 $\angle \delta$ , 求:  $(\angle \alpha + \angle \beta + \angle \gamma + \angle \delta)$  的度数.

解:  $\because \angle 1 + \angle \alpha = 180^\circ$ ,  $\angle 2 + \angle \beta = \underline{\quad}$ ,  
 $\angle 3 + \angle \gamma = \underline{\quad}$ ,  $\angle 4 + \angle \delta = \underline{\quad}$ ,  
 $\therefore (\angle 1 + \angle \alpha) + (\angle 2 + \angle \beta) + (\angle 3 + \angle \gamma) + (\angle 4 + \angle \delta) = \underline{\quad} = \underline{\quad}$ .  
整理, 得  $\angle \alpha + \angle \beta + \angle \gamma + \angle \delta = \underline{\quad} - (\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 + \angle 4)$   
 $\because \angle 1 + \angle 2 + \angle 3 + \angle 4 = \underline{\quad}$ .  
 $\therefore \angle \alpha + \angle \beta + \angle \gamma + \angle \delta = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ .

9.

$180^\circ$

$180^\circ; 180^\circ$

$4 \times 180^\circ; 720^\circ$

$720^\circ$

$360^\circ$

$720^\circ; 360^\circ; 360^\circ$

小结: ①在四边形的每个顶点处取它的一个外角, 这四个外角的和就是四边形的外角和.

②四边形的外角和等于\_\_\_\_\_.

①

② $360^\circ$

课堂测验二

A 组

1. 四边形的外角是与它有公共顶点的内角的\_\_\_\_\_角.

2. 什么叫做四边形的外角?

3. 四边形的内角和等于\_\_\_\_°, 外角和等于\_\_\_\_°.

4. 已知四边形周长等于 42 cm, 四条边长的比为 2 : 3 : 4 : 5, 求这个四边形各边的长.


### B组

#### 1. 填空题

(1) 四边形的四个内角的度数的比为 2 : 3 : 4 : 5, 则这个四边形的四个内角的度数分别为\_\_\_\_\_.


(2) 在四边形 ABCD 中, 已知  $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = m^\circ$ , 则  $m = \underline{\hspace{2cm}}$ .

(3) 如图, 图中有\_\_\_\_个四边形, 用字母分别把它们表示出来\_\_\_\_\_.




(3) 题图

(4) 如图, 在四边形 ABCD 中,  $CD \perp AD$ ,  $\angle B = 63^\circ$ ,  $\angle A = 155^\circ$ , 则  $\angle C = \underline{\hspace{2cm}}$ .



(4) 题图

(5) 如图, 已知  $\angle ABE = 138^\circ$ ,  $\angle BCF = 98^\circ$ ,  $\angle CDG = 69^\circ$ , 则  $\angle DAB = \underline{\hspace{2cm}}$ .



(5) 题图

#### 2. 选择题

(1) 四边形 ABCD 的所有的外角和的度数为( )。

(A)  $180^\circ$  (B)  $360^\circ$  (C)  $720^\circ$  (D)  $1440^\circ$

(2) 四边形的外角是( )。

(A) 内角的邻角 (B) 与内角有公共顶点的角  
(C) 内角的邻补角 (D) 以上都不对

#### 3. 判断题

(1) 四边形的两条对角线的和一定小于这个四边形的周长。( )

(2) 四边形的两条对角线的和一定大于这个四边形的周长的一半. ( )

(3) 四边形中的四个内角可以同为锐角或同为钝角. ( )

### C 组

1. 四边形 ABCD 中, 已知  $AB=20 \text{ mm}$ ,  $BC=30 \text{ mm}$ ,  $CD=13 \text{ mm}$ ,  $DA=21 \text{ mm}$ , 则这个四边形的周长等于\_\_\_\_\_.


2. 四边形 ABCD 中, 已知  $\angle A+\angle C=180^\circ$ ,  $\angle A:\angle B:\angle C=1:2:3$ , 则  $\angle D=$ \_\_\_\_\_°.

3. 一个四边形的周长为 33 cm, 其四边长之比为 2:2:3:4, 求: 这个四边形的各边的长.

4. 如图, 已知四边形 ABCD 各内角的平分线交于点 E、F、G、H.

求证:  $\angle AED+\angle BGC=180^\circ$ ;

$\angle EFG+\angle GHE=180^\circ$ .




4 题图

5. 如图, 已知在四边形 ABCD 中,  $\angle A=\angle C=90^\circ$ , BE 平分  $\angle B$ ,

$DF\parallel BE$ ,

求证:  $DF$  平分  $\angle ADC$ .



5 题图

### ☆思考与探究

如图 1, 已知四边形 ABCD 的外角平分线, 分别交于 E、F、G、H. 根据以上条件, 请你猜想:  $\angle GEF$  与  $\angle GHF$  有什么关系?  $\angle EGH$  与  $\angle EFH$  呢? 并证明之.




图 1