



中醫百日通

中國醫藥
入門叢書

傷寒入門

上海
中西醫藥書局印行

叢書
總目

診脈入門	內經入門	女科入門	外科入門	〔附牙科〕
辨舌入門	金匱入門	產科入門	傷科入門	
藥性入門	傷寒入門	痘科入門	喉科入門	
湯頭入門	溫病入門	幼科入門	眼科入門	

中國醫藥叢書
(傷) (寒) (入) (門)

上海中西醫藥書局印行



1954


南京中医药大学图书馆版权所有

中國醫藥入門叢書

中國醫藥入門叢書

● 眼科入門	● 喉科入門	● 傷科入門	● 外科入門	● 痘科入門	● 幼科入門	● 產科入門	● 女科入門	● 溫病入門	● 傷寒入門	● 金匱入門	● 內經入門	● 湯頭入門	● 藥性入門	● 辨舌入門	● 診脈入門
定價洋三角	定價洋三角	定價洋四角	定價洋五角	定價洋四角	定價洋三角	定價洋四角	定價洋三角	定價洋四角	定價洋四角	定價洋四角	定價洋四角	定價洋三角	定價洋四角	定價洋三角	定價洋四角

全部六十種加錦套定價洋伍圓正



編輯者 陳景歧

校閱者 吳嘉寶

發行者 吳駿公

印刷者 中西書局

發行所 上海望平街中市
中西書局總店

外埠函購注意

本局發行各類書籍，依照定價大都為特價六折發售，外埠函購加寄費一成，如蒙惠顧，請直接函寄「上海望平街中西書局總店」即妥，郵票代洋十足通用，如需圖書目錄函索即寄。

中國醫藥
入門叢書

傷寒入門目錄

【一】張仲景傷寒論

一．辨太陽病脈證篇

二．辨陽明病脈證篇

三．辨少陽病脈證篇

四．辨太陰病脈證篇

五．辨少陰病脈證篇

六．辨厥陰病脈證篇

七．辨霍亂病脈證併治法

八．辨陰陽易差後勞復脈證

〔二〕陳修園長沙方歌括

一．太陽方

桂枝湯

桂枝加葛根湯

桂子加附子湯

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝二麻黃一方

白虎加人參湯

桂枝二越婢

一湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

甘草乾薑湯

芍藥甘草湯

調胃

承氣湯

四逆湯

葛根湯

葛根加半夏湯

葛根黃芩黃連湯

麻

黃湯

大青龍湯

小青龍湯

桂枝加厚朴杏仁湯

乾薑附子湯

桂枝加芍藥生薑人參新加湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

桂枝甘草湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

厚朴生薑甘草半夏人參湯

茯苓桂枝白朮

甘草湯

芍藥甘草附子湯

茯苓四逆湯

五苓散

茯苓甘草湯

梔子豉湯

梔子甘草豉湯

梔子生薑豉湯

梔子厚朴湯

梔子乾

薑湯 眞武湯 小柴胡湯 小建中湯 大柴胡湯 柴胡加芒硝湯

桃仁承氣湯 柴胡加龍骨牡蠣湯 桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨

救逆湯 桂枝加桂湯 桂枝甘草龍骨牡蠣湯 抵當湯 大小陷胸

湯 文蛤散 白散 柴胡桂枝湯 柴胡桂枝乾薑湯 半夏瀉心湯

十棗湯 大黃連瀉心湯 附子瀉心湯 生薑瀉心湯 甘草瀉心

湯 赤石脂禹餘糧湯 旋覆代赭湯 桂枝人參湯 瓜蒂散 黃芩

湯 黃芩加半夏生薑湯 黃連湯 桂枝附子湯 桂枝附子去桂加

白朮湯 甘草附子湯 白虎湯 炙甘草湯

二・陽明方

大承氣湯 小承氣湯 豬苓湯 蜜煎導方 豬胆汁方 茵陳蒿湯

吳茱萸湯 見下少陰方 麻仁丸 梔子蘗皮湯 麻黃連軹赤小豆湯

三·少陽方

小柴胡湯

見上太陽方

四·太陰方

桂枝加芍藥湯

桂枝加大黃湯

五·少陰方

麻黃附子細辛湯

麻黃附子甘草湯

黃連阿膠湯

附子湯

桃花

湯 吳茱萸湯

豬膚湯

甘草湯

桔梗湯

苦酒湯

半夏散及湯

白通湯

白通加豬胆汁湯

眞武湯

見上太陽方

通脈四逆湯

四逆散

六·厥陰方

烏梅丸

當歸四逆湯

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

麻黃升麻湯

乾薑黃連黃芩人參湯

白頭翁湯

七·霍亂方

四逆加人參湯 理中丸 通脈四逆加豬胆汁湯

八·陰陽易差後復勞方

燒裨散 枳實梔子豉湯 牡蠣澤瀉散 竹葉石膏湯

中國醫藥
入門叢書

傷寒入門

〔一〕張仲景傷寒論

一·辨太陽病脈證篇

太陽之爲病。脈浮。頭項強痛而惡寒。

太陽病。發熱。汗出惡風。脈緩者。名爲中風。

太陽病。或已發熱。或未發熱。必惡寒。體痛。嘔逆。脈陰陽俱緊者。名曰傷寒。
傷寒一日。太陽受之。脈若靜者。爲不傳也。頗欲吐者。若躁煩。脈數急者。爲傳也。傷寒二三日。陽明少陽證不見者。爲不傳也。

太陽病。發熱而渴。不惡寒者。爲溫病。若發汗已。身灼熱者。名曰風溫。風溫爲病。脈陰陽俱浮。自汗出。身重多眠睡。息必鼾。語言難出。若被下者。小便

不利。直視失溲。若被火者。微者發黃色。劇則如驚癇。時瘕瘕。若火熏之一逆。尙引日。再逆促命期。

病有發熱惡寒者。發於陽也。無熱惡寒者。發於陰也。發於陽者七日愈。發於陰者六日愈。以陽數七陰數六故也。

太陽病頭痛。至七日以上自愈者。以行其經盡故也。若欲作再經者。針足陽明。使經不傳則愈。

太陽病欲解時。從已至未上。

風家表解而不了了者。十二日愈。

病人身大熱。反欲得近衣者。熱在皮膚。寒在骨髓也。身大寒。反不欲近衣者。寒在皮膚。熱在骨髓也。

太陽中風。陽浮而陰弱。陽浮者熱自發。陰弱者汗自出。嗇嗇惡寒。淅淅惡

風翕翕發熱鼻鳴乾嘔者。桂枝湯主之。

太陽病頭痛發熱汗出惡風者。桂枝湯主之。

太陽病項背強几几反汗出惡風者。桂枝加葛根湯主之。

太陽病下之後其氣上衝者可與桂枝湯方用前法。若不上衝者不可與之。

太陽病三日已發汗若吐若下若溫針仍不解者此爲壞病。桂枝不中與也。觀其脉證知犯何逆隨證治之。

桂枝本爲解肌。若其人脉浮緊發熱汗不出者不可與也。當須識此勿令誤也。

若酒客病不可與桂枝湯。得湯則爲嘔。以酒客不喜甘故也。

喘家作桂枝湯加厚朴杏子佳。

凡服桂枝湯吐者。其後必吐膿血也。

太陽病發汗遂漏不止。其人惡風。小便難。四肢微急。難以伸屈者。桂枝加附子湯主之。

太陽病下之後。脈促胸滿者。桂枝去芍藥湯主之。若惡寒者。桂枝去芍藥方中加附子湯主之。

太陽病得之八九日。如瘧狀。發熱惡寒。熱多寒少。其人不嘔。圜便欲自可。一日二三度發。脈微緩者。爲欲愈也。脈微而惡寒者。此陰陽俱虛。不可更發汗。更下。更吐也。面色反有熱色者。未欲解也。不能得小汗出身。必癢。宜桂枝麻黃各半湯。

太陽病。初服桂枝湯。反煩不解者。先刺風池。風府。却與桂枝湯。則愈。

服桂枝湯。大汗出。脈洪大者。與桂枝湯。如前法。若形如瘧。日再發者。汗出

必解。宜桂枝二麻黃一湯。

服桂枝湯。大汗出後。大煩渴不解。脉洪大者。白虎加人參湯主之。太陽病發熱惡寒。熱多寒少。脉微弱者。此無陽也。不可發汗。宜桂枝二越婢一湯方。

服桂枝湯。或下之。仍頭項強痛。翕翕發熱。無汗。心下滿。微痛。小便不利者。桂枝去桂加茯苓白朮湯主之。

傷寒脉浮。自汗出。小便數。心煩微惡寒。脚攣急。反與桂枝湯以攻其表。此誤也。得之便厥。咽中乾。煩躁吐逆者。作甘草乾薑湯與之。以復其陽。若厥愈足溫者。更作芍藥甘草湯與之。其脚卽伸。若胃氣不和。譫語者。少與調胃承氣湯。若重發汗。復加燒針者。四逆湯主之。

問曰。證象陽旦。按法治之而增劇。厥逆。咽中乾。兩脰拘急而譫語。師曰。言

夜半手足當溫。兩脚當伸。後如師言。何以知此。答曰。寸口脈浮而大。浮則爲風。大則爲虛。風則生微熱。虛則兩脛攣。病證象桂枝。因加附子參其間。增桂令汗出。附子溫經亡陽故也。厥逆咽中乾。陽明內結。譫語煩亂。更飲甘草乾薑湯。夜半陽氣還。兩足當溫。脛尙微拘急。重與芍藥甘草湯。爾乃脛伸。以承氣湯微溏則止。其譫語。故病可愈。

太陽病。項背強。几几無汗惡風者。葛根湯主之。

太陽與陽明合病者。必自下利。葛根湯主之。

太陽與陽明合病。不下利。但嘔者。葛根加半夏湯主之。

太陽病。桂枝證。醫反下之。利遂不止。脈促者。表未解也。喘而汗出者。葛根黃芩黃連湯主之。

太陽病。頭痛發熱。身疼腰痛。骨節疼痛。惡風無汗而喘者。麻黃湯主之。

太陽與陽明合病。喘而胸滿者。不可下。宜麻黃湯主之。

太陽病。十日已去。脉浮細而嗜臥者。外已解也。設胸滿脇痛者。與小柴胡湯。脉但浮者。與麻黃湯。

太陽中風。脉浮緊。發熱惡寒。身疼痛。不汗出而煩躁者。大青龍湯主之。若脉微弱。汗出惡風者。不可服。服之厥逆。筋惕肉瞤。此爲逆也。

傷寒脉浮緩。身不疼。但重。乍有輕時。無少陰證者。大青龍湯發之。傷寒表不解。心下有水氣。乾嘔發熱而欬。或渴。或利。或噎。或小便不利。少腹滿。或喘者。小青龍湯主之。

傷寒心下有水氣。欬而微喘。發熱不渴。服湯已渴者。此寒去欲解也。小青龍湯主之。

太陽病。外證未解。脉浮弱者。當以汗解。宜桂枝湯。

太陽病下之微喘者。表未解故也。桂枝加厚朴杏仁湯主之。

太陽病外證未解。不可下也。下之爲逆。欲解外者。宜桂枝湯主之。

太陽病先發汗不解而復下之。脈浮者不愈。浮爲在外而反下之。故令不愈。今脈浮。故知在外。當須解外則愈。宜桂枝湯主之。

太陽病脈浮緊。無汗發熱。身疼痛。八九日不解。表證仍在。此當發其汗。服藥已微除。其發煩目瞑。劇者必衄。衄乃解。所以然者。陽氣重故也。麻黃湯主之。

太陽病脈浮緊。發熱身無汗。自衄者愈。

二陽併病。太陽初得病時。發其汗。汗先出不徹。因轉屬陽明。續自微汗出。不惡寒。若太陽病證不罷者。不可下。下之爲逆。如此可小發汗。設面色綠。緣正赤者。陽氣怫鬱在表。當解之。熏之。若發汗不徹。不足言陽氣怫鬱不

得越。當汗不汗。其人煩躁。不知痛處。乍在腹中。乍在四肢。按之不可得其
人短氣。但坐以汗出不徹故也。更發汗則愈。何以知汗出不徹之脉。濇故
知也。

脉浮數者。法當汗出而愈。若下之。身重心悸者。不可發汗。當自汗出乃解。
所以然者。尺中脉微。此裏虛。須表裏實。津液自和。便自汗出愈。

脉浮緊者。法當身疼痛。宜以汗解之。假令尺中遲者。不可發汗。何以知其
然。以榮氣不足。血少故也。

脉浮者。病在表。可發汗。宜麻黃湯。脉浮而數者。可發汗。宜麻黃湯。病常自
汗出者。此爲榮氣和。然榮氣和者。外不諧。以衛氣不共榮氣和諧。故爾。以
榮行脉中。衛行脉外。復發其汗。榮衛和則愈。宜桂枝湯。

病人藏無他病。時發熱。自汗出而不愈者。此衛氣不和也。先其時發汗。則