

专业知识学习指导

内科、外科护理学

分册

主编 李群芳 罗黎明



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

专业知识学习指导

内科、外科护理学

分册

主编 李群芳 罗黎明
主审 蔡岳华 雷巍娥 陈雄新



中国水利水电出版社
www.cwpp.com.cn

中国标准书号

内 容 提 要

本书以护理和助产专业的内科护理学和外科护理学知识为基础,根据护理专业和助产专业的学习需要和护士执业资格考证的需要,以教科书为平台,较为全面地覆盖了教材的基本内容,并进行了纵向和横向的联系。

全书共分内科护理学篇和外科护理学篇两个部分:内科护理学篇包括九章内容,外科护理学篇包括十七章内容。

本书可作为三年制高职、五年制高职、三年制中职护理和助产专业的学习指导用书,也可供作为护士执业证书考试的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

专业知识学习指导. 内科、外科护理学分册 / 李群芳, 罗黎明主编. — 北京: 中国水利水电出版社, 2010.2

ISBN 978-7-5084-7251-5

I. ①专… II. ①李… ②罗… III. ①内科学: 护理学—自学参考资料②外科学: 护理学—自学参考资料
IV. ①R47

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第026967号

书 名	专业知识学习指导 内科、外科护理学分册
作 者	主 编 李群芳 罗黎明 主 审 蔡岳华 雷巍娥 陈雄新
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn
经 售	电话: (010) 68367658 (营销中心) 北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京民智奥本图文设计有限公司
印 刷	北京市地矿印刷厂
规 格	184mm×260mm 16开本 28.5印张 678千字
版 次	2010年2月第1版 2010年2月第1次印刷
印 数	0001—7000册
定 价	46.50元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

目 录

前言
答题说明

第一篇 内科护理学

第一章 绪论	2
答案	31
部分题解	33
第二章 呼吸系统疾病病人的护理	39
答案	82
部分题解	84
第三章 循环系统疾病病人的护理	91
答案	135
部分题解	137
第四章 消化系统疾病病人的护理	148
答案	170
部分题解	171
第五章 泌尿系统疾病病人的护理	174
答案	189
部分题解	190
第六章 血液及造血系统疾病病人的护理	195
答案	212
部分题解	213
第七章 内分泌及代谢性系统疾病病人的护理	215
答案	233
部分题解	234
第八章 风湿性疾病病人的护理	237
答案	245
部分题解	246
第九章 神经系统疾病病人的护理	247
答案	267
部分题解	268
二〇〇九年度卫生专业技术资格考试内科护理学试题	272
基础知识	272
相关专业知识	275

专业知识	279
参考答案	282

第二篇 外科护理学

第一章 绪论	285
答案	286
第二章 水、电解质及酸碱平衡失调病人的护理	287
答案	294
第三章 休克病人的护理	295
答案	299
第四章 外科营养支持病人的护理	300
答案	302
第五章 多器官功能衰竭综合征病人的护理	303
答案	308
第六章 麻醉病人的护理	309
答案	313
第七章 围手术期病人的护理	314
答案	324
第八章 外科感染病人的护理	326
答案	334
第九章 损伤病人的护理	335
答案	344
第十章 肿瘤病人的护理	346
答案	352
第十一章 颅脑疾病病人的护理	353
答案	356
第十二章 颈部疾病病人的护理	357
答案	362
第十三章 胸部疾病病人的护理	363
答案	373
第十四章 腹部疾病病人的护理	374
答案	401
第十五章 周围血管疾病病人的护理	403
答案	410
第十六章 泌尿及男性生殖系统疾病病人的护理	411
答案	425
第十七章 骨科疾病病人的护理	426
答案	444

第一章 绪 论

A₁型题

1. 体温过低见于（ ）。
A. 无菌性炎症 B. 大量失血性休克 C. 组织破坏
D. 恶性肿瘤 E. 免疫反应
2. 体温过低见于（ ）。
A. 组织破坏 B. 恶性肿瘤 C. 无菌性炎症
D. 甲状腺功能减退 E. 内出血
3. 体温过低指体温低于（ ）。
A. 35℃ B. 35.8℃ C. 36℃
D. 36.3℃ E. 36.8℃
4. 感染性发热最常见的病原体是
A. 病毒 B. 真菌 C. 细菌
D. 支原体 E. 衣原体
5. 心源性水肿的特点是（ ）。
A. 身体下垂部位及会阴部水肿 B. 颜面部水肿
C. 一定伴有胸腔积液 D. 一定伴有腹水 E. 渗出性水肿
6. 肾性水肿一般先发生在（ ）。
A. 双下肢 B. 骶尾部 C. 会阴部
D. 眼睑及面部 E. 腹腔
7. 三凹征常常出现在（ ）。
A. 严重的呼气性呼吸困难 B. 严重的吸气性呼吸困难
C. 混合性呼吸困难 D. 劳力性呼吸困难 E. 夜间阵发性呼吸困难
8. 呼气性呼吸困难主要见于（ ）。
A. 喉头水肿 B. 胸腔积液 C. 支气管肺癌
D. 肺炎 E. 支气管哮喘
9. 吸气性呼吸困难严重者可出现三凹征，三凹征是指（ ）。
A. 胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙在吸气时明显下陷
B. 胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙在呼气时明显下陷
C. 胸骨上窝、锁骨下窝和肋间隙在吸气时明显下陷
D. 胸骨下窝、锁骨上窝和肋间隙在吸气时明显下陷
E. 胸骨上窝、锁骨下窝和肋间隙在呼气时明显下陷
10. 严重肺炎引起混合性呼吸困难的发生机制是（ ）。
A. 大气道狭窄、梗阻 B. 广泛性肺部病变使呼吸面积减少

- C. 肺组织弹性减弱 D. 上呼吸道异物刺激
E. 肺组织弹性减弱及小支气管痉挛性狭窄 ()。
11. 呼气性呼吸困难的发生机制是 ()。
A. 大气道狭窄阻塞 B. 广泛性肺部病变使呼吸面积减少
C. 肺组织弹性减弱 D. 上呼吸道异物刺激
E. 肺组织弹性减弱及小气管痉挛性狭窄
12. 关于端坐呼吸的描述, 正确的是 ()。
A. 体力活动时发生, 休息可缓解
B. 多发生在夜间, 睡眠中可突然憋醒
C. 体力活动时发生, 含服硝酸甘油可缓解
D. 睡眠中憋醒, 咳嗽、咳痰, 坐起后缓解
E. 休息时有呼吸困难, 不能平卧, 被迫取坐位或半卧位
13. 声音嘶哑见于声带发炎或纵隔肿瘤压迫 ()。
A. 迷走神经 B. 喉返神经 C. 副交感神经
D. 臂丛神经 E. 面神经
14. 肺炎球菌肺炎在红色肝变期痰呈 ()。
A. 黑色 B. 黄色 C. 粉红色
D. 铁锈色 E. 绿色
15. 刺激性呛咳或带金属音的咳嗽应首先考虑 ()。
A. 喉炎 B. 肺脓肿 C. 肺癌
D. 哮喘 E. 左心功能不全
16. 痰液有恶臭味, 应考虑感染的病原菌是 ()。
A. 肺炎链球菌 B. 绿脓杆菌 C. 厌氧菌
D. 真菌 E. 结核菌
17. 每天咯血量为多少时属于大量咯血 ()。
A. >100ml B. >300ml C. >500ml
D. 100~500ml E. 500~1000ml
18. 发绀是见于 ()。
A. 毛细血管扩张充血 B. 红细胞量增多 C. 红细胞量减少
D. 血液还原血红蛋白增多 E. 毛细血管血流加速
19. 当毛细血管血液的还原血红蛋白超过下列哪项时, 皮肤黏膜即可出现发绀 ()。
A. 30g/L B. 45g/L C. 50g/L
D. 75g/L E. 100g/L
20. 哪种情况不易出现发绀 ()。
A. 肺心病心力衰竭 B. 严重贫血 C. 重度 CO 中毒
D. 先天性心脏病 E. 急性呼吸道阻塞
21. 患者缺氧时可出现 ()。
A. 口唇及四肢末梢发绀 B. 皮肤出血点 C. 皮肤弹性降低
D. 皮肤皮疹 E. 皮肤干燥

22. 全部血红蛋白处于还原状态也不出现发绀的是 ()。
- A. 左心衰竭 B. 右心衰竭 C. 严重贫血
D. 周围循环衰竭 E. 慢性呼吸衰竭
23. 缺氧的典型表现是 ()。
- A. 呼吸困难 B. 发绀 C. 意识障碍
D. 蛋白尿 E. 球结膜水肿
24. 中枢性呕吐常见于 ()。
- A. 尿毒症 B. 幽门梗阻 C. 晕动病
D. 肠梗阻 E. 梅尼埃 (Meniere) 病
25. 中枢性呕吐常见于 ()。
- A. 洋地黄中毒 B. 幽门梗阻 C. 急性胃炎
D. 肠梗阻 E. 梅尼埃 (Meniere) 病
26. 周围性呕吐常见于 ()。
- A. 颅内压增高 B. 肠梗阻 C. 代谢性酸中毒
D. 神经官能症 E. 洋地黄中毒
27. 判断上消化道出血严重性最关键的项目是 ()。
- A. 出血原因 B. 出血部位 C. 出血量
D. 出血速度 E. 出血持续时间
28. 上消化道出血最常见的病因是 ()。
- A. 胃癌 B. 消化性溃疡 C. 应激性溃疡
D. 胃黏膜脱垂 E. 尿毒症
29. 上消化道出血患者粪便隐血试验阳性提示 24h 失血量约 ()。
- A. 5ml 以上 B. 10ml 以上 C. 30ml 以上
D. 50ml 以上 E. 70ml 以上
30. 上消化道出血患者出现呕血, 提示胃内积血量达 ()。
- A. 5~50ml B. 50~150ml C. 150~250ml
D. 250~300ml E. 300~350ml
31. 能反映急性上消化道大出血患者血容量变化的观察项目是 ()。
- A. 神志 B. 呼吸 C. 瞳孔
D. 面色 E. 脉搏
32. 上消化道出血病人的粪便可呈 ()。
- A. 脓血样 B. 果酱样 C. 柏油样
D. 米泔水样 E. 白陶土样
33. 上消化道出血量达到多少时可产生黑便 ()。
- A. 5ml B. 30ml C. 60ml
D. 70ml E. 80ml
34. 上消化道大量出血是指数小时内失血量超过 ()。
- A. 400ml B. 500ml C. 800ml
D. 1000ml E. 1500ml

35. 判断消化道继续出血或再出血**不相符**的一项是 ()。
- A. 反复呕血或黑粪次数增加
B. 肠鸣音亢进
C. 血红蛋白测定与红细胞计数继续下降
D. 网织红细胞计数继续下降
E. 尿素氮持续增高
36. 下列提示上消化道出血患者出血在减少的是 ()。
- A. 肠鸣音亢进
B. 血压不稳定
C. 血细胞比容下降
D. 大便隐血试验转阴性
E. 呕出的血液转为暗红色
37. 急性腹泻最常见的病因是 ()。
- A. 肠道肿瘤
B. 肝硬化
C. 结肠过敏
D. 慢性肝炎
E. 食物中毒
38. 上消化道出血患者出现柏油样粪便提示 24h 出血量为 ()。
- A. 5~10ml
B. 10~30ml
C. 30~50ml
D. 50~70ml
E. 70~100ml
39. 急性腹泻最常见的病因是 ()。
- A. 肠道肿瘤
B. 肝硬化
C. 结肠过敏
D. 慢性肝炎
E. 急性传染病
40. 患者能保持基本的应答和简单的精神活动, 但有定向障碍, 对周围环境的理解和判断失常, 这种意识状态称为 ()。
- A. 嗜睡
B. 意识模糊
C. 昏睡
D. 浅昏迷
E. 深昏迷
41. 意识模糊可有 ()。
- A. 错觉、幻觉
B. 醒觉时反应迟钝
C. 醒时答话含糊不清
D. 定向力丧失, 乱语躁动
E. 大小便失禁
42. 浅昏迷和深昏迷的主要区别是 ()。
- A. 有无自主呼吸
B. 角膜反射及腹壁反射是否存在
C. 对声、光刺激的反应
D. 有无大、小便失禁
E. 能否被唤醒
43. 某患者推之不醒, 呼之不应, 瞳孔散大, 角膜反射消失, 可能为 ()。
- A. 嗜睡
B. 昏睡
C. 熟睡
D. 浅昏迷
E. 深昏迷
44. 慢性呼吸衰竭病人处于熟睡状态, 但可唤醒, 并可做简单正确的交谈, 但停止谈话后立即入睡, 称为 ()。
- A. 嗜睡
B. 意识模糊
C. 谵妄
D. 昏睡
E. 浅昏迷
45. 客观发现病人存在的病态现象称 ()。
- A. 主诉
B. 症状
C. 体征
D. 综合征
E. 临床特点
46. 触诊可以补充 ()。
- A. 视诊检查所不能确定的体征
B. 叩诊检查所不能确定的体征
C. 听诊检查所不能确定的体征
D. 嗅诊检查所不能确定的体征

71. 左锁骨上淋巴结肿大, 质地坚硬, 无明显压痛, 最可能是 ()。
- A. 鼻咽癌转移 B. 胃癌转移 C. 乳腺癌转移
D. 肺癌转移 E. 肝癌转移
72. 瞳孔缩小见于 ()。
- A. 颅内出血 B. 吗啡中毒 C. 脑疝
D. 阿托品中毒 E. 深昏迷
73. 瞳孔反射迟钝见于 ()。
- A. 昏迷病人 B. 脑梗死 C. 脑血栓
D. 药物中毒 E. 脑膜炎
74. **不应**出现颈静脉怒张的是 ()。
- A. 心包积液 B. 右心功能不全 C. 左心功能不全
D. 上腔静脉阻塞 E. 缩窄性心包炎
75. 扁桃体肿大超过咽腭弓属于 ()。
- A. I度 B. II度 C. III度
D. I度到II度之间 E. 以上都不是
76. 甲状腺肿大超过胸锁乳头肌外缘者, 称为 ()。
- A. I度肿大 B. II度肿大 C. III度肿大
D. IV度肿大 E. V度肿大
77. 胸廓前后径短于左右横径一半见于 ()。
- A. 肺气肿患者 B. 老年人 C. 慢性消耗性疾病者
D. 佝偻病患者 E. 矮胖体型者
78. 扁平胸的特征是 ()。
- A. 前后径短于左右横径的一半 B. 前后径增长
C. 前后径与左右径相等 D. 左右横径大于前后径 E. 前后径长于左右径
79. 桶状胸常见于 ()。
- A. 肺气肿 B. 肺水肿 C. 肺结核
D. 大量胸腔积液 E. 单侧气胸
80. 胸廓双侧对称性呼吸运动减弱常见于 ()。
- A. 肺不张 B. 气胸 C. 肺炎
D. 肺气肿 E. 胸膜粘连
81. 呼吸中枢兴奋性显著降低可出现 ()。
- A. 呼吸减慢 B. 间停呼吸 C. 陈-施呼吸
D. 呼吸加快 E. 库氏呼吸
82. 正常人静息状态下呼吸频率为 ()。
- A. 16~18次/min B. 16~20次/min C. 18~20次/min
D. 18~22次/min E. 20次/min
83. 呼吸增快是指呼吸超过 ()。
- A. 16次/min B. 18次/min C. 20次/min
D. 22次/min E. 24次/min

84. 呼吸减慢见于 ()。
- A. 甲状腺功能亢进 B. 胸膜病变 C. 心功能不全
D. 麻醉剂或镇静剂过量 E. 贫血
85. 代谢性酸中毒可出现 ()。
- A. 呼吸频率加快 B. 呼吸频率减慢 C. 陈施呼吸
D. 毕奥呼吸 E. 库氏呼吸
86. 库斯莫尔呼吸的特征是 ()。
- A. 呼吸由浅慢逐渐变为深快 B. 呼吸与呼吸暂停相交替 C. 呼吸表浅、快速
D. 呼吸深大而稍快 E. 呼吸急促、有屏气
87. 病人出现下列哪种呼吸提示病情最危急 ()。
- A. 潮式呼吸 B. 间停呼吸 C. 库斯莫尔呼吸
D. 呼吸浅速 E. 叹息样呼吸
88. 下列叙述**错误**的是 ()。
- A. 颅内压增高时呼吸减慢
B. 感染性疾病时呼吸急促
C. 吗啡中毒时呼吸过慢伴有叹息样呼吸
D. 蛛网膜下腔出血时有鼾声呼吸并伴有一侧面肌瘫痪
E. 代谢性酸中毒时表现为深而快的呼吸
89. 胸部触诊时, 语颤增强见于 ()。
- A. 肺气肿 B. 大量胸腔积液 C. 肺组织炎症
D. 阻塞性肺不张 E. 气胸
90. 语颤增强见于 ()。
- A. 肺气肿 B. 支气管阻塞 C. 气胸
D. 肺实变 E. 胸腔积液
91. 正常人肺部的叩诊音是 ()。
- A. 清音 B. 实音 C. 鼓音
D. 过清音 E. 浊音
92. 肺部叩诊呈鼓音见于 ()。
- A. 肺气肿 B. 肺结核 C. 肺水肿
D. 气胸 E. 肺实变
93. 符合慢性阻塞性肺气肿的体征是 ()。
- A. 叩诊呈鼓音 B. 单侧语颤减弱 C. 单侧呼吸运动减弱
D. 气管偏移 E. 呼气时间延长
94. 正常情况下, 肩胛下部听诊听到的声音是 ()。
- A. 肺泡呼吸音 B. 支气管呼吸音 C. 混合呼吸音
D. 干啰音 E. 湿啰音
95. 两肺底闻及湿啰音常见于 ()。
- A. 肺结核 B. 肺水肿 C. 左心功能不全
D. 右心功能不全 E. 以上都不是

- A. 二尖瓣狭窄 B. 二尖瓣关闭不全 C. 主动脉瓣狭窄
D. 主动脉瓣关闭不全 E. 三尖瓣关闭不全
109. 测量脉搏时应同时听心率, 测量 1min 以上的是 ()。
A. 短绌脉 B. 奇脉 C. 交替脉
D. 洪脉 E. 水冲脉
110. 计数脉搏的时间至少需 ()。
A. 15s B. 30s C. 1min
D. 2min E. 3min
111. 护士监测患者生命体征时发现脉搏低于 60 次/min, 提示患者有 ()。
A. 发热 B. 甲状腺功能亢进 C. 心动过缓
D. 心肌炎 E. 周围循环衰竭
112. 脉搏短绌见于 ()。
A. 窦性心动过缓 B. 心房颤动 C. 心室颤动
D. 房室传导阻滞 E. 阵发性心动过速
113. 水冲脉的特点 ()。
A. 脉搏不规则的搏动 B. 平静吸气时脉搏显著减弱
C. 脉搏强一弱交替出现 D. 脉搏骤起骤落 E. 脉搏细速
114. 脉率少于心率称 ()。
A. 脉搏短绌 B. 奇脉 C. 期前收缩
D. 交替脉 E. 缓冲脉
115. 脉搏减慢可见于 ()。
A. 动脉粥样硬化 B. 心功能不全 C. 失血性休克
D. 颅内压增高 E. 交替脉
116. 异常脉搏的**错误**临床意义是 ()。
A. 速脉见于周围循环衰竭 B. 交替脉见于室性早搏、二联律
C. 短绌脉为心房颤动的特征 D. 奇脉是缩窄性心包炎的体征之一
E. 水冲脉见于主动脉关闭不全
117. 左心衰竭的早期脉搏表现是 ()。
A. 脉搏短绌 B. 缓脉 C. 奇脉
D. 交替脉 E. 水冲脉
118. 脉搏一强一弱交替出现而节律正常的脉搏称为 ()。
A. 水冲脉 B. 奇脉 C. 交替脉
D. 不整脉 E. 正常脉搏
119. 吸气时脉搏明显减弱或消失, 呼气时脉搏增强, 称为 ()。
A. 水冲脉 B. 交替脉 C. 不整脉
D. 奇脉 E. 无脉
120. 成人高血压的诊断标准是 ()。
A. 收缩压 $\geq 130\text{mmHg}$ 和 (或) 舒张压 $\geq 80\text{mmHg}$
B. 收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 和 (或) 舒张压 $\geq 85\text{mmHg}$

- C. 收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 和（或）舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$
 D. 收缩压 $\geq 160\text{mmHg}$ 和（或）舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$
 E. 收缩压 $\geq 160\text{mmHg}$ 和（或）舒张压 $\geq 95\text{mmHg}$
121. 1999 年 WHO/ISH 对一级高血压的诊断标准是（ ）。
 A. 收缩压 $< 120\text{mmHg}$, 舒张压 $< 80\text{mmHg}$
 B. 收缩压 $< 130\text{mmHg}$, 舒张压 $< 85\text{mmHg}$
 C. 收缩压 $140\sim 159\text{mmHg}$, 舒张压 $90\sim 99\text{mmHg}$
 D. 收缩压 $130\sim 139\text{mmHg}$, 舒张压 $85\sim 89\text{mmHg}$
 E. 收缩压 $160\sim 179\text{mmHg}$, 舒张压 $100\sim 109\text{mmHg}$
122. 脉压增大见于（ ）。
 A. 低血压
 B. 心包积液
 C. 重度心功能不全
 D. 主动脉瓣关闭不全
 E. 严重二尖瓣狭窄
123. 脉压增大时可出现（ ）。
 A. 奇脉
 B. 交替脉
 C. 细迟脉
 D. 水冲脉
 E. 短绌脉
124. 周围血管征多见于（ ）。
 A. 二尖瓣狭窄
 B. 二尖瓣关闭不全
 C. 主动脉瓣狭窄
 D. 主动脉瓣关闭不全
 E. 三尖瓣关闭不全
125. 毛细血管搏动征见（ ）。
 A. 主动脉瓣狭窄
 B. 主动脉瓣关闭不全
 C. 二尖瓣关闭不全
 D. 二尖瓣狭窄
 E. 三尖瓣关闭不全
126. 健康人**不应**出现的体征是（ ）。
 A. 心脏杂音
 B. 心音分裂
 C. 早搏
 D. 奔马律
 E. 心动过速
127. 舟状腹常见于（ ）。
 A. 肝硬化
 B. 低血糖
 C. 恶病质
 D. 腹膜炎
 E. 胃扩张
128. 舟状腹可见于（ ）。
 A. 肝硬化
 B. 肝癌
 C. 严重脱水
 D. 结核性腹膜炎
 E. 饥饿
129. 腹壁静脉曲张常见于（ ）。
 A. 正常人
 B. 门静脉循环障碍
 C. 幽门梗阻
 D. 肠梗阻
 E. 腹部肿瘤
130. 上腹部可见到自左向右移动的胃蠕动波应考虑是（ ）。
 A. 幽门梗阻
 B. 肠麻痹
 C. 肠穿孔
 D. 急性胃扩张
 E. 腹膜炎
131. 腹部触诊有“揉面感”提示（ ）。
 A. 急性胃穿孔
 B. 肝硬化腹水
 C. 结核性腹膜炎
 D. 急性胰腺炎
 E. 急性胃扩张

132. 反跳痛发生的机制是 ()。
- A. 腹腔内有炎症 B. 结核性腹膜炎 C. 肠结核
D. 腹腔内有肿物 E. 炎症累及腹膜壁层
133. 腹壁明显紧张, 甚至强直硬如木板可见 ()。
- A. 急性胃穿孔 B. 结核性腹膜炎 C. 慢性肝炎
D. 腹腔肿瘤 E. 脾肿大
134. 正常人的肝脏在触诊 ()。
- A. 一般摸不到 B. 平静呼吸时可触到 1cm 以内的肝
C. 深吸气时在肋弓下可触及 2cm 以内的肝下缘
D. 剑突下可触及 4cm 以内的肝下缘
E. 在剑突下可触及 4cm 以上的肝下缘
135. 墨菲 (Murphy) 征阳性见于 ()。
- A. 急性阑尾炎 B. 急性胆囊炎 C. 慢性胆囊炎
D. 急性胃穿孔 E. 肾结石
136. 肝浊音区消失, 提示 ()。
- A. 急性重症肝炎 B. 肝硬化 C. 急性胃穿孔
D. 胃肠高度胀气 E. 肝癌
137. 腹部出现移动性浊音, 提示有 ()。
- A. 门静脉高压 B. 腹膜炎 C. 幽门梗阻
D. 腹水 E. 腹腔肿瘤
138. 腹部叩及移动性浊音, 标志有腹水量 ()。
- A. 100ml 以上 B. 200ml 以上 C. 500ml 左右
D. 600~800ml E. 1000ml 以上
139. 正常人的肠鸣音是 ()。
- A. 2~3 次/min B. 4~5 次/min C. 7~8 次/min
D. 5~10 次/min E. >10 次/min
140. 肠鸣音减弱或消失提示 ()。
- A. 肠炎 B. 痢疾 C. 肠结核
D. 肠麻痹 E. 肠痉挛
141. 肠鸣音亢进时, 每分钟至少听到肠鸣音 ()。
- A. 2 次 B. 4 次 C. 6 次
D. 8 次 E. 10 次
142. 下列疾病一般无杵状指 (趾) 的是 ()。
- A. 支气管扩张 B. 慢性风湿性心脏病 C. 肺脓肿
D. 支气管肺癌 E. 先天性心脏病
143. 指骨间关节呈梭状变形且活动受限, 见于 ()。
- A. 类风湿性关节炎 B. 风湿性关节炎 C. 骨质增生
D. 慢性缺氧性心肺疾病 E. 先心病
144. 下列属于深感觉的是 ()。