

金匱要略淺註方論合編

金匱要略淺註方論合編卷九

渭南嚴嶽蓮輯鐫

男式誨校補

閩長樂陳念祖修園著

成都劉彝銘覆校

山陰祝宗懷參校

婦人妊娠病脈證治第二十

師曰婦人

經斷後而

得平

和之

脈

關後為

陰

視關前

小弱

稍見

小弱

是胎元

其人渴

非上焦有熱乃

不能食

非胃家有病

乃惡心阻食

乃惡心阻食

不能食

乃惡心阻食

不能食

不能食

妊娠篇

渭南嚴氏彙

全日身... 刻醫學初階

也無寒熱外無表邪也名曰妊娠凡一切溫涼補瀉之劑皆未盡善唯以桂

枝湯主之於法六十日胎已成而氣干上當有此證設有醫

者不知爲孕而治之逆者卻一月先見此證若加吐下者

誤藥之爲施當明告其一誤不可再誤前爲藥苦茲則絕之易所謂勿藥有喜是也

尤在涇云平脈脈無病也卽內經身有病而無邪

脈之意陰脈小弱者初時胎氣未盛而陰方受蝕

故陰脈比陽脈小弱至三四月經血久畜陰脈始

強內經所謂手少陰脈動者妊子千金所謂三月

尺脈數是也其人渴妊子者內多熱也一作嘔亦
通今妊婦二三月往往惡阻不能食是已無寒熱
者無邪氣也夫脈無故而身有病而又非寒熱邪
氣則無可施治惟宜桂枝湯和調陰陽而已徐氏
云桂枝湯外證得之爲解肌和營衛內證得之爲
化氣調陰陽也今妊娠初得上下本無病因子室
有礙氣溢上下故但以芍藥一味固其陰氣使不
得上溢以桂甘薑棗扶上焦之陽而和其胃氣但

令上之陽氣充能禦相侵之陰氣足矣未嘗治病
正所以治病也否則以渴爲熱邪而解之以不能
食爲脾不健而燥之豈不謬哉六十日當有此證
者謂妊娠兩月正當惡阻之時設不知而妄治則
病氣反增正氣反損而嘔瀉有加矣絕之謂禁絕
其醫藥也婁全善云嘗治一少婦惡阻病吐前醫
愈治愈吐因思仲景絕之之旨以炒糯米湯代茶
止藥弓餘漸安○又一本絕之謂當斷絕其病根

不必泥於安胎之說而狐疑致誤也亦通

桂枝湯方

見傷寒

徐忠可云桂枝湯表證得之爲解肌和榮衛內證得之爲化氣調陰陽時醫以薑桂礙胎戒用汲汲以養血滋陰爲事皆不知仲景之法也

愚按本章末三句未

明願後之學者補續之

婦人

行經時經未淨或遇冷氣房事六淫邪氣沖斷其經則瘀血停畱凝聚成塊結於胞中名爲癥

病如宿有癥病

或不在子宮則仍行經而受孕經斷卽是孕矣乃

經斷未及三

全量要各經主治方論全編卷八 妊娠篇

溫南嚴氏彙

月而得漏下不止胎

無血以養則輒動若在臍下則胎真臍

上者此為

每月湊集之新血因

癥氣

癥氣堅阻其不入於胞之為

害

其血無所入而

下漏其實非胎病也

雖然經斷原有胎與胚之異欲知其的證必由今之三月上週前之三月統共以六

月為

妊娠六月動者

問而

前三月經水

順利應

時而無

前後參差其經

胎也

若前之三月其期經水遲早不定便知今之

下血者

乃後斷三月

所積

胚

而非

也然既有胎何以又為漏下而不知舊血未去則

新血不能入胞養

所以血不止者其癥不去故也

去則胎終

當下其癥

以桂枝茯苓丸主之

不安必

此爲妊娠宿有癥病而出其方治也

桂枝茯苓丸方

桂枝

茯苓

丹皮

桃仁

去尖皮熬

芍藥

各等分

右五味末之煉蜜丸如兔屎大每日食前服一丸

不知加至三丸

受業

林禮豐

按師云婦人宿有癥病者謂未受胎

之前本停瘀而有癥病也經斷者謂經水淨盡之

後交媾而得胎也未及三月而得漏下不止者謂
每月湊集之血因宿昔之癥瘕妨害之而下漏也
蓋六月胎動者胎之常三月胎動者胎之變然胎
當居臍下今動在臍上者是本有癥瘕在臍下逼
動其胎故胎不安而動於臍上也因復申言之曰
前三月經水利時胎也下血者後斷三月衃也衃
者謂每月湊集之血始凝而未痼也所以血不止
者其癥不去必害其胎去其癥卽所以安其胎也

故曰當下其癥主以桂苓丸者取桂枝通肝陽芍藥滋肝陰茯苓補心氣丹皮運心血妙在桃仁監督其間領諸藥直抵於癥瘕而攻之使瘀結去而新血無傷瘀既去則新血自能養胎雖不專事於安胎而正所以安胎也

婦人懷妊六七月脈弦發熱

有似表證

其胎愈脹

乃頭與身不痛

而

腹痛

背不惡寒而腹

惡寒

甚

少腹

陣陣作冷狀

如被

扇

所以然

者子臟開

而不能闔而風冷之氣乘之

故也

夫臟開風入其陰內勝則其弦爲陰氣而

發熱且爲格陽矣胎脹者熱則消寒則開也當以附子湯溫其臟

此爲胎脹少腹如扇者出其方治也

李氏云子臍卽子宮也臍下三寸爲關元左二寸爲胞門右二寸爲子宮昔人謂命門爲女子繫胞之處非謂命門卽子臍也金匱明明指出少腹何荒經者之聚訟紛紛也

附子湯方

見傷寒

男元犀

按太陽主表少陰主裏脈弦發熱者寒傷

太陽之表也腹痛惡寒者寒侵少陰之裏也夫胎居臍下與太少相連寒侵太少氣併胞宮迫動其胎故胎愈脹也腹痛惡寒少腹如扇者陰邪盛於內寒氣徹於外故現出陣陣如扇之狀也然胎得煖則安寒則動寒氣內勝必致墜胎故曰所以然者子臟開故也附子湯溫其臟使子臟溫而胎固自無隕墜之虞矣附子湯方未見疑是傷寒附子湯

師曰婦人有漏下者

妊娠經來俗謂之激經也有四五月墜胎謂之半產

半

產後

傷其血海

因續下血都不絕者有妊娠下血者

如前

瘕者固

假令妊娠

無瘕而下血惟見

腹中痛

者則為胞阻

胞阻者胞

中之氣血不和而阻其化育也以

膠艾湯主之

推而言之凡婦人經水淋瀝及胎產前後

下血不止者皆衝任脈虛陰氣不守也此方皆可補而固之

此為胞阻而出其方治也然此方為經水不調胎

產前後之總方

膠艾湯方

乾地黃

六兩

川芎

阿膠

甘草

各二兩

艾葉

當歸

各三兩

芍藥

四兩

右七味以水五升清酒三升合煮取三升去滓內

膠令消盡溫服一升日三服不差更作

男元犀

按芎藭芍地補血之藥也然血不自生生

於陽明水穀故以甘草補之阿膠滋血海爲胎產

百病之要藥艾葉煖子宮爲調經安胎之專品合

之爲厥陰少陰陽明及衝任兼治之神劑也後人

去甘草阿膠艾葉名爲四物湯則極實而不靈矣
婦人懷孕腹中疔痛當歸芍藥散主之

此爲懷孕腹中疔痛者出其方治也

徐忠可云疔痛者綿綿而痛不若寒疝之絞痛血
氣之刺痛也乃正氣不足使陰得乘陽而水氣勝
土脾鬱不伸鬱而求伸土氣不調則痛綿綿矣故
以歸芍養血苓朮扶脾澤瀉瀉其有餘之舊水芎
藭暢其欲遂之血氣不用黃芩疔痛因虛則稍挾

寒也然不用熱藥原非大寒正氣充則微寒自去耳

當歸芍藥散方

當歸

芍藥

各三兩

芍藥

一斤

茯苓

白朮

各四兩

澤瀉

半斤

右六味杵爲散取方寸匕酒和日三服

元犀

按懷妊腹痛多屬血虛而血生於中氣中者

土也土過燥不生物故以歸芍藥滋之土過溼

亦不生物故以苓朮澤瀉滲之燥溼得宜則中氣治而血自生其痛自止

妊娠胃中有寒飲則嘔吐嘔吐不止則寒而且虛矣以乾薑人參半夏

丸主之

此爲妊娠之嘔吐不止而出其方治也半夏得人參不惟不礙胎且能固胎

乾薑人參半夏丸方

乾薑

人參各一兩

半夏二兩