

凡種牲口病



的治療法

幾種牲口病

編科農業縣輝
版出1949.12.15
印局興長縣輝

編輯者

輝縣縣政府農業科
輝縣獸醫研究會

校正者

輝縣獸醫組長張恒賓
副組長李保林

發行者 輝縣縣政府農業科

印刷者 輝縣長興印刷局

出版時間 一九四九年十二月十五日

前言一

我縣近年來牲口疾病頗為嚴重特別二區牲口死亡時有所聞這是由於連年戰爭飼養不良醫生缺乏以致病疫流行死亡率增大繁殖率減少嚴重的損害了農業生產這就給我們提出保護繁殖牲畜成為恢復與發展農業生產中重大問題之一預防畜疫改善飼養管理方法對保護牲畜健康的功用很大俗云「若要用好牛一畝油」的明訓應當施取適用

現在我縣名醫既少特效葯尤缺故將本府七月二十九日召開全縣獸醫會議研究了預防常識與治療方法並交流了驗方與經驗經專署審查和准彙印成冊以便傳播推廣採用對廣大農民牲畜健康之保持生產力之提高是有莫大益處的。

馮秀夫

史亞夫

前言二

在目前的輝縣恢復和發展農業生產達到增產一成的主要問題是在保護勞畜力然後才能該到精耕細作

今年春夏以來各區牲口的流傳病發展的很厲害僅二區的四個村統計害傳皮毒死亡的一五頭各個區患偏次黃和肺毒死亡者達四〇頭俗語說「一個牲口半個家當」這不僅對農民現有經濟受到巨大損失而對發展生產的情緒上也受到嚴重打擊

七月二九日縣府召集了全縣獸醫會議研究了幾種治療和預防方法為了便於農民掌握和交流經驗特將它印成小冊子望各位熱心於牲口的同志和先生們隨時提出修改和補充意見是無任歡迎的

輝縣農業科

目錄

- (一) 預防辦法的一般普通常識
- (二) 瘡黃類
- (三) 治鼻類
- (四) 牛病類
- (五) 起卧類
- (六) 雜病類

(一)

預防辦法的一般普通常識：

(一)家畜住的地方要經常打掃保持清潔最好是東向南通風透
光並且不要太擁擠

(二)不要給家吃發黴的草料

(三)不讓一般人尤其是外來人走近畜舍對於外來的牲畜或新
買來的牲畜不應和家裡的牲畜同住新買的可分喂並另外圍起來
半月看是否有疾病再行同住同時一要問一下買牲口的地方是否有
疫病才免得傳染並經常打听附近發生疫病早作準備不使自己
的牲畜到有疾病地方去

(四)不要過度使喚牲口的胃口拉尿行動等和平常不同時就
應一面將牠分喂一面請醫生來看管理家畜要有一定習慣(一定時
候喂一定時間放一定時間勞動每天都是一樣

(五)對於已經病了牲畜除了和別的分開以外還要將其住處

洒石灰水消毒將其糞便及吃剩草料埋掉或燒掉如果已經死了則應將其埋葬絕不可食用或出賣送人且須埋五尺深並撒石灰

(六)牲口作活回來時先讓他休息一下放放滾然飲喂並注意飢渴交迫吃喝太猛

(七)休息時熱天宜拴在樹涼下冬天宜拴在和暖處注意撞風口和房簷底下最好用馬梳子刮刷幾次

(八)飲水要乾淨新鮮喂草要少填勤喂注意糞草(髒物)和塵土應該篩乾淨不然入頭髮鴉毛子繩頭子鉄片子扣吃針等就會吃下生病

(九)發現有疫病流行應馬上報告縣政府以求早日設法制止消滅它

輝縣農業科

(二) 瘡黃類：

(一) 瘟疫傳皮毒：

三區白馬峪張恒賓

甲、病狀：牲口身上不定處出一小疙瘩一旦發現半日就爛半個身即死

乙、病源：天氣冷熱不定喝凉水心肺受傷又因常喝濕的骯髒惡水中了毒牛患者多

丙、預防法：首先不叫牲口喝骯髒惡水另外對已流行這類病地區可叫一般牲口渴如下湯藥：

黃連

五小

黃芩

五小

黃柏

五小

木通

三小

甘草

五小

水送下

砒礞石引共研細末開水送下

丁、治療法：用刀順疙瘩割開挖出爛肉流膿的血水后用

糯米水洗再撒上白降丹即愈

(二) 偏次黃：(又名穿黃)(軟者黃硬者毒)三區白馬峪張恒賓

甲、病狀；胸骨兩旁出疙瘩小者如鴉蛋大者如斗盆硬

者可治軟者難醫腿癰吃草少驢馬駝肯出這病，

乙、病源；忙時使用疲癆過度沒等休息后先飲水而

吃料過多凝結胸腔於氣血才生黃

丙、治法；二花芍知母芍梔枝七小川貝六小川連六小川

軍芍桔梗七小枳實八小玉金七小二藥七小黃

芩七小木通七小甘草五小

硃硝引研細末開水中服

丁、針法；喉脈穴一針 胸腔穴一針。

戊、預防法；在春夏兩季用消毒藥服一付放大血可免

這病，

己、割方；與瘟疫傳皮毒同。

(3) 奶黃；

五區沿村姚智方

甲、病狀：如喝醉酒站不著，脚奶部出柿餅大一長

形疙瘩

乙、病源：疲勞過度生了火，喝凉水傷肺，

丙、預防法：疲乏牲口沒休息過不叫喝凉水，

丁、治法：知母^大 黃柏^小 烏零子^小 蒲黃炒^小 歸尾^小

赤芍^大 川連^四 二花^力 連虎^六 木通^大 澤瀉^小

青皮^大 甘草^四 紅花^力 黃酒^四 引

(4) 鞍黃；

甲、病因：由於鞍子墊的不平，慢慢把脊骨壓陷下去二

三日後被壓的地方腫脹起來，就成此病。

乙、治法：趕快用米針（扎牲口用的針）像扁些的椎子，將

腫脹的地方挑破，再用掃帚蘸酸漿水或酒洗

用鋤把血水刮盡再歇時把鞍子對傷口發空起來過幾天就好了遲了難治。

(5) 篩子黃；

甲、病狀：首先駝腿生核不能走路慢慢發到肚子上看起來像篩子內藏黃水能傷性命。

乙、治法：用米針插在掃帚柄上露出針尖用力刺破核子流出烏血水為止再噴些酸醋在核子上。如上方無効可到中藥舖買消黃散一付加砒礞五小開水調灌。

(6) 慢慢黃；

甲、病狀：口中生白連水不很吃草沒有精神。

乙、治法：烏鴉血或用酸漿水攪大蒜灌。

(7) 拐黃；

甲、病狀：牲口的左腿拐節發起核子。

乙、治法：一米針穿破二用半生半熟的蕎麥糊着核子的周圍以免發大。

(8) 皮內黃；

甲、病狀：不吃草肚內咕咕作响，

乙、治法：大馬用一碗青油小馬減半和四個鴉蛋清灌服，

(9) 血黃；（又名黑寒風）

甲、病源：牲口馱的太累揭鞍子時候着了風一時牲口全身出水外滾不安

乙、治法：用剛燒下的草灰或熱鞋底子煨燙出水的地方如用此方仍出水不停很有可能轉為血黃應用烏鴉血灌，

(10) 預黃；

(三) 治鼻類；

甲、病狀；牲口胸前發熱遇到石頭橋子拼命磨擦，
乙、治法；將牲口胸前穿破之處按春三夏二秋一的指頭寬窄用鞋底子或青銅錢數枚在穿破處吊起來，

(丁) 大牲口生鼻；

四區金章玉德友方

甲、病狀；咽喉硬噎水草難咽氣喘鼻孔液膿，
乙、病源；草料不足喝水不當疲癆過甚，
丙、治法；百合八分川貝七分川軍七分姜仁五分甘草四分

蘿蔔水引

(己) 小駒生鼻；

四區金章郭金德

甲、病狀；鼻孔流膿
乙、病源；因受困咽喉骨腫而生

丙治法：玉金_{五小}黃芩_{五小}苦瓠_{五小}

蜜_{二小}鵝清_{二個引}

(四) 牛病類：

(一) 牛病治法：

1. 若要使好牛一月一碗油。

每年清明時及牛耕地季節每月灌耕牛一碗青油大牛十二兩小牛半斤有清瀉腸胃預防疾病保護健康的功效。

2. 治牛拉稀，脖子腫。

病狀：拉黃色稀糞有時帶膿血或是像鵝蛋清一樣東西有的連腫脖子不吃草病久即瘦弱而死。

治法：芒硝_{三小}鹽_{二小}辣子米_{五小}用溫水調和灌下

大半一次灌完小半一次灌一半，

如果拉血膿第二天可再灌百分之一的石灰水一斗和米湯一碗（石灰水製法一錢石灰加水十兩浸一夜用其上面的清水）

3、牛痘；

病狀：不能吃草瀉稀糞（黑色）發展嚴重時肚門哆開鼻尖乾燥有龜裂；

治法：用白面炒二斤澆酒半斤（**扣**與米汁拌勻服下）
4、不倒嚼；

治法：麻油二刀陳醋半斤鹽炒四刀葱三根用四兩小

表面化到一塊牛吃上就倒嚼

5、胃缺水；

病狀：拉血尿血

治法：用槐黃（可用桑黃代替）香油搗子清灌下，

輕的用麻種用磨推了去皮用水灌下，

人不倒沫；

病狀：內裡有火即不倒沫火消了就能倒沫，

治法：全箋仁一個絲瓜秧子一個山查片兩個灌下又

法：巨油四升烤好的蜂窩一個把蜂窩放在油裡炸好冷透

了灌下

7、牛尿血；

八區薄壁李保仁

甲、病狀：發現時頭低耳墜水草不進尿血

乙、病因：受暑熱勞動過度熱火傳於心經後入膀胱

丙、治法：當日赤芍黃連黃柏知母黃芩枝枝川草

木通滑石車前澤父甘草瞿麥紅花

為末開水沖服酌情另定。