


皮肤病理鉴别诊断

(II)

刘荣卿 编译



0204607

第三军医大学第一附属医院



皮肤病理鉴别诊断

(II)

第三军医大学第一附属医院教授

刘荣卿 编译



A0060671

本书根据 A. B. Ackerman 1988 年主编的
《Differential Diagnosis in Dermatopatho-
logy(I)》中的有关“鉴别诊断要点”编译而成。
计有 90 种疾病，分为 45 对进行鉴别。适于皮肤科
及病理医师参考应用。

020.607

一九九〇年六月

目 录

1. 点滴状银屑病**对比**脂溢性皮炎..... 1
2. 寻常银屑病**对比**毛发红糠疹..... 3
3. 掌跖银屑病**对比**掌跖出汗不良性皮炎..... 4
4. 多形红斑**对比**固定型药疹..... 6
5. 中毒性休克综合征**对比**多形红斑..... 7
6. 扁平苔藓**对比**苔藓样盘状红斑狼疮..... 8
7. 扁平苔藓**对比**苔藓样二期梅毒..... 9
8. 慢性单纯苔藓**对比**肥厚型扁平苔藓..... 11
9. 硬化萎缩性苔藓**对比**慢性放射性皮炎..... 13
10. 慢性荨麻疹**对比**类天疱疮, 风团期..... 15
11. 穿通性毛囊炎**对比**蛇行式穿通性弹力纤维增生症..... 16
12. 狼疮性脂膜炎**对比**硬皮病脂膜炎..... 18
13. 环状肉芽肿**对比**发疹性黄色瘤..... 20
14. 急性痘疮样苔藓样糠疹**对比**淋巴瘤样丘疹病..... 21
15. 丘疹性粘蛋白病**对比**环状肉芽肿, 间质型..... 23
16. 粘液性秃发的毛囊粘蛋白病**对比**蕈样肉芽肿的
 毛囊粘蛋白病..... 24
17. 类似蕈样肉芽肿的海绵水肿性皮炎**对比**有Pautrier
 脓肿的蕈样肉芽肿..... 25
18. 皮肤纤维瘤**对比**兰痣, 梭形细胞硬化型..... 27
19. 有奇异细胞的皮肤纤维瘤**对比**恶性纤维组织
 细胞瘤..... 29
20. 硬皮病**对比**硬肿病..... 30

21. 具鳞状窝的面部陈旧性疣（反转性毛囊角化症） 对比 具毛鞘分化的面部陈旧性疣（毛鞘瘤）	32
22. 假性上皮瘤性增生 对比 鳞状细胞癌	34
23. 疣状角化不良瘤 对比 具棘层松解细胞的 鳞状细胞癌	36
24. 陈旧性跖疣 对比 隧道癌	38
25. 假性Kaposi肉瘤（肢端血管皮炎） 对比 Kaposi 肉瘤，斑块期	40
26. 生殖器黑变病 对比 生殖器原位恶性黑色素瘤， 早期损害	41
27. 青年妇女生殖器黑色素细胞痣 对比 妇女生殖器 恶性黑色素瘤	42
28. 掌跖交界型黑色素细胞痣 对比 掌跖原位恶性 黑色素瘤	44
29. 持久性黑色素细胞痣 对比 持久性恶性黑色素瘤	46
30. 原发性恶性黑色素瘤 对比 亲表皮性转移性恶性 黑色素瘤	48
31. Spitz痣，混合型 对比 具黑色素细胞痣的恶性 黑色素瘤	50
32. 结缔组织增生性Spitz痣 对比 结缔组织增生性 恶性黑色素瘤	52
33. 具大细胞兰痣 对比 转移性恶性黑色素瘤	54
34. Sebaceoma（向皮脂腺分化的良性肿瘤） 对比 皮脂腺癌	55
35. 乳晕下乳头状瘤病 对比 乳腺癌	57
36. 恶性淋巴瘤，B细胞型 对比 Merkel细胞癌	58

37. 平滑肌瘤, 立毛肌型**对比**平滑肌肉瘤.....60
38. 血管球瘤, 孤立型**对比**汗腺瘤, 实体型.....62
39. 结缔组织增生性毛发上皮瘤**对比**硬斑瘤样基底
细胞癌.....64
40. Bowenoid丘疹病**对比**Bowen's 病.....66
41. 原位鳞癌, 肛门生殖器**对比**足叶草脂治疗后
(48—72小时) 尖锐湿疣.....68
42. 增生性毛囊肿**对比**鳞状细胞癌.....69
43. 非典型纤维黄色瘤 (恶纤维组) **对比**梭形和圆形
细胞鳞状细胞癌.....71
44. 蕈样肉芽肿 (斑块期) **对比**组织细胞增生症X
(斑块期)72
45. 血管内乳头状内皮细胞增生**对比**血管肉瘤.....74

R751.04

0247

1. 点滴状银屑病对比脂溢性皮炎

点滴状银屑病

1. 散在圆顶状角化不全区
顶部的嗜中性白细胞
2. 角化不全内少量血浆
(均匀红染物质)
3. 角化不全与附件结构无
关
4. 嗜中性白细胞出现在表
皮各层, 包括角质层
5. 角化不全下之表皮上部
细胞显苍白
6. 轻度海绵水肿不累及附
件
7. 表皮突轻度增生和呈棒
状, 等长而宽度不等,
有些乳头顶表皮变薄
8. 真皮乳头常显著水肿
9. 靠近表皮下缘乳头内血
管扩张、扭曲

脂 溢 性 皮 炎

1. 角化不全内遍布嗜中性
白细胞
2. 角化不全内显著的血浆
滴
3. 角化不全灶易出现在毛
孔唇部
4. 嗜中性白细胞仅见于角
质层
5. 表皮无苍白
6. 毛漏斗上皮及表皮内轻
度海绵水肿
7. 表皮突轻度增生但不呈
棒状, 长宽不等, 乳头
顶部表皮不变薄
8. 真皮乳头可轻度水肿
9. 浅层小静脉和毛细血管
显著扩张, 但不扭曲,
亦不靠近表皮, 淋巴管
亦显著扩张

10. 乳头顶及表皮内常见
红细胞外渗，有时每个
乳头均有此现象
11. 角栓少见
12. 一般无日光性弹力纤维
增生

10. 少数乳头部有红细胞外
渗
11. 角栓常见
12. 常有日光性弹力纤维增
生

2. 寻常银屑病对比毛发红糠疹

寻常银屑病

1. 一般有角化不全灶
2. 角化不全内有嗜中性白细胞
3. 角质层内常有血浆
4. 常见海绵水肿
5. 颗粒层减少
6. 表皮突显著银屑病样增生且长度相等
7. 表皮突瘦小
8. 表皮突基部常呈棒状
9. 乳头顶部分表皮变薄
10. 乳头部有多数红细胞外渗
11. 乳头部显著水肿
12. 乳头部混合性炎细胞浸润内含嗜中性白细胞
13. 常见表皮内淋巴细胞
14. 角化不全的角栓伴有嗜中性白细胞

毛发红糠疹

1. 角化不全（呈水平和垂直的）与紧密角化交替出现
2. 角化不全灶无嗜中性白细胞
3. 角质层无血浆
4. 常无海绵水肿
5. 颗粒层显著
6. 轻度到中度银屑病样增生且长度不等
7. 表皮突常不瘦小
8. 表皮突基部不呈棒状
9. 乳头顶部分表皮增厚
10. 乳头部可有少量红细胞外渗
11. 乳头部轻度或无水肿
12. 乳头部淋巴细胞浸润无嗜中性白细胞
13. 表皮内淋巴细胞少见
14. 角化过度的角栓及其周围角化不全区无嗜中性白细胞

3. 掌跖银屑病对比掌跖出汗不良性皮炎

掌跖脓疱性银屑病

1. 表皮突大致等长
2. 如有海绵水肿, 仅见于表皮下部
3. 无海绵水肿性小疱
4. 常见融合性角化不全
5. 角化不全灶中嗜中性白细胞, 常间断出现于整个角质层
6. 角层内无淋巴细胞
7. 颗粒层常缺失, 除少数区外
8. 常见海绵状脓疱, 有时见于表皮各层
9. 乳头上部表皮变薄
10. 表皮突细小, 基部呈棒状, 且常交织
11. 真皮乳头变窄
12. 基层上有核分裂相

掌跖出汗不良性皮炎

1. 表皮突常不等长
2. 海绵水肿见于表皮各层
3. 常有海绵水肿性小疱
4. 少有融合性角化不全
5. 角化不全中常无嗜中性白细胞 (搔抓感染者除外)
6. 角质层常有淋巴细胞, 尤以伴有血浆时
7. 颗粒层常存在, 除少数区外
8. 无脓疱, 抓伤感染者除外
9. 乳头上部表皮不变薄
10. 表皮突不变细, 有时增厚, 基部不呈棒状且不交织
11. 真皮乳头不变窄
12. 基层上无核分裂相

13. 靠近表皮下血管扩张和
扭曲

14. 炎细胞浸润稀少

15. 有时众多红细胞外渗

16. 常有嗜中性白细胞

13. 血管扩张, 但无明显扭
曲

14. 中等量炎细胞浸润

15. 少量红细胞外渗

16. 常无嗜中性白细胞

4. 多形红斑对比固定型药疹

多形红斑

1. 由于严重空泡变性常有表皮下水疱形成，有时由于海绵水肿及气球状变性而有表皮内水疱
2. 表皮融合性坏死时有表皮内嗜中性白细胞，常无嗜酸性白细胞
3. 炎细胞浸润常稀少
4. 浅层血管周围浸润，深层少见，间质无浸润
5. 主要为淋巴细胞浸润
6. 急性期损害乳头浅层有噬黑色素细胞，有时无噬黑色素细胞
7. 乳头部轻度水肿，有时不见水肿

固定型药疹

1. 由于海绵水肿及气球状变性常有表皮内水疱，有时由于乳头水肿或空泡变性而有表皮下水疱
2. 早期损害仅有少量散在坏死角朊细胞时，表皮内有嗜中性及嗜酸性白细胞
3. 炎细胞浸润常较多
4. 浅层及深层血管周围浸润。少有仅浅层者，间质常有浸润
5. 浸润由淋巴细胞、嗜酸性、嗜中性白细胞，肥大细胞和噬黑色素细胞
6. 以往损害乳头深层常有大量噬黑色素细胞，有时浅丛血管周围有噬黑色素细胞
7. 乳头部轻度至中度水肿

5. 中毒性休克综合征对比多形红斑

中毒性休克综合征

1. 鳞屑一痂含嗜中性白细胞
2. 有时银屑样增生
3. 浅层血管周围及间质有淋巴细胞，嗜中性及嗜酸性白细胞的混合性细胞浸润
4. 真—表皮交界无明显变化
5. 表皮内有嗜中性及嗜酸性白细胞，嗜中性白细胞可形成脓肿
6. 真皮乳头浸润中有时有核尘

多 形 红 斑

1. 鳞屑一痂不含嗜中性白细胞
2. 无银屑样增生
3. 浅层血管周围淋巴细胞浸润，无嗜中性白细胞，少有嗜酸性白细胞
4. 淋巴细胞浸润及空泡变性致真—表皮交界不清
5. 进展期损害表皮内无嗜中性或嗜酸性白细胞，嗜中性白细胞仅见于表皮严重坏死时
6. 无核尘

6. 扁平苔藓对比苔藓样盘状红斑狼疮

扁 平 苔 藓

1. 浅层淋巴细胞浸润
2. 基底膜正常厚度
3. 真皮粘蛋白不增加
4. 表皮不变薄
5. 楔形颗粒层增生
6. 陈旧损害乳头部粗大胶原杂乱排列
7. 真皮上部血管轻度扩张

苔藓样盘状红斑狼疮

1. 浅层和深层淋巴细胞浸润
2. 基底膜增厚
3. 真皮网状层常有大量粘蛋白
4. 表皮灶性变薄
5. 无楔形颗粒层增生
6. 陈旧损害真皮上部胶原硬化
7. 真皮上部众多毛细血管扩张

7. 扁平苔藓对比苔藓样二期梅毒

扁 平 苔 藓

1. 表皮增生常呈锯齿状
2. 无角化不全
3. 常有显著楔形颗粒层增生
4. 表皮或真皮无嗜中性白细胞
5. 炎性浸润以淋巴细胞为主
6. 炎性浸润中无多核组织巨细胞
7. 真—表皮交界常有裂隙
8. 无浆细胞
9. 真皮乳头有粗大胶原
10. 常有坏死角朊细胞（胶样体和Civatte小体）
11. 仅有浅层血管周围浸润

苔藓样二期梅毒

1. 表皮增生常呈银屑病样，少有锯齿状
2. 常有角化不全，有时角化不全区有嗜中性白细胞
3. 常无明显楔形颗粒层增生
4. 有时表皮和真皮有嗜中性白细胞
5. 炎性浸润以组织细胞有时以浆细胞成主
6. 陈旧损害炎性浸润中有多核组织巨细胞
7. 真—表皮交界常无裂隙
8. 常有浆细胞
9. 真皮乳头无粗大胶原
10. 常无坏死角朊细胞
11. 浅层和深层血管周围浸润

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 12. 血管扩张管壁轻度增厚,
无明显内皮细胞肿胀 | 12. 血管扩张, 管壁增厚,
内皮细胞肿胀 |
| 13. 有时附加慢性单纯苔藓
病变 | 13. 无慢性单纯苔藓病变 |

8. 慢性单纯苔藓，角化过度型对比

肥厚型扁平苔藓

慢性单纯苔藓， 角化过度型

1. 致密角化常伴显著角化不全
2. 糜烂，出血性鳞屑一痂，表皮上部融合性坏死（即搔抓现象）
3. 表皮突长宽不等，基部呈圆形
4. 颗粒层在角化过度区增生，角化不全区消失
5. 中等量血管周围浸润，少有苔藓样，真一表皮界面清楚
6. 毛漏斗周围炎性浸润不显著
7. 炎性浸润均匀分布在真皮乳头上部及表皮突基部

肥厚型扁平苔藓

1. 致密角化可伴灶性角化不全
2. 无溃疡或结痂
3. 表皮突呈锯齿状，基部呈圆形，有时有假癌性增生
4. 颗粒层呈灶性楔形增生，尤以毛漏斗部有显著颗粒层增生
5. 密集、灶性带形浸润致部分表皮突基部真一表皮交界模糊
6. 毛漏斗周围炎性浸润显著
7. 通常在真皮乳头顶无炎性细胞浸润

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 8. 无裂隙 | 8. 通常真皮乳头炎性浸润区和表皮间有裂隙 |
| 9. 无空泡变性 | 9. 常有灶性空泡变性 |
| 10. 无坏死角朊细胞 | 10. 表皮突基部有坏死角朊细胞 |
| 11. 核分裂相不增多 | 11. 核分裂相增多 |
| 12. 真皮上部血管中度扩张, 无管壁增厚 | 12. 真皮上部血管扩张, 有时扭曲伴管壁增厚 |
| 13. 病损边缘无典型扁平苔藓证据, 有时有海绵水肿性皮炎表现 | 13. 有时病损边缘出现典型扁平苔藓变化 |