


现(代)家(庭)博(览)书(屋)

最新时尚休闲娱乐生活必备守则

四季钓鱼技巧

一点通

- ◎实用、完美、生动、温馨给你更多关爱
- ◎知识广博，内容点点滴滴，关怀实实在在



超大容量
全年适用

蒋红明◎主编



北京日报报业集团
同心出版社


现 代 家 庭 博 览 书 屋

最新时尚休闲娱乐生活必备守则

四季钓鱼技巧


一点通

- ◎实用、完美、生动、温馨给你更多关爱
- ◎知识广博，内容点点滴滴，关怀实实在在



超大容量
全年适用

蒋红明◎主编



北京日报报业集团
◎同心出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

四季钓鱼技巧一点通 / 蒋红明主编. —北京: 同心出版社, 2013. 3

ISBN 978-7-5477-0854-5

I. ①四… II. ①蒋… III. ①钓鱼 (文娱活动) —基本知识 IV. ①G897

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 048031 号

四季钓鱼技巧一点通

出版发行: 同心出版社

地 址: 北京市东城区东单三条 8-16 号东方广场东配楼四层

邮 编: 100005

电 话: 发行部: (010) 65259206-8022

总编室: (010) 65252135-8043

网 址: <http://www.beijingtongxin.com/>

印 刷: 北京盛兰兄弟印刷装订有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2013 年 4 月第 1 版

2013 年 4 月第 1 次印刷

开 本: 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张: 18

字 数: 313 千字

定 价: 36.00 元

同心版图书, 版权所有, 侵权必究, 未经许可, 不得转载

前 言

如今喜爱垂钓的人越来越多，为了使钓鱼爱好者学习钓鱼，更应该学习科学的新型钓鱼方法。要想掌握钓鱼要领、熟练钓鱼技术非容易之事，为了让垂钓者较快地掌握更多的钓技，本书以图文并茂的形式，尽量做到简练通俗、深入浅出，力图让初学者看得懂、学得快，尽早感受到钓鱼的乐趣。本书内容主要介绍钓鱼的基本常识与入门、钓具的准备和选择、钓具的组合与使用、天气与钓时的选择、垂钓技巧、垂钓技能的提高并详细的介绍了溪间垂钓、浅滩垂钓、江河垂钓等。并详细的解析了各种鱼的钓法及鱼具的使用。

希望此书能更贴近垂钓者的需求，为您的垂钓提供更多的帮助。让我们一起走进山清水秀的大自然，让垂钓带给喜爱垂钓的爱好者更多的惊喜和欢乐。

目 录

第一章 钓鱼常识与入门

钓鱼常识与入门	1
一、鱼的食性与垂钓	1
二、鱼类的生活环境与钓鱼的关系	5
三、鱼的栖息和活动习性与钓鱼的关系	12
钓具的准备和选择	15
一、主要钓具	15
二、辅助器具	37
钓具的组合与使用	46
一、钓具的拴结方法	46
二、钓线与手竿的连接	48
三、钓线与浮漂的连接	49
四、鱼钩与钓线的连接	51
五、钓线与铅坠的连接	54
六、铅坠与脑线的连接	56
七、漂、坠、钩的匹配	56
八、线、钩、坠子的组合	57
钓鱼时天气的选择	57
一、适宜钓鱼的天气	57
二、一天中理想的钓鱼时机	58
三、四季垂钓	60
四、刮风天垂钓	62
五、闷热天垂钓	64
六、雨天钓鱼	64
七、晴天钓鱼	65



垂钓技巧	65
一、垂钓的选位选点	65
二、几种常见鱼的垂钓方法	82
垂钓技能的提高	114
一、如何对付小杂鱼的打搅	114
二、有鱼就是不咬钩	115
三、提竿时机未能因鱼而异导致跑鱼	116
四、操作方法不当导致的跑鱼	116
五、鱼上钩后连连脱钩	117
六、鱼钩挂底如何处理	118
七、鱼类警惕性的应对措施	119
八、水下有暗草，底层鱼如何钓	119
九、手竿打不准钓点	120
十、怎样防止和解决鱼竿卡节	120
十一、底钩甩不远	121

第二章 钓技与钓法透析

基本技巧	123
一、寻找“鱼道”	123
二、识别鱼星	123
三、判断鱼情	124
四、准确掌握手竿提竿时机	126
五、插竿方式	129
六、正确遛鱼	129
七、应对鱼不咬钩的方法	131
八、鱼脱钩的原因及措施	132
九、排除垂钓中的干扰	134
在不同水域中的垂钓技巧	135
一、肥水钓鱼	135
二、溪河汛期垂钓	136
三、自然水域垂钓	137
四、在流水和大浪中垂钓	138



五、溪流钓	139
常用的钓技钓法	141
一、星漂钓	141
二、浮钓	141
三、空钩钓	142
四、延绳钓	142
五、甩钩钓	143
六、包钩钓	143
七、戳拱钓	144
八、戳荏钓	145
九、逗钓	145
十、手竿定点钓	146
十一、手竿追星钓	146
十二、手竿铺地拖底钓	146
十三、船钓	146
十四、游钓	147
十五、放钓	148
十六、轻矶钓	148
十七、重矶钓	150
常见的垂钓技法	151
一、鲫鱼的垂钓	151
二、鲤鱼的垂钓	173
三、鲢鱼的垂钓	180
四、鳙鱼的垂钓	184
五、青鱼的垂钓	188
六、草鱼的垂钓	190
七、罗非鱼的垂钓	194
八、翘嘴红鲌的垂钓	198
九、鲇鱼的垂钓	201
十、胡子鲇的垂钓	203
十一、鳊鱼的垂钓	205
十二、团头鲂的垂钓	207
十三、甲鱼的垂钓	208



十四、哲罗鱼的垂钓	210
十五、乌鳢的垂钓	211
十六、鳢鱼的垂钓	215
十七、白鲢的垂钓	218
十八、鳊鱼的垂钓	221
十九、鲈鱼的垂钓	225
二十、鳗鱼的垂钓	228
二十一、淡水白鲳的垂钓	229
二十二、虾的垂钓	230
二十三、黄鳝的垂钓	232
二十四、马口鱼的垂钓	234
二十五、赤眼鲮的垂钓	235
二十六、桂华鲮的垂钓	236
二十七、“东坡鱼”的垂钓	237
二十八、竹荚鱼的垂钓	237
二十九、黄花鱼的垂钓	238
三十、尖吻黄盖鲮的垂钓	240
三十一、带鱼的垂钓	241
三十二、乌贼的垂钓	244
三十三、黄姑鱼的垂钓	245
三十四、河鲀的垂钓	248
三十五、石斑鱼的垂钓	249
三十六、黑鲷的垂钓	252
三十七、黄鳍鲷的垂钓	252
三十八、雀鲷的垂钓	253
三十九、青鲷的垂钓	254
四十、中华乌塘鳢的垂钓	256
四十一、六线鱼的垂钓	257
四十二、比目鱼的垂钓	258
四十三、黑鲟鱼的垂钓	258



第三章 钓鱼的多种技法

香鱼钓法	262
一、香鱼的饵钓	262
二、毛钩钓香鱼	262
三、浅滩毛钩钓香鱼	263
四、潭内钓香鱼	263
五、香鱼的围子钓 (1)	264
六、香鱼的围子钓 (2)	265
七、香鱼的无饵钩滚钓	265
八、香鱼的刺钓法	266
哲罗鱼钓法	266
嘉鱼钓法	267
鱖鱼钓法	267
杜父鱼钓法	268
鲤鱼钓法	269
一、摇轮手竿钓鲤方法	270
二、立漂钓鲤	270
草鱼钓法	271
鲢鱼钓法	271
一、鲢鱼钓具的拴接	272
二、饵料的装设	273
三、看漂钓鲢鱼	273
四、鲢鱼的手感钓法	274
鳊鱼钓法	274
虹鳟鱼钓法	275
一、虹鳟的鱼竿与钩具	275
二、虹鳟的钓饵	276
三、渔笼、冷藏箱、抄网	276
四、虹鳟的钓法	277
五、残存虹鳟的钓法	277
六、残存虹鳟的诱钓方法	277



第一章 钓鱼常识与入门

钓鱼常识与入门

一、鱼的食性与垂钓

1. 鱼的食性及可塑性

鱼类是食性广但摄食量不大的低等变温动物。淡水鱼类一般肠道细短。有的甚至无胃（鲤鱼、鲢鱼等），新陈代谢速度较快。因此，鱼的一个摄食特点就是少吃勤食、嗜吃含高蛋白的优质食物。另外鱼的消化功能同水温关系极大，温度适宜就特别能摄食，温度不适宜则不爱吃食。各种淡水鱼类，由于长期在不同的生活环境中形成了各不相同的习性和生理机能，因而养成了各不相同的摄食本领。大致可分为以下几种：

（1）草食性。又叫素食性鱼类，以草鱼、鳊鱼、鲂鱼为代表，以摄食植物为主，如水草、丝状藻类、黑藻、浮萍、狗尾草、狼尾草、苦草、马来眼子菜、菹草、稗草，以及嫩荷叶、茭白芽、菱叶、芦苇等水生植物和陆生植物，还有麦叶、野茼蒿、蒲公英、菜茎叶、块根、块茎以及豆科植物和各类种子等。

钓这类鱼多选用嫩菜叶、嫩芦苇叶、瓜瓢果肉，以及嫩玉米粒、麦粒、薯块、柳叶、西红柿、桃李等水果，或者农产品加工的下脚料，如豆饼、花生饼、麦粉、麦麸、玉米面、大米饭团、熟薯和酒糟等为钓饵。

（2）肉食性。又称之为荤食鱼类。这类鱼多以水体中的其他鱼类和软体动物为食料，如鱼、虾、蚌、螺、蚬、青蛙等以及陆生昆虫或落水的禽、鸟、小动物和无脊椎软体虫及蚯蚓等，大型动物的碎屑、内脏等也都爱摄食。这类淡水鱼有鳙鱼、狗鱼、哲罗鱼、黑龙江鳊鱼、乌鳢、鳊鱼、鲇鱼、马鲛鱼等。这类鱼比较凶猛、力大，善于快速游弋，捕食时动作迅速，常追捕其他鲜活的小型鱼类而食。

垂钓肉食性鱼类应选用鲜活的软体动物或小鱼、虾为钓饵，用模拟饵，也可将其诱惑上钩。



(3) 浮游生物食性。浮游生物食性鱼类也称为滤食性鱼类。中上层鱼类和许多小杂鱼,以及很多鱼类的幼鱼,大多以摄食浮游生物为主,鲢鱼、鳙鱼和鲮鱼即属此类。浮游生物包括浮游植物和浮游动物。浮游动物主要是有枝角类、桡足类等原生动物,轮虫和小型甲壳动物以及无节动物的幼体。浮游生物还包括许多浮游植物,主要是水生植物中的藻类,如绿藻、黄藻、平藻、硅藻、裸藻、黑藻等。

掌握了这类鱼的滤食性特征,把熟面团经过充分发酵后,做成酸臭的钓饵垂钓可获丰收。

(4) 杂食性。杂食性鱼的食物范围很广,对动物性食物和植物性食物都能摄食,如甲壳类小动物、无脊椎软体动物、昆虫的幼虫、小鱼虾、藻类、蠕虫、贝类、米饭屑、面包屑、豆类食物的碎屑、植物的残屑等。

(5) 杂屑物食性。这类鱼对某些食物的杂屑和残渣有特殊的喜好,它们被称为杂屑物食性鱼类,如鲮鱼、梭鱼、遮目鱼、鲮鱼等。

(6) 底栖生物食性。这类鱼以淡水底栖动物,如螺、蚬、沙蚕、幼蚌、虾蟹及底栖昆虫的幼虫和水中的环节动物等为食。其代表是青鱼、鳊鱼和鳙鱼等,青鱼实际上也是肉食性鱼类的一种。因此可用底栖生物螺、蚬、幼蚌、小虾等为饵钓青鱼。

(7) 人工饵料食性。所谓人工饵料,是指经过人为加工的天然食物,如豆饼、豆渣、米糠、酒糟、麸皮、饭粒、蚕蛹、酱糟、各种面食和经过蒸煮的薯类食物等。人工饵料,除了黑鱼、鲑鱼之外,各类鱼都比较爱吃。

(8) 食性的可塑性。不同食性的鱼类以什么为食不是一成不变的,受它们的生态内在因素和自然环境因素(如地域、季节、饵料条件)的影响,其食性有一定的可塑性。通常钓者所说的“什么地方的鱼,爱吃什么地方的食”就是这个道理。例如在南方常用大米饭粒钓鱼,在北方多用面团钓鱼。此外,鱼在不同的生长发育阶段,其食性也有明显的差异。一般幼鱼在其摄食器官尚未发育完全时,都经过吃浮游生物(包括浮游动物和浮游植物)的阶段。草鱼虽然以草类植物为主要摄食对象,但秋后它也喜欢吃蚂蚱、油葫芦等昆虫。鱼对饵料的选择性较强,有择优去劣之倾向。如在春季钓鲤鱼用的蚯蚓有粗有细、有红有黑,实践证明用粗细适中的红蚯蚓上钩率就较高。

2. 鱼的摄食方式

钓鱼爱好者都有这样的体会,就是鱼吃食的时间是呈周期性的。一咬钩就可连续钓一阵子,一旦不吃食,你的钓饵再好鱼也不上钩。当然影响鱼类摄食的因



素有很多，如季节、天气、水温、水质、水体溶氧量以及空间的声响等，但鱼觅食和恢复体力主要还是随其生理性周期变化而变化的。所以，垂钓时应注意掌握鱼类的这一规律，即钓鱼要选择时间，同时也不要因为短小时内鱼不咬钩，就认为没有鱼。

鱼类在水体中游弋和觅食时，要消耗大量的营养物质和能量，其身体的生长发育也要消耗一部分营养物质和能量，没有足够的营养物质和能量，鱼就不能生存。因此，鱼游弋和觅食所消耗的营养物质和能量必须少于其所获取的营养物质和能量。由于鱼的品种不同，其摄食的方式也各异，主要有以下四种摄食方式。

捕食方式：以这种方式摄取食物的鱼，多为凶猛的肉食性鱼类。游弋能力强而且游动迅速，它们以捕食水中生活的动物（鱼类、虾类、螺蛳、小蟹类）。这类鱼有鲨鱼、狗鱼、哲罗鱼、鳡鱼、带鱼、鳊鱼、马鲛鱼、鲑鱼、乌鳢等。根据这种摄食方式，人们施钓时，总是用鲜活的小鱼或其他小动物作为钓饵。

吞食方式：采取吞食方式摄食的鱼，多属温和的杂食性鱼类，这类鱼大部分在水体的中下层和底部活动、摄食。如鲫鱼、鲤鱼、草鱼、鲂鱼和青鱼等就属于这类鱼。钓鱼爱好者想要钓这类杂食性的鱼，最好把钓线上的坠子定得与鱼钩稍有点距离，不要让装了饵的带铅坠的鱼钩沉入水中太深，否则，就不容易引诱这类杂食性的鱼儿上钩。

滤食方式：采用滤食方式摄食的鱼类，均为水体的中上层鱼类，即滤食性鱼类。它们在摄食时是张开大嘴，让浮游生物和水一并进入口中，然后把水从鳃孔排出，再把水中的浮游生物经过密集的鳃耙滤取出来作为食物吞下。这类鱼都比较温驯，如鳙鱼、鲢鱼等。在垂钓鲢、鳙时，多采用飞钩浮钓法，当它们吞食溶解后浮于飞钩附近的饵料时，常常误将飞钩与浮游饵料和水一起吸入口中。所以有经验的钓手制作的钓鲢、鳙的饵料，软硬适度、干湿合宜，钓饵入水后，慢慢溶解，浮于组钩周围。

诱食方式：属于这种摄食方式的鱼类，通常是采用引逗的方法将欲捕获的对象诱至身边，吞而食之。例如海水鱼类中有些底层鱼不善游动，常常潜卧海底，伸出它吻部丝状的鳍棘，摇动鳍棘尖端穗状的皮质，待周围的小鱼误将穗状皮质当做食物前来索食之际，再行捕获吞食。

3. 针对食性及觅食特点规律的施钓方略

知道了鱼的食性及觅食特点规律，选配饵料就要采取不同方略了。

（1）因时制宜。鱼类摄食有明显的季节性。草鱼摄食的季节性尤为突出，在早春时节，冰河刚解冻，此时蛰伏了一冬的草鱼会“饥不择食”，急需补充高蛋



白，水底的红虫和泥里的蚯蚓，便成了它爱吃的饵料。所以，早春宜用红虫、蚯蚓做饵钓草鱼。到了初夏，水生植物刚吐出嫩芽，草鱼有了对口味的饵料，若再用蚯蚓、红虫去钓它，绝不上钩。这时，钓草鱼最好的钓饵是陆草的嫩芽、水草的嫩叶和芦苇心。到了盛夏，自然环境中各种植物都长老了，纤维硬化，草鱼也不爱吃了，这时用粮食加工制成的带微酸味的饵去钓它，可收奇效。到了初秋，自然环境中各种草虫活跃，在周围有农田的水域，落水的草虫成了草鱼捕食的天然饵食。此时用蚂蚱、油葫芦、蜻蜓做钓饵钓草鱼，效果最佳。其他鱼类也有类似情况。例如鲫鱼和鲤鱼，虽然食性很广，不挑食，但不同季节也有不同需求。早春和严冬凿冰垂钓，鲫鱼和鲤鱼非红虫不吃；初夏和晚秋，它们特别喜欢吃蛆、蚓、地蚕；盛夏，它们主要吃粮食类的鱼饵，如糟食和面食。所以，人们根据多年实践经验，对钓鲫鱼和鲤鱼，概括了两句渔谚“春虫夏面秋蚯蚓，冬钓唯独用红虫”。

(2) 因地制宜。水域环境有什么天然饵料，对鱼的喜食性有决定性的影响。这就叫“什么地方的鱼，爱吃什么地方的食”。譬如，北方人的主食是馒头，北方鱼也爱吃面食；南方人主食是大米，南方鱼也爱吃米饭粒、年糕粒。四川多产红苕（白薯），重庆、成都一带用红苕为饵能收奇效；藏族同胞爱吃酥油糌粑，在藏族地区钓鱼，酥油糌粑是最佳的钓饵；海南岛产木薯，在海南岛钓鱼，木薯是上等饵料。鱼类因地区不同，往往对饵料有所偏爱。例如云南滇池的高背鲫，四川天然湖泊的野鲫，爱吃米饭粒、蚕豆粉饵；广东、广西的须鲫，喜吃水生昆虫和各种昆虫的幼虫；东北的银鲫和松花湖的野鲫，却喜食红蚯蚓和面食。

(3) 因鱼制宜。按照鱼的食性配饵，这是多数钓者都懂得的道理。但是同一种鱼，食性一样，在甲地用这种饵上钩率很高，而换了一个地方，一条鱼也钓不到。这一点，在钓鲢鱼和鳙鱼的配饵方面尤为突出。从食性来说，鲢鳙鱼是以浮游生物为主要食物。但是养殖它们的鱼塘水质肥瘦不同，使它们的口味也不一样。以养殖鲢鱼、鳙鱼为主的鱼塘，若是肥水养鱼，则施放大量粪肥，肥料充足，浮游生物生长繁茂，成了鲢鱼、鳙鱼的天然饵料。这种池塘水有一股腥臭味，用普通的酸味钓鲢鱼饵是钓不到的。必须增强饵酸臭味的浓度，才能奏效。可是，换一个地方，那里投放的饵料不是以粪肥为主，而是投以粮食类饵料喂鱼，水不肥，没有很浓的腥臭味。如果仍用酸臭味很浓的饵去钓鲢鱼、鳙鱼，即使把饵投放在鱼嘴边，它也不上钩。



二、鱼类的生活环境与钓鱼的关系

温度和钓鱼的关系

1. 温度与钓鱼

钓鱼谚语：“春钓滩、夏钓潭、秋钓阴、冬钓阳。”就是指各个季节适宜钓鱼的温度条件。“春钓滩”，是说在春天晴天有太阳的日子里，尤其是在正午，水域中浅滩部位的水温适中，在这个地方很容易钓到鱼。例如在江淮流域，人们常说：“惊蛰鱼开口。”就是说到三月份，也就是农历正月底，鱼儿就开口吃食了。仲春的温度在20℃左右，正是鱼儿食欲旺盛、生理机能旺盛的时候，鱼儿要产卵，要繁殖幼鱼，常常是“饥不择食”。所以这时是江淮流域钓鱼的最好季节；“夏钓潭”，是指夏季特别是闷热的天气，无风、水无波浪，水中氧气不足，鱼儿缺氧，自然活动量减少。这时，它们多栖息于深水区、阴凉水域不动，因为水深处比较凉爽，在这样的水域下钓鱼较有收获；“秋钓阴”，是指秋季的阴天，温度最为适中，宜于垂钓；“冬钓阳”，冬天气温低于0℃以后，鱼儿在深水区的水底或钻入泥中栖息，准备过冬，很少游动。只有天气晴朗、气温回升较高时，鱼儿才到水温相对较高的浅水区“晒太阳”觅食，造成垂钓的时机。

另一方面，在自然水域，因水深且域广，故水温的分布是不均的、变化的和分层的。钓鱼人悟出了“鱼也分层”的环境背景，不但掌握了“底钓鲫鱼”的方法，还创造出了“离底钓鲫”、“半水钓鲫”和“浮钓鲫”的招术。

2. 气温与水温的关系

钓者怎样才能知道水温是多少呢？一般来讲，知道了气温，也就知道了水温，这两者之间是互相联系、互为影响的。气温升高，水温也随之升高；气温降低，水温也随之降低。以一日计，早晨6时，气温10℃，则表层水温约12~15℃；中午12时，气温20℃，则表层水温约15~18℃；下午2时，气温24℃，则表层水温约18~22℃；下午6时，气温16℃，则表层水温约18~20℃；子夜零时，气温下降到8℃，则表层水温约12~18℃。总之，水温的升降要略滞后于气温变化。

因水传递冷热的速度比空气要慢，水表和水底存在着水温差，水越深，温差越大。夏日，最好在上下温差小的水域垂钓。如表层水20℃，底层水10℃，鱼儿皆上浮，底层就钓不到鱼，只得浮钓或悬钓；如表层水18℃，底层水35℃，水底缺氧，鱼儿便浮头，甚至不食，底层钓不到鱼，而浮钓也很难钓到。冬日与夏日相反，最好在水温上下差别较大的水域垂钓。如上层水结冰，仅0℃，底层水仅2~4℃，鱼儿不食，逃往深而暖的水区，在这样的底水中就钓不到鱼；如表层水结



冰，为 0°C ，底层水 $10\sim 15^{\circ}\text{C}$ ，则鲫鱼、鲤鱼、鳊鱼、草鱼、青鱼、鲮鱼等皆食饵，就可以钓取；如再遇上鱼窝，则上钩率不会比春、秋季差。这就是许多北方钓者为什么喜欢冰钓，并能取得很好的垂钓效果的重要原因之一。

气候和钓鱼的关系

1. 晴天钓鱼

当气温、水温为 $10\sim 25^{\circ}\text{C}$ 时，鱼儿食欲旺盛，生长快。夏秋时连续晴天，气温、水温在 25°C 以上，甚至超过 30°C ，在烈日暴晒下，水中反而缺氧，鱼避入深水中低于 25°C 处。冬日晴天，无风或一二级风，气温、水温在 10°C 以下、 4°C 以上时，鲫鱼、鲤鱼，甚至鳊鱼、草鱼仍贪吃；如风力为三四级时，鱼吃钩率则大大降低。如气温在 0°C 以下，底层水温在 10°C 左右，无风或一二级风，在中午及下午四时半时冰钓最佳；如晴天，风力大于四级，气温在 0°C 以下，冰下水底温度虽在 10°C 左右，但鱼吃钩率却差。夏日、秋日时，如吹西南风加晴天，则闷热难当，白天是很难钓到鱼的。

2. 雨天钓鱼

雨天钓鱼比晴天复杂。在春季、夏季、秋季，雨天比晴天的气温要低，而且是由热到凉的降温。下雨时，空气新鲜，水中的溶氧量增加，鱼儿就格外活跃，食欲大增。钓鱼人常常有这样的体验：有些塘口，平时很少钓到鱼，尤其是多年未干涸过的塘口，若是在下雨天来这里垂钓，往往会有意想不到的收获。下雨过程一般可分为间歇性雨、连续性雨和阵性雨三类；按雨量大小又可分为小雨、中雨、大雨、暴雨和雷雨五种，局部地区还得加上梅雨和雨季两种特殊情况。就下雨过程来说，在下间歇性雨的间歇时间内，鱼吃钩率高。阵雨前因气压低，鱼浮头不食，不可垂钓；阵雨之后大量新水带着氧气和食物进入水中，使鱼活跃，食欲增强，是垂钓的好时机。在刚下连续性雨时，鱼吃钩率低，须待几个小时以后，水里新水增多，使鱼活跃，皆趋近水边觅食，此时在雨中垂钓效果很好；当阵雨过后，钓鱼效果也不错。

就雨量大小而言，小雨指1小时内雨量少于2.5毫米，或24小时内雨量在10毫米以下。下小雨后期，鱼儿食欲增强，一些大鱼也靠近水边抢食，此时穿着雨衣垂钓，效果很好。中雨指1小时内的雨量在2.5~8毫米，或24小时内雨量在10.1~25毫米，此时垂钓效果好；雨后突晴，则垂钓效果更佳。大雨指1小时的雨量在8.1~16毫米，24小时内的雨量在25.1~50毫米，除鲢鱼、黄颡等野鱼外，一般鱼类不肯进食，垂钓者也看不清浮标，难以掌握提竿时机，且雨大导致身上的雨具多，不灵活，故不宜垂钓；但雨后如水色不太混浊、水流速度不太



快，则可垂钓。暴雨指1小时内雨量超过10毫米，24小时内雨量在50毫米以上，一般雨中不可垂钓。雷雨也称雷阵雨，此时易遭雷击，禁止垂钓；但雷雨一过，天晴气压高，水中溶氧丰富，鱼类食欲旺盛，倒是垂钓的好时机。雨季指低纬度热带地区在一年中降雨比较集中的时期，在此期间，水温适宜鱼类生长，当雨停歇以及雨较小时，皆为垂钓的好时机。

溶氧和钓鱼的关系

在夏天天气闷热或气压较低时，在一些小型水体中的鱼类会把头露出水面来呼吸，鱼类专家称为“浮头”，如果情况继续恶化时，会发生鱼类大面积死亡，称之为“泛塘”。发生这些情况的主要原因是水体里的溶氧量不够，鱼必须被动地吸呼空气中的溶氧以维持生命，这时鱼是没有摄食欲望的，这就叫“鱼浮头，不咬钩”。首先受害的是鲢鱼、鳙鱼，它们耐缺氧的能力最差，只要天气稍为闷热，它们就不爱摄食。这时鲤鱼、鲫鱼也都会浮在水面上，它们比鲢鱼、鳙鱼耐缺氧能力更强一些，但只要天气闷热，虽不马上浮在水面，却不会咬钩吃食。鲇鱼、黑鱼耐缺氧的能力更强一些，别的鱼不咬钩时，唯独它们照样咬钩进食。

钓鱼的人如遇上这样的天气，或见到鱼儿浮头，就是再好的鱼食，它们也不会领情。怎么办？一是收竿不钓；二是耐心地等闷热消除后再钓。

但是，水域中的溶氧量不都是均匀一致的，局部水域的自然条件不同，溶氧量的多少也有差异。例如：在池塘的进水口附近的流动水的周围就好些；在一堆腐败植物旁边下钩，可能就不如在池塘中茂盛的水生植物的水旁边垂钓效果好；天气闷热、气压较低的无风天气，就不如有风天气好，尽管水面波动，垂钓效果仍较好；久雨初晴、雷雨之后和大风之后的天气均宜垂钓。

判别溶解氧的含量

判断水中溶解氧含量的高低需“二看”：一看鱼情。前面讲到水中缺氧，鱼就浮头，这样的水域不宜垂钓。如果没有鱼浮头，但有鱼特别是鲫鱼在半水或草下悬浮不动，那也表明水中含氧量不足，亦应果断转移。不同种类、不同大小的鱼对缺氧的忍耐力也不相同。鲫鱼的忍耐力最强。在溶解氧极其稀少的情况下仍能坚持较长时间。其他鱼种的耐氧力依次为鲤鱼、青鱼、草鱼，鳊鱼的耐氧力最差，水中含氧稍微下降，它逃得最快。不论哪种鱼，鱼体越大，耐氧力也越大、浮头最晚，但当缺氧达到一定限度——低于1毫克/升时，鱼越大，死得越快。二看水情。与空气接触的水的面积越大，溶解量也越多，如果风吹水面，波浪连绵，不但接触面增加，而且波卷浪翻，把空气搅拌于水中，溶解氧会成倍增加。如果水面被水草大面积覆盖，水与空气的接触面积小，这种水域的溶解氧含量就



微乎其微。氧气溶解于水与水温也有关系，水温越高越难溶解。遇到气压很低、无风或风很小的闷热天气，阳光直射水面，热量不易散发，水面温度上升很快，不但造成蒸发，使上层水域中的氧分子逸出，而且沉积水底的腐殖质受热迅速分解，在分解过程中一方面消耗了中、下层水体中的溶解氧，另一方面产生了沼气等有毒气体，水面便冒出一串串水泡。

就时间而论，早晨和晚上水中的溶解氧含量比中午高，但在养鱼池，早上水中的溶解氧含量比中午低，下午3时左右为最高；就水面而言，明水面比水草下含量高。风浪水面比静水面含量高；就深浅说，浅水比深水含量高。当然，这是指一般情况，如遇特殊天气、特殊情况则另当别论。

水的透明度与水色和钓鱼的关系

“水至清则无鱼”。一般池塘水的透明度在30~35厘米比较理想，适于垂钓；呈黄褐色或油绿色，且混浊度小的水域，是鱼喜欢栖息和觅食的水域。

水的透明度受诸多因素的影响。浮游生物量多，透明度小是肥水的标志；反之，浮游生物量少，透明度大则是瘦水的反映。水的透明度除受浮游生物量的影响外，还受泥沙、天气、鱼类本身的影响。如风浪大，水被搅混，透明度就低；阴天，光线差，透明度也低。鲤鱼喜在池底拱泥找寻食物，故也可使水变混浊，使水的透明度降低。

如水呈淡黄色，透明度在30~40厘米，这种水域的鱼类食欲一定旺盛，尤其喜食动物性钓饵。如水呈淡绿色，透明度在20.30厘米，鱼类食欲旺盛；如果鱼类多的话，不论用植物性钓饵，还是动物性钓饵，均易钓到鱼。如水呈黄绿色，透明度在20厘米左右，鱼多且食欲旺盛，用各种钓饵均可，是垂钓的最佳水质。如水呈深绿色，透明度在10厘米左右，说明水质肥，适合鲢、鳙、非洲鲫鱼生长；在天气晴朗、气温适宜时，这种水色中鱼吃钩率高，但遇阴天、气压低，或天气转变、温差过大时，就会缺氧，鱼浮头不食。如水呈淡褐色，透明度在20厘米左右，鱼食欲旺盛，沉底钓、悬钓、浮钓效果均好。水呈深褐色，浓厚，透明度不到10厘米，水质肥，遇阴雨、气压低、长期阳光暴晒时，鱼多因缺氧而浮头不食，难以钓取。

水的颜色是由水中浮游生物的色泽决定的。褐色水说明水中多为硅藻，绿色水以绿藻和隐藻为多，暗绿色水中以团藻、裸藻为主。工业污染水，水色有红、褐、乳白等颜色，水中成分较复杂。硅藻、隐藻、金藻等浮游生物，以及轮虫、枝角类、桡足类浮游动物易被鱼类消化。这些浮游生物含量高，则鱼类生长快。反之，水色清淡，水中浮游生物少，则鱼无食，自然生长缓慢。到河边钓鱼时，