

处方汇编

內科

咳嗽

處方：神曲三錢，白蘿蔔片二兩，荆芥穗一錢，梨兒片二兩，核桃七個（打碎），大料七個。水煎服。

另方：生薑五片，白榮根一握，水煎服即愈。（安澤李克讓）

另方：乾薑一錢半，五味子三錢，丁細七錢，廣木五錢，枇杷葉三錢泡茶服效。（楊

城宮廷選）

傷風咳嗽

處方：生薑四錢，白蘿蔔一個，用刀切成細條子，煮熟，把水和好。開鍋齊食之即愈。

寒咳嗽

藥方：甜柿餅兩餅，切成小塊，用白酒二兩，倒在碗內，放上柿餅小塊，蒸熟酒乾乾，

另方：桂心，芍藥，皂角，各等分。共為細末，生薑調起為丸，如芡實大，每服七丸至

十丸。小兒酌用，如有痰，可加白芥子。（見藥張及明）

老年咳嗽

病狀：老年人咳嗽數年，至夏即好，秋後又發。

病源：因年老氣衰，肺虛，易感風寒。

藥方：棉花子四兩炒黑，蒼耳子四兩炒黑。

用法：共研細末，再用生薑四兩（搗），紅糖四兩，蜂蜜四兩，蜂蜜和糖，將前藥入內

，共搗和為丸，每服三錢，和燒核桃三個（去壳），煎水送下。（治水王秉權）

長年火咳嗽

藥方：生薑切片，用水煎成膏，每生薑四兩，胡麻蜂蠶四兩，調勻，每日早晚飯後，開

水沖服各一錢。（見源豐膏藥）

時行風寒咳嗽

一
藥方：細切子一兩（半生半炒），芥穗三錢，杏仁三十個，生薑一塊（炒燥），水煎服，服一碗即好。

注意：此方對久常咳嗽者無効。（引水學與醫）

感冒

病狀：惡寒發熱，頭疼身疼。

藥方：荆芥三錢，炒山查三錢，白蘿蔔塊三錢，薄荷三片，葱白七個。

注意：感冒三天以上者，此方無効。（引水學與醫）

頭疼感冒

藥方：白芷三錢，川芎三錢，荆芥三錢，水煎服，立愈。（引水學與醫）

萬靈散

主治：大小人感冒，時行瘟疫，中氣不舒，寒厥氣閉，霍亂吐瀉，肚腹絞痛，小兒驚風。

藥方。

藥方：硃砂一錢，蘇雄黃一錢，明白芷一錢，小兒甘草二錢，丁香一錢。

用法：共為末，煎茶送下。大人每服小兒二錢，小兒酌用。（引水學與醫）

胃病

結胸

妙藥一大把，童便沖服，吐後即愈。（陽城原收）

翻胃

病源：飲食入胃，不久吐出，因脾胃虛寒，胃不納食，不消化，故反翻出。

治法：把半翻草放在新瓦上，每服兩錢，黃酒一兩送下。每日早晚服兩次，服數日即見效。

註：半翻草即牛吃又倒上來的草。（沁水王秉權）

胃氣痛

烏藥一兩（醋炒）元胡一兩（酒炒），陳木香三錢（煨淨），乳香二錢。共為末，醋丸，艾實大，三日服完。（陽城吉廷選）

心胸滿悶餘血積蓄：

大黃三錢半，雷麥三錢半（炒）。研成細末，黃酒一次沖服，大便下，即愈。（陽城王）

噎膈症

病狀：寢食不下。因肝氣上冲，胃口寒滯。

處方：（男）陳鹽木三個，燒成炭研細。每服一錢，燒酒一盞，冲服，早晚服二次。服數日即見效。

另方：（女）用陳木槨一個，燒炭研細。服一錢，早晚服二次。燒酒一盞引，服數日即見效。

註：陳鹽木即鹽鐵木。（沁水王秉權二

痢疾

大人紅白痢疾

病狀：腹疼大便下膿。

處方：當歸一兩（酒洗），白芍一兩（煨炒），枳殼二錢（煨炒），桃仁一錢（去皮，炙炒），紅花一錢，板榔一錢，甘草八分。

用法：水煎服。如發熱煩痛可加露香三錢。紅痢加川黃連八分（蜜炒研），用糖三錢（煨）。白痢加陳木香八分，研細末另沖，梔白皮二錢（土炒），用量以人身強弱而定。（高平李清民）

另方：用熱油條（俗名麻糖）配蒜汁煮熟大食之。（陽城李選三）

紅痢

鴨蛋子六十顆（去皮開圖的），滑石三錢，開水吞服。（參照何相賢）

另方：杭芍五錢，當歸五錢，紫朮二錢半（土炒），國本香七分（煨），板礮三錢，陳皮一錢半，焦查三錢，萊菔子三錢（炒），炙附一錢，水煎服。

病源：受濕熱，濕氣在胃，熱氣在腸。（步瀉附錄）

紅白痢

處方：鴨蛋子一錢，胡黃連四錢，米芾三錢，共研細，紅痢用白朮一兩為引，白痢用紅朮一兩為引，分四次服，即見效。（洪瀾中選錄）

另方：川軍三錢，研細，紅糖一兩開水沖服即愈。

另方：燒芍五錢，黃芩五錢，酒洗山查一兩，鹽醋調製，白朮一錢半，白頭公二錢，甘草二錢紅痢加川黃連一錢半。白痢加乾薑一錢半，紅白痢同用，每服一兩為引。

注意：此方只治初痢。（翼城縣及明）

痢疾

石蓮子肉五錢，胡黃連二錢，川黨參二錢。將三味藥放在瓦上，焙黃，共研細末，再用國本香研。陰陽水沖服即愈。大人每次服二錢，小兒在七歲以下三歲以上者每次服一錢（翼城縣高文）

另方：用雷瓦開兒〇・〇三五瓦，煮開水一〇〇〇，溶解後消毒，體服注射。再用百分之一雷瓦開兒液灌腸（翼城縣選三）

另方：金銀花炒黃，研末，每服三錢，開水送下。白痢加紅糖，紅痢加蜂蜜，服之立愈。
(晉城朱鴻昇)

另方：紅糖四兩，山查四兩，共炒黑色，水煎服。(安澤李克昌)

中暑瀉痢

用西瓜一個切兩半，加白糖一兩，拌和服之。(陽城張錦榮)

另方：山查二兩，加白糖五錢，(紅痢用紅糖，白痢用白糖，糖化即止，開水煎服，最好山查也吃了。(孟縣梁幹)

久痢疾

病狀：肚疼，不思飲食。

處方：烏梅三個(去核)，紅棗四個(燒)，米殼四個(蜜炙)，甘草七寸，共一處煎服。紅痢加白糖一兩，白痢加紅糖一兩，服之即愈。(沁水王秉權)

另方：高粱花三錢(微炒研末)，紅糖二錢，開水沖服。(趙城邢云龍)

另方：米壳七個，烏梅七個，紅棗七個，甘草七寸，燈心七寸，煎服即愈。(晉城朱鴻昇)

另外：鹽片一錢，苦參一錢，共為細末，每服五分，開水送下。小兒減半。(洪洞衛鍾麟)

痢疾丸

專治大便秘血、裏結後重、腹痛

處方：白礬一兩，枯礬一兩，白麵五錢，新艾葉半斤，先將艾葉煮成面糊，和礬研成細末，面糊爲丸，如綠豆大，雄黃爲衣，大人每服二十粒，小兒每服五六粒，開水送下。（《瀕

另方：苦參子（鴨蛋子）廿一粒，元肉廿一個，將苦參子包於元肉內（一個元肉包一個苦參子），一天服完，一日三次，每次服七個，白水送下，第一次止痛下膿，第二次止痢，第三次除根。（晉城李自德）

久痢（阿米巴痢）

●二兩汽水化開灌腸。隔三日一次。六七天即可痊愈。

脾大病之^{（注）}新斯錦波霜（每匣五枝）注射三匣即可痊愈。（新生醫院劉德明）

另方：用川大黃三錢，煎湯服。紅痢用紅礮一兩，沖服。白痢用白礮三錢，紅糖七錢，沖服。（蜀城張及明）

另方：顧木香（煨）三錢，川黃連三錢，威靈子一錢，共爲末（名香連散），全蠍歸三錢，杭白芍三錢，懷香附四錢，共爲末（名歸芍散）。

用法：白痢用香連散二錢，歸芍散一錢，俱用焦查四錢，用水送下，紅痢用歸芍散二錢，香連散一錢，俱用焦查四錢開水送下。（陽城吉廷選）

禁口痢

用蠟（即蠟牛要有牛的）三個，搗如泥，貼臍中一點鐘，喉閉即可服藥。再用黨參三錢，石連肉三錢，陳倉米（炒）一大把。水煎服即愈。不愈者反覆服幾次即愈（沁水王秉權）

另方：小地龍三條，白礬二兩。用茶碗一個，將龍與地龍放在碗內，用紙封住，化成水，二次服完。七歲以上，三次服完，七歲以下，酌量減服。

另方：五谷虫十二個（去尾），川大黃一兩，石連子五錢，（去壳），川實連三錢，吳芋（水炒），焦香三錢，陳倉米一兩（土炒）

用法：共研細末，大人每服五錢，小兒酌量減少。服時，紅白瀉為引，紅瀉用白朮，白瀉用紅朮，五谷虫去頭尾，斷瓦合住用火焙乾。（福祿壽堂正）

瘡疾

方：硼砂五錢為末，紅朮七個（用鹽心水泡，去皮核），黃和硼砂為丸，在發癰前二小時服之。

另方：漫陀細花兒三個（俗名山大麻花，又名開羊花），用水兩碗半，煎至半碗，在發癰前三點鐘服之，即愈。日者二次。

注意：每次三個花不敢多用。（翼城張及明，程延龍）

另方：柴胡五錢，川常山七錢，檳榔三錢，川軍五錢。以水兩碗半煎之，剩一碗露夜，服藥時前兩小時服，服後安睡。（沁水王秉權）

另方：川軍（酒浸）四錢，厚樸二錢，枳實（炒）三錢，砂礪四錢（另包二次用），大白二錢，二丑（炒）四錢，青皮（炒）三錢，柴胡六錢（酒浸），常山四錢（酒浸）

、草草二錢、（面煨）、甘草七分、烏梅七個（去核）爲引，煎服。
如先熱後冷，加黃連炒吳茱一錢，先冷後熱加吳茱炒黃連一錢，在發熱前一天晚上服，再於本日早服兩遍。

在發熱前兩點鐘，再用柴胡（酒浸）七錢，常山六錢，劉酒一兩煎湯溫服，即行安睡，發熱時微汗即止。（陽城吉廷選）

另方：在發熱前一點鐘，用銀針刺合骨穴三分深，行飛針，太衝穴刺二分五深，行飛針，連行三次，去針，再用艾葉灸之。（趙城邢云龍）

另方：用奎寧粉〇、一，稀鹽酸〇、一，溶解後，加蒸溜水八〇〇臨時用時，取三〇〇奎寧液，混合葡萄糖液，靜脈注射。發熱前三小時。（陽城寧選三）

另方：常山五錢（酒炒），烏梅三個（去仁），焦查五錢，草果三錢（去皮）。用法：水煎，第一次煎過濾出，再加水煎第二次，再濾出，夜間放於露天下，蓋上篩底，至病發前一小時半，加燒酒一兩服下。（陽城李春霖）

另方：雞子兩個，不用油煎，把雞子炒熟，陳麩一兩（微炒），合一處，在病前一小時服上即愈。（晉城朱鴻昇）

另方：從背上起，在脊椎骨下刺，出血用火罐追，即愈。或從背上起，在腰中穴刺一針，出血即愈（委中穴在腿內）。或從手臂上起，在合骨穴刺一針（在虎口）行針刺，在病發前一小時。（安澤李克讓）

另方：白朮一兩（饅頭包好火焙適宜），明雄一兩，各研細末，小黑豆五百六十粒，煎熟去皮，搗爛如糊，共合一處，爲三百六十丸，在病未發前一點鐘，用冷開水服一丸，服後忌酒和熱飯等物兩點鐘，有心臟病及大熱大渴單熱者，忌用。（夏縣程青麟）

另外：常山六錢，大白六錢，熟棗仁五錢，柴胡四錢（不用此味也行），炙甘草六錢，烏梅二個，紅糖爲引。

注意：服後睡一覺最好。（靈驗藥）

霍亂

絞腸痧

處方：廣木香（煨）二錢，茴香（鹽炒）四錢，炒食鹽三錢，用滾道土水澄清，去土煎服即效。（陽城吉廷選）

「雷擊散」

專治：大人小孩痧症，霍亂，痘疫等症（預防更好）

處方：萊菔片，北細辛各三錢五分，硃砂、明雄各二錢五分，茴香三錢，白芷，桔梗各一錢，桔梗、防風、廣香、管仲、陳皮、蘇薄荷，治年夏、甘草各二錢。

製法及用法：共研細末，收磁瓶內，勿令濕氣，凡遇急症用二分吹入鼻內，再服八分藥湯送下，服後安睡片時，汗出即愈。（浮山鄭錦云）

乾霍亂腹痛

處方：五錢溫門水送下。（浮山鄭錦云）

霍亂

症狀及治法：上吐下瀉，腹痛難忍。以火針刺中脘穴（在臍上四寸）。如不吐不瀉，刺臍中，此名「頂心刺」。先刺金津玉液穴出血（在舌根底兩大青筋），再以火針刺上臍穴。如腹中痛不止，名「轉筋刺」。速刺中穴，出血，再刺承心穴亦可。若頭暈目眩，可刺太陽穴出血，或尺澤穴出血亦可。（此亦范榮公）

另方：「救急丹」甘草末一錢，硃砂五分，薄荷冰二分，冰片一方，共末，三次服。霍亂自癒。

霍亂大腿轉筋

用帶子將腿轉筋處緊綁住，用繩杆一槓。在轉筋處敲打，至現青色為度，用三鞭針刺，出血即愈。

吐病急救法

用醋一碗，撈肺紅，將火炭放醋內，令病人鼻吸三五口，吐即止。（用曲孟景秀）

另方：生白礬末三分，炒鹽湯送下即愈。如轉筋轉筋可針刺委中穴，出血即愈。（委中穴在膝後腓裏，脊筋屈正中即是）症狀：上吐下瀉肚疼。（陽城吉廷選）

上吐下瀉

馬糞不拘多少，焙黃研末，用白酒與井水各半沖馬糞面子，等酒汁沉下後，喝清水半碗，吐瀉疼痛立止。如不吐不瀉可用食鹽三錢煎黃研末，再用七歲以下男童便一盅，沖食鹽即服下即愈。（沁縣杜敬題）

傷暑霍亂吐瀉

青蒿一把，用青水洗淨，煎服即愈。（沁水王秉樞）

霍亂絞腸痧——肚腹急疼

在肚臍中心，與脊骨對照的地位，在脊骨上把皮用力往上一提，體筋弱為度，再提一節，再提一下，連提三下，漸漸轉動，小兒連提三下，口內冷水，三三而止。（沁水王秉樞）

乾濕霍亂

症狀：肚疼、上吐下瀉、或轉筋。

內服方：藿香三錢，神皮三錢。

用法：煎漿水煎服，如轉筋加木瓜三錢，如瀉重時，加重用之。

針法：尺澤穴出血，三用針五分，中腕針一寸，尾指五分，刺之即愈。

針法：用溫水手拍頭，一路見青筋即現時，針刺出血即愈。

霍亂奇效

服「雷擊散」三錢至五錢，溫開水送下。（池源寶青即）

霍亂預防法

除注意生冷飲食外，每日可多食好醋，或醋劑，或稀鹽酸。八瓦與水一百瓦混合，一日分三次服下。（長子王順麟）

轉筋霍亂

鹽泥四錢，用布包住，水煎溫服，或用八錢灰條菜根，搗爛開水沖服。（鉅縣何相賢）

霍亂

用大拇指，掐住離臍一寸遠近處，氣往上提，小肚收回，口呼木瓜二字即愈。（因木瓜二字是上升）

又法：內服鐵鹽水，用厨刀一把，入火燒烘，將食鹽一撮放刀上，少停投入冷水一碗，令病人飲之。陰陽水，冷水，開水各半。

外治：用兩手指住懶筋即愈。針刺委中穴和尺澤穴。（雖灣內的大青筋）

霍亂轉筋

針刺承山穴，在小腿尖上挖窩裏，刺三四分深。（安澤李克國）

霍亂上吐下瀉

陳皮五錢。雲香五錢。牡心土一塊。水調燈心服。針關尺部穴出血。（夏縣縣志）

上吐下瀉

病況：因氣虛偶感暑熱，不急救，命在旦夕。

治法：用山查一兩，白酒一兩，藥漿水一盅，煎一盅，用烘火柱頭入神效，煎服即愈。
。（師縣縣志）

另方：生薑五錢，食鹽三錢，將食鹽夾到生薑中，用生白布包九層，再用麻線綁緊，放火內燒紅，取出研細末，以生米湯水少許，服用，嘔吐即止。（劉玉樓）

青金錠

男婦風痰——牙關緊閉，痰涎壅盛。小兒驚風痰迷，將此錠取開水磨開，滴入鼻孔，即通喉內，痰即吐出，立效。

製法：元胡二錢，青黛六分，牙皂（火煨）十四個，共為細末，麝香一分（再研），膏水調成錠，每錠五分（陰乾用）。（晉城米鴻昇）

肚腹疼痛

陰寒腹痛

病狀：此類痛不可忍，全身出汗，胃中雷震之故，服此而愈。

方：白馬鬃五錢，（沙黃）研細，杜心黃土三錢，將黃土熬水，沖馬鬃湯，服水即好。（河水玉玉散）

心腹痛

方：一兩，鹽砂玉一錢炒搗，白檀香一錢，水煎服（浮山鄧錦云）

肺病

冬季咳嗽連年不愈

藕節一斤切片，牛蒡半斤切片。用水煎除渣，再熬成膏，加蜜四兩，每服四錢，開水沖服。（參照何相賢）

肺病喘嗽

北沙參三錢（研末），豆腐燻透下，連服數次。

氣管支炎喘息咳嗽氣喘

荷蘭糖十瓦，溴化鈉五瓦，水楊酸鈉一瓦，蒸溜水一百瓦。嚴密消毒後，淨瓶注射，每次十瓦至二十瓦，返復注射即見效。

另方：牛髓一個（牛髓有不用），雞蛋白斤（切碎），刺芥四兩（切碎），撒到牛髓上