

贵州省

中草药接骨验方选

(内部资料)

贵州省中西医结合治疗骨折断肢再植科研协作组

贵阳医学院 主编

前

言

我省民間散存着大量接骨中草藥單驗方，長期以來，對解除廣大勞動人民疾苦，起到很大作用。最近結合我省中西醫結合治療骨折科研工作的開展，我們收集到一部分民間接骨單驗方，現參照部分省內資料，選擇其中材料比較全面，藥物來源普遍，具有一定療效，在我省各地區有一定代表性的處方共計100個，初步整編為這本小冊子，供內部使用。為了推廣使用，交流總結，整理提高我省治療骨折的方藥，望各單位對適應的骨折病例，根據當地藥源情況，選用方劑。特別注意觀察其療效和作好記錄，以求資料完整。并請隨時將使用情況，療效，存在問題，當地其他接骨中草藥方劑等書面告之貴陽中醫

学院骨折断肢再植科研組，以便汇总整理。

由于時間仓促，水平有限，整編工作尚存在不少缺点錯誤。并且对各地藥物名称尚未作全面鉴定，未能整理出植物科属和植物名，仍沿用各地名称，待下次整理再版时补上。

贵州省中西医结合治疗骨折
断肢再植科研协作組
贵阳中医学院

目 录

贵阳地区	(1)
遵义地区	(4)
安顺地区	(11)
黔南地区	(25)
黔东南地区	(38)
铜仁地区	(51)
毕节地区	(67)
兴义地区	(83)
六盘水地区	(91)
附 录	(94)

貴陽地區治療骨折方

—

主治：骨折、陈旧性骨不連。

方藥：水冬瓜根皮粉50%，三條莖葉粉15%，母豬血藤根皮粉10%，野葡萄根皮粉5%，五加皮根皮粉5%，草烏根頭粉2%，澤蘭莖葉粉3%，玉枇杷莖葉粉10%。

制法：藥與油1：1，凡士林油與菜油3：2。菜油煮開，置入凡士林油，俟油稍冷置入藥粉攪勻備用。

用法：骨折復位後，用上藥羔適量敷于患處，包紮固定。五至十天換藥一次，一般換3至5次即可。

療效：藥羔對皮膚無影響，可避免每日或隔日換藥造成骨折再移位。我們有的

病例 5 天换药已有软联合，无骨折再移位情况。

材料来源：贵州省交通医院

二

主治：骨折。

方药：榔树皮四份，接骨木二份，刺老包一份，爬岩姜一份，独脚莲少许。

用法：将上药研粉用温开水和少许酒精调成泥状，涂在纸或塑料薄膜上，并涂一层鸡蛋清，复位后包敷患处。每天用 45% 酒精浸润一次，五至七天换药一次。

疗效：临床使用多例，大部分效果好，极个别无效。

典型病例：肖××，女，15岁。跌伤，左肱骨内髁骨折，局部肿胀、疼痛，功能障碍。X线透视对位，外敷上药，并固定。一周肿痛消失，10天左右有骨痂形成。

材料来源：中国人民解放军七五七八
部队卫生所

三

主治：骨折。

方药：水冬瓜根二两，骨碎补根二两，野葡萄根二两。

用法：先复位，将药外敷患处，杉树皮小夹板固定。每天用75%酒精浸润一次，七天换药一次。

典型病例：孙××，男，15岁。外伤，经X线检查左胫骨上三分之一横断骨折。上药两周后，X线片示有骨痂生长，骨折线消失。患肢活动正常。

材料来源：中国人民解放军368医院

遵义地区治疗骨折方

—

主治：骨折。

方药：1. 消炎、镇痛方——万年庄、双跌打、朱砂莲、铁扫把。

2. 活血、逐瘀方——松尖、小马蹄草、酸浆草。

3. 接骨方——铁莲盖、花蝴蝶、羊屎条、梧桐皮、土别、然铜。

用法：按上列次序用药。

1. 方煎水内服。

2. 方共捣烂，用蛋清调匀敷患处。

3. 方碾末，用酒调包患处，三日一包。

疗效：用本方治疗多例、均愈。

典型病例：徐××，务川杨树人，68岁。从十一丈高崖摔下，跌断8根肋骨。按序用上药共七包，二十一天痊愈。

材料来源：遵义地区医院

二

主治：骨折。

方药：八爪金龙一两，吊鱼杆柴胡三两，接骨丹根三两，赤葛根三两，威灵仙三两，金銀花藤或根五两。

用法：将骨折处复位固定，上夹板和绷带，后用上方将药煎液，趁热熏洗患处，每日三次，每次一小时，每两日用药一剂，如炎症严重，可加生大黄二两与上药共煎。

典型病例：邓××，男，37岁。左胫腓骨上三分之一处粉碎性骨折，经上方治疗40天能下床走路，2个月后就能干活，

半年后能担百斤重担。

材料来源：道真县桃源公社

三

主治：骨折。

方药：赤葛根一两，水冬瓜八钱，合欢皮五钱，刺老包五钱，退血草五钱，马家桑五钱，接骨木一两，地骨皮一两。

用法：上药研粉掺小麦面、鸡蛋清、白酒或甜酒包患处。

典型病例：曹××，男，成。从墙上跌下，右肱骨骨折，复位后包上此药，一月痊愈。

材料来源：桐梓县东山坪卫生室

四

主治：骨折（开放性、闭合性均可）。

方药：八轮麻、赤葛、血当归、泽兰、

抱石莲各等份，半斤以下仔鸡一只。

用法：复位后将此药敷于患处，每日换药一次。

疗效：治疗20例，均痊愈。

典型病例：王兴学，女，46岁。前臂骨折。经用上方三次，半月后能活动，一月后痊愈能参加劳动。

材料来源：桐梓县龙里大队卫生所

五

主治：骨折。

方药：1. 外用方——接骨丹二两，红泽兰一两，大种鹅儿肠一两，散血当归二两，大血藤一两，地乌龟三个，见血飞一两，桑白皮一两。

2. 内服方——一口血五钱，黑乌骨五钱，见血飞五钱，八爪金龙三钱，大血藤五钱，筋骨草五钱，红牛夕五钱，刺五

加五钱，石岩姜一两，地乌龟三个。

用法：1. 方药兑酒捣烂包患处，夹板固定，每隔3——4天用药酒淋患处，七天去夹板。

2. 方药水煎服，日三次，三日一剂。

疗效：曾治百余例各种骨折，效果好。

典型病例：黄××，男，37岁。61年8月出工，被一块大石滚下击伤右小腿，检查诊断为右胫骨粉碎性骨折。用上方治疗21天痊愈，恢复劳动力，肩挑百余斤。

材料来源：正安县

六

主治：骨折。

方药：滑药、接骨丹、红赤葛、土三七、散血草、千捶打各等量。

用法：上药晒干研粉兑酒外敷或鲜品

捣烂亦可，夹板固定。

典型病例：刘××，女，34岁。右手骨折，用此药包三次，治愈。

材料来源：绥阳县宽 区茶树公社

七

主治：骨折。

方药：拐子草、积雪草、马蹄草、透骨消、泽兰、赤葛、细辛、栀子、生姜、火葱、爬岩姜各适量。

用法：捣烂外敷患处。

材料来源：赤水县

八

主治：骨折。

方药：团经药、血当归、玉枇杷各适量。

用法：合捣调浓茶包患处，七天换药

一次，如痛加川、草乌、有泡加見血飞。

材料来源：赤水县

九

主治：骨折。

方药：仙桃草、小血藤、毛青杠、水冬瓜、鉄扫帚、退血草各等量。

用法：捣烂敷患处，二日换药一次。

材料来源：务川县

安順地区治疗骨折方

一

主治：骨折、软組織挫伤、扭伤。

方药：滾山虫，糯草（茎、叶）一斤，四块瓦（茎、叶）五斤，接骨丹（茎、叶）五斤，水冬瓜（叶）二十斤，泡桐树（茎、叶）十三斤，岩豇豆（全草）十斤，大常山（茎、叶）十斤，小常山（茎、叶）十斤，大血藤（茎、叶）二十斤，三角风（茎、叶）十斤，木芙蓉（茎、叶、花）二十斤，臭草（茎、叶）二十斤，小木姜（茎、叶、果）五斤，柳叶过山龙（茎、叶）十斤。

制法：1. 滾山虫接骨粉：将滾山虫焙干研粉，加入等量加熟的糯米粉，混匀。

2. 四块瓦流浸羔：除滾山虫外，将

其余药切细，加水600斤煎熬去渣，浓缩，文火收羔前加入75%酒精200毫升，待酒精加入后冒泡完，片刻即可取备用。

用法：骨折复位后，用四块瓦流浸羔外敷，（范围：骨折上下7——8公分），呈一层薄膜状。3——4天换一次，一般三次即愈。涂药后外面用厚纸或纱布复盖，再用树皮之类作小夹板固定。同时内服滚山虫粉，成人每天服一次，一次服一克，共服15天。

疗效：从临床几例病人观察，对新鲜骨折或陈旧性骨折变新鲜创面后效果好，与一般单纯西医治疗骨折相比，时间缩短三分之一至二分之一。对软组织挫伤胜过西药中的松节油和樟脑油。但对骨折复位差，断面有较大的空隙和血循供应较差的骨折效果不满意（愈合时间稍长2——3月）。