

王氏醫案釋註

上冊

王氏醫案繹注序

清道光朝浙醫王孟英先生名士雄。潛齋牛癡夢影。皆研醫後之別字。其字夢影者。示藥因證異。不執效方之義。著有溫熱經緯。卽王氏五種行世。就中醫案都凡十一卷。雖大旨爲救溫補而設。實則隨證製方。絲絲入扣。果得融會貫通。則古今醫籍兼讀可。緩讀亦可。先生深得力於喻子嘉言。念讀先生書而後得門。原案或脈證方藥並敘。或敘證遺脈。或敘脈遺證。若方藥註銖兩者。則更千百首中一二窺其編次苦心。殆欲人深思自得中材而下。難覓金鍼。念不敢忘得門所自。謹就原案箋釋其病情脈義。方藥之偶闕者。僭補之。銖兩之不注者。僭擬之。顧於原案顯不脗合者。有二。勘病制方。本有得意疾書之樂。移時或銖兩皆忘。何況據案懸擬。元運衰薄。氣體漸就劣弱。擬注不得不故減銖兩。以便揣摩。若溫病中風升陽浮各案。潛陽重鎮之品。不得宗法。先生函診楊素園室人方案。一藥輒至數兩。匪獨偏證偏治。急急證急治。非此不生。並取念所屢試屢效者。折中規定。不敢執死書以困活人。覽者慎勿疑信參半。致千慮一失。若用多備少服法。分次徐投。藥效卽止。則無不可。稿成。顏曰中醫指掌。邑同學束子劭直慨任印貲。除念續刊最簡單之本草外。覽者手此一編。可以尋途轍資事畜。謂保國粹。則吾豈敢。

中華民國丁巳季春江都蘭孫父石念祖自序

王氏醫案釋注凡例

一原案概用單行。詮擬概用雙行。

一治病最忌不分在氣在血。各案註明在氣在血。

一治病以辨證爲要。辨證以熟病情爲要。是書於病情不厭詳注。

一切脈以沈脈爲要。是書於沈脈之脗合病情者詳注之。

一切脈病者正坐。盡前兩手肘置案上。重按久按。方切得出沈脈脈情。

一病有正變。變病之要藥。即正病之禁藥。

一見氣不治氣。此指氣病由於陽虛陰虛者而言。補陽補陰則氣自靜。

一見痰不治痰。此指陽虛陰虛之痰而言。補陽補陰則痰不作。

一見血不治血。此指氣實氣虛之血而言。氣實清之則血不上行。氣虛振之則經自下

行。

一補陰難。補陽尤難。久病陽旺陰虛可治。陰陽兩虛不治。氣不運藥。良方何益。

一看舌胎。雖婦女宜令張口看到舌根。不可但看舌尖。胃脘有無垢滯。以舌根胎形爲主。若醫年老目昏。看舌又在深房密室。宜洋燭。忌電燈。洋燈並須啓窗細看。

王氏醫案釋注卷一

海寧王士雄孟英醫案

武進謝 觀利恒校訂

江都石念祖蘭孫釋注

陽脫

夏令某登廁忽然體冷汗出氣怯神疲。孟英視之曰。陽氣欲脫也。猝不及得藥。適有三年女佩薑一塊。約重四五錢。急煎而灌之。即安。後用培補藥。率以參芪朮草為主。蓋氣分偏虛也。辨陽虛在氣怯神疲三年及約重四五錢。非開字。陽虛宜溫補。忌辛散。辛竄病重藥輕。傷陽。虛在氣怯神疲三年及約重四五錢。非開字。陽虛宜溫補。忌辛散。辛竄錢。土炒西芩四錢。續土炒白朮三錢。土炒粉草一錢五分。參芪多於類推。宜用土炒。為行補守之品。尤草也。

吐血

范慶簪年踰五十。素患痰嗽。乙酉秋在婺。驟然吐血。勢頗可危。孟英診曰。氣虛而血無統攝也。雖向來咳嗽陰虧。陰藥切不可服。然非格陽吐血。附桂更為禁劑。乃以潞參、朮、苓、草、山藥、扁豆、橘皮、木瓜、酒炒芍藥為方。五貼而安。素患痰嗽。病在氣分。不在血分。尤右脈重。按尤嗽。氣虛忌用冬地。陰藥固已。但非格陽吐血。若用三錢。一毫附桂。一便傷其兼證。之陰。虧宜用炒。參五錢。炒冬地。四錢。固已。但非格陽吐血。若用三錢。一毫附桂。一便傷其兼證。山藥三錢。炒扁豆三錢。陳橘皮一錢。甘草五分。陳木瓜並用。於一錢。五錢。取酒炒。白芍一錢。五錢。此證。注。重。氣。虛。但。補。氣。不。可。傷。陰。方。中。甘。草。五。分。木。瓜。並。用。於。一。錢。五。分。取。酒。炒。白。芍。一。錢。五。分。此引。陽。入。陰。之。法。但。主。要。仿。仲。景。在。氣。虛。微。成。法。分。次。徐。服。此。必。全。方。英。一。當。時。日。全。所。服。亦。繼。去。甘。草。恐。非。重。藥。輕。投。之。義。宜。仿。仲。景。在。氣。虛。微。成。法。分。次。徐。服。此。必。全。方。英。一。當。時。日。全。所。服。亦。繼。去。甘。草。木瓜。加熟地。阿膠。紫石英。麥冬。五味子。龍骨。牡蠣。熬膏。服之。全愈。除方從各陽引。十倍之。外。去。甘。草。阿。膠。二。兩。甘。酸。石。英。一。兩。膩。氣。分。不。能。攝。五。兩。味。子。陰。一。兩。使。兩。陰。虧。咳。嗽。骨。二。兩。證。併。牡。蠣。宜。二。兩。地。二。兩。阿。膠。二。兩。甘。酸。石。英。一。兩。膩。氣。分。不。能。攝。五。兩。味。子。陰。一。兩。使。兩。陰。虧。咳。嗽。骨。二。兩。證。併。牡。蠣。宜。二。兩。

石兩、英石五、龍牡先、斂煨、鎖、熟、爲、地、陰、阿、膠、下、麥、行、冬、之、治、使、陰、虛。

鄭德順春患急證。時已二鼓。丐孟英視之。見其扒牀拉席。口不能言。惟以兩手指心抓。

舌而已。孟英曰：中毒也。取菰豆二升，急火煎清湯，澄冷灌之。果卽霍然。詰期詢其故，始

言久患臂痛因餌草頭藥下咽後卽心悶不可耐舌麻不能言

澄在冷
氣灌分
之
不各有
血深義
分兩陽
手動指
陰心靜
抓扒
舌牀
毒拉
重席
病是
急熱
急證
證非
急寒
治證
藁口
豆不
少能
用言
則兩
有手
杯指
水心
車抓
薪舌
之是

情禍
熱煎
毒藥
雖文
在火
上煮
焦性
氣入
分下
然焦
煎武
成火
熱藥
服性
則入
證上
熱焦
湯故
熱宜
下急
咽火
後煎
嫌清
與湯
病其
勢澄
扞冷
格澀
澄之
冷者
灌煎
之項
卽病

寒用之寒義遠

嫠人羅元奎。夏令猝發寒熱。旋即嘔吐。不能自立。自言。胯間痛不可當。孟英視其痛處。

焮赤腫硬形如肥皂筴橫梗於毛際之左乃曰此證頗惡然乘初起可一擊去之用金

銀花六兩生甘草一兩皂角刺五錢水煎和酒服之一劑減其勢再劑病若失熱碎三發句寒

本病得在標氣失勝若痛徒治當氣四病句則病更在與血此情證根係鍵血不病合及此氣證本頗病惡在三血句標即病不急在證氣急若治治偏血證遺偏氣治則

氣之義不暴降病多則多氣無則治實血證登銀不治治放血草用熱緩生血草病中一君兩藥入以凡緩病中偏顧於陰陽五乘者諸必真作不汗足基於本陰刺血少熱用

銀則一花發兩
生外草證
上多入
氣則分
散合外
之證爲銀
一花升生
一草降總
且上酒中
能引以
引入
銀血
花分
入角
血刺
分五
涼錢
血煎
散和
療酒
陳服
酒引
和甘
服寒
宜之

逾年患傷寒。孟英切脈虛細已極。曰。此不可徒攻其病者。以陰分太虧耳。予

景岳法以熟地當歸酒炒白芍炙甘草橘皮柴胡等藥一劑而瘳

傷爲重實爲言萬世門南法鹹律孟諱英活深病得三力分於內喻傷氏七世分醫外治感傷外寒感滿爲紙重溫七散分無內一傷藥三顧分及外內感傷

傷芍爲重實爲萬世南鍼孟英得三力於內傷氏七分醫治感傷外寒濕爲紙溫七分散無一藥顧及內外感傷內

傷芍爲重實爲萬世南鍼孟英得三力於內傷氏七分醫治感傷外寒濕爲紙溫七分散無一藥顧及內外感傷內

噫氣

陰虛火

外感

誤人無一錢宜用炒熟地一兩開水湯去渣用湯煎藥當歸身三錢酒
炒白芍一錢五分炙甘草三錢橘皮一錢五分柴胡三錢橘葉均次入

某素患噫氣凡體稍不適其病即至既響且多戊子冬發最甚苦不可言孟英曰此陽
氣式微而濁陰上逆也先服理中湯一劑隨以旋覆代赭湯投之遂愈嗣後每發如法

服之輒效噫氣有肺為邪陽虛一邪實此證辨陽虛在既響且多冬發最苦肺為實邪所塞則不

能金聲玉振此證充於皮毛故因肺阻實邪斷不能逆既響且多冬發最苦肺為實邪所塞則不

陽亦虛表陽不充證充於皮毛故因肺阻實邪斷不能逆既響且多冬發最苦肺為實邪所塞則不

氣以虛而逆補陽則氣納旋覆代而逆何有先服理中病下者取濁虛致上病必脾陽不腎陽兩

足而後中氣上升降適常隨以旋覆代而逆何有先服理中病下者取濁虛致上病必脾陽不腎陽兩

故以代緒厚引參三錢力炒乾薑四錢浮越服理中宜用土炒路黨五錢炒土白朮三錢炒甘二錢

草二錢炒厚引參三錢力炒乾薑四錢浮越服理中宜用土炒路黨五錢炒土白朮三錢炒甘二錢

製旋花三錢厚引參三錢力炒乾薑四錢浮越服理中宜用土炒路黨五錢炒土白朮三錢炒甘二錢

錢旋花三錢厚引參三錢力炒乾薑四錢浮越服理中宜用土炒路黨五錢炒土白朮三錢炒甘二錢

如飲酒孟英主一味元參湯其效若神屢試皆驗元參片在一面赤常如湯飲酒去渣分次用

服溫葉殿和秋患感旬日後汗出昏瞽醫皆束手孟英勸之曰此真陰素虧過服升散與傷

寒誤發少陰汗同例下竭則上厥豈得引亡陽為比而以附桂速其斃耶以元參地黃

知母甘草白芍黃連茯苓小麥龜板鱉甲牡蠣阿膠為大劑投之得愈旬日後汗出昏

者已後汗出昏瞽旬則非甫病汗出昏瞽可知始雖升散真陰未竭汗出不急證急治元參病

片一兩四錢地八錢開水同錢泡湯去渣用錢煎藥炒知母一兩一錢川雅二兩五錢分牡蠣四兩三
錢整一兩四錢地八錢開水同錢泡湯去渣用錢煎藥炒知母一兩一錢川雅二兩五錢分牡蠣四兩三
三味皆先專治下竭元參和服白芍陰小止汗知母黃連微瀉其傷陰之熱下液厥下

風火沸騰。生草白芍。合用。暫緩。其如火燎。原之勢。陰傷。小麥。夜吐。花。陽。傷。皮。則。陰。潤。之。藥。不。能。孤。立。以。自。行。故。以。茯。苓。其。中。樞。北。地。土。性。甘。寒。北。小。麥。夜。吐。花。陽。傷。皮。則。陰。潤。之。藥。不。愈。竭。陽。止。則。陰。漸。復。何。昏。替。之。有。元。參。地。黃。泡。煎。去。渣。避。其。滯。賦。三。甲。多。煎。則。藥。色。升。則。取。陰。其。沈。之。義。也。上。病。

趙子升夏病瘧急延孟英視之曰暑熱爲患耳不可膠守小柴胡也予白虎湯一啜而瘧原此證必面赤大汗飲冷舌赤脈數重按有力生石膏三兩先煎酒炒知母三錢鮮荷莖一去

瘧此證必面赤大汗飲冷舌赤脈數重按有力生石膏三兩先煎酒炒知母三錢鮮荷莖一去

瘧此證必面赤大汗飲冷舌赤脈數重按有力生石膏三兩先煎酒炒知母三錢鮮荷莖一去

瘧此證必面赤大汗飲冷舌赤脈數重按有力生石膏三兩先煎酒炒知母三錢鮮荷莖一去

瘧此證必面赤大汗飲冷舌赤脈數重按有力生石膏三兩先煎酒炒知母三錢鮮荷莖一去

瘧此證必面赤大汗飲冷舌赤脈數重按有力生石膏三兩先煎酒炒知母三錢鮮荷莖一去

瘧此證必面赤大汗飲冷舌赤脈數重按有力生石膏三兩先煎酒炒知母三錢鮮荷莖一去

瘧此證必面赤大汗飲冷舌赤脈數重按有力生石膏三兩先煎酒炒知母三錢鮮荷莖一去

瘧此證必面赤大汗飲冷舌赤脈數重按有力生石膏三兩先煎酒炒知母三錢鮮荷莖一去

瘧此證必面赤大汗飲冷舌赤脈數重按有力生石膏三兩先煎酒炒知母三錢鮮荷莖一去

瘧此證必面赤大汗飲冷舌赤脈數重按有力生石膏三兩先煎酒炒知母三錢鮮荷莖一去

瘧此證必面赤大汗飲冷舌赤脈數重按有力生石膏三兩先煎酒炒知母三錢鮮荷莖一去

瘧此證必面赤大汗飲冷舌赤脈數重按有力生石膏三兩先煎酒炒知母三錢鮮荷莖一去

外感

傷風

鄭陽江

鮮冬瓜子四錢黑槐皮三錢
荷莖三錢苦杏仁三錢

范蔚然八月患感旬餘諸醫束手孟英治之見其氣促音微呃忒自汗飲水下嘔隨卽
傾吐無餘曰伏暑在肺必由溫散以致劇也蓋肺氣受病治節不行一身之氣皆失其
順降之機卽水精四布亦賴清肅之權以主之氣既逆而上奔水亦泛而上溢矣但清
其肺則諸恙自安閱前服諸方始則柴葛羌防以升提之火藉風威吐逆不已猶謂其
胃中有寒改用桂枝乾薑以溫燥之火上添油肺津欲絕自然氣促音微疑其虛陽將
脫也徑予參歸蛤蚧柿蒂丁香以補而納之愈補愈逆邪愈不出欲其愈也難矣亟屏
前藥以瀉白散合清燥救肺湯數服而平論證盡於原案生桑白皮三錢地骨皮四錢
參八錢花麥冬三錢冬桑葉四錢苦杏仁一錢和服
五分鮮枇杷葉三錢刷包清阿膠二錢煨泥和服

何叟年近八旬冬月傷風有面赤氣逆煩躁不安之象孟英曰此喻氏嘉言所謂傷風
亦有戴陽證也不可忽視以東洋參細辛炙甘草熟附片白芍茯苓乾薑五味胡桃肉
細茶葱白一劑而瘳孟英曰此眞陽素虛痰飲內動衛陽不固風邪外入有根蒂欲拔
之虞誤投表散一汗亡陽故以眞武四逆諸法回陽鎮飲攘外安內以爲劑不可施之
陽實邪實之傷寒重按陽無力外陰內實內虛面赤氣逆煩躁不安孟英診斷戴陽必脈
附片五錢炒白朮三錢酒炒白芍一錢五分連白茯苓三錢乾薑四錢北附片三錢
先三錢連衣胡朮肉五錢煎陳細茶一錢五分連白茯苓三錢乾薑四錢北附片三錢
重於參苓坐鎮中樞五味胡桃肉五錢煎陳細茶一錢五分連白茯苓三錢乾薑四錢北附片三錢
薑合四君坐鎮中樞五味胡桃肉五錢煎陳細茶一錢五分連白茯苓三錢乾薑四錢北附片三錢

秋瘧

腰直腫

脹疝

之妙白芍細茶反佐葱白正治傷寒

某秋患瘧大為醫人所誤初則表散繼則滋補延及月餘肌肉盡削寒熱不休且善嘔

惡食溺清畏冷孟英診視曰足太陰淫瘧也以金不換正氣散三啜而安此病近因在誤於滋補

住實耶則製肌肉盡削寒熱不休滋補則敗脾陽故善嘔惡食溺清畏冷薑汁製茅蒼朮

錢八錢薑汁製肌肉盡削寒熱不休滋補則敗脾陽故善嘔惡食溺清畏冷薑汁製茅蒼朮

鍾耀輝年踰花甲在都患腫起自腎囊氣逆便溏諸治不效孟英治之切其脈微而弱

詢其溺清且長五苓八正腎氣五皮徧嘗之矣孟英曰此土虛不制水也通利無功滋

陰亦謬法宜補土勝溼予大劑參朮果即向安芍土炒潞黨五分土炒西芩三錢土炒酒甘草白

二錢土炒乾薑五錢炒故紙杵五錢熟附片五錢北五味杵三錢土炒陳木瓜三錢炒酒甘草白

為脾胃根鍵大凡脾陽極敗如不挾風寒痰滯非兼補腎陽不可木瓜不獨入脾消腫

合參草芪偏酸甘溫燥流弊

金元章媳甲午新寡後患膿窠疥大抵淫熱之病瘍醫連某疑為遺毒竟作梅瘡治漸

至上吐下利不進飲食另從內科治亦無寸效延至次年春令更兼腹痛自汗汎愆肌

削諸醫望而却走孟英視之曰此胃氣為苦寒所敗肝陽為辛熱所煽前此每服陽剛

即如昏冒稍投滋膩泄瀉必增遂謂不治之證未免輕棄乃以四君子加左金椒梅蓮

子木瓜餘糧石脂等出入為方百日而愈第汛猶未轉也諸親友環議通經孟英力辨此非經阻可通之證惟有培養生化之源使氣旺血生則流行自裕恪守其方服至仲

肝药

喉痺

產泌乳

不行

踏花

吳馥齋妹稟質素弱。嗣失怙恃。情懷悵悵。汛事漸愆。寢食皆廢。肌瘦吞酸。勢極可畏。孟英以高麗參鹽水炒黃連甘草小麥紅棗百合茯苓牡蠣白芍旋覆花新絳等治之。各恙漸已。繼參歸地滋陰康強竟勝於昔。病情懷挹。挹則心火不生。脾土而肌脾敗。廢食皆肝。一錢生熱。敗不能滋榮。肝木則肝鬱生熱。高麗參切三錢。淡鹽水炒。黃連白芍一炒。甘芳用四分。君合仲景甘草大棗湯方。義強心脾。且此方接合黃連。效於後。宜脾去甘中草瀉。肝百合。旋覆花。使肝錢五分。賊脾絹包。加次淨入。歸身一牡蠣錢五分。炒。先大杵。生新地絳。三錢。原方去小勢。麥下。旋覆花。肝旋覆花。一錢。不賊脾。絹包。加次淨入。歸身一牡蠣錢五分。炒。先大杵。生新地絳。三錢。原方去小勢。麥下。旋覆花。於病者十之三。死於藥者十之七。腫水病也。脾陽敗。則腫。日甚。土薑三錢。土五錢。土熟附片。錢五。後炒。

一男患喉痺。專科治之。甫愈而通身腫勢日甚。醫者驚走。孟英診之。曰。病藥也。投附子理中湯數劑。而痊。喉痺治以寒涼。法原不謬。而藥過於病。翻成溫補之證。孟英嘗云。死於病者十之三。死於藥者十之七。

腫水病也。脾陽敗則腫。日甚。土炒。薑三錢。潞黨五錢。土炒。熟附片。

錢先
五
後
炒

枰、後炒。

朱氏婦產後惡露不行。而宿哮頓發。專是科者不能下手。孟英以丹參桃仁貝母茯苓

滑石花粉桑枝通草蛤殼苡仁紫苑山查絲瓜子茺蔚子旋覆琥珀出入爲方三日而

愈
西因
痰惡
珀露
研停
冲而
八發
分宿
焦哮
山是
查由
研血
二病
錢及
川氣
貝紫
母丹
研參
二三
錢錢
方生
通桃
草仁
口三
錢三
桑錢
枝壳
酒煎
炒子
三杵
錢先
旋四
覆錢

一錢錢
五生五
蛤粉包
先次入
錢此生
苡服仁
四日錢
紫丹苑
參茸桃
一仁錢
五蕪分
辨次珥
入加絲
瓜決子
三三錢
杵西先
此石方

兼服
治一
哮喘
日續
宜方
先則
於專
治治
停痰
哮喘
中

韓名諒兒婦重身患熱病。諸醫皆慮胎墮。率以補血爲方。旬日後勢已垂危。孟英診之。

曰脾腎雖寒肝陽內盛徒服剛烈焉能中肯以參朮枸杞從蓉茴香當歸菟絲鹿角霜

桂茯苓棟實黃連吳萸橘核等藥爲方服之今數年無恙矣肝冬爲陰藏主令之時病爲

故冬輒發痢年踰七旬則其人得天厚能任陰藥肝冬爲陰藏主令之時病爲

錢肉桂心五分白茯苓三分錢川棟實先四

石符生抱病亦爲陳六順治困孟英診焉脈沈而澀滯模糊不分至數肢涼畏冷涎沫

上湧二便澇少神氣不爽曰此途次感風溼之邪失於解散已從熱化加以溫補致氣

機愈形窒塞邪熱漫無出路必致燂液成痰逆行而上但予舒展氣機則痰行熱降諸

恙自瘳矣以黃連黃芩枳實橘皮梔子淡豆豉桔梗杏仁貝母鬱金通草紫苑竹茹蘆

菰汁等藥三服而起調理旬旬遂愈而脈爲氣道痰熱阻氣則氣不能升降應指故脈沈

清痰逆升故涎沫上涌二便澇少氣不爽故肢涼畏冷痰動陰靜熱證不病邪多上行熱邪

神氣不爽肺若華蓋下覆心藏熱邪望肺心處於被動一錢五分天君豈能泰然故三錢苦

梗製雅連八分華蓋製下覆心藏熱邪望肺心處於被動一錢五分天君豈能泰然故三錢苦

貼服兩方去入梘鼓加五分通草三錢八分黃豐金八分紫苑苦次入泥一錢蘆菰汁茹三服二錢此方

王某夏患感謝樹金治之病雖退能食但不能起坐類乎癱瘓延已月餘孟英視之曰

此多服表散汗出過分氣血兩傷肢骸失其營養脈微而細舌亮無胎予大劑參芪歸

朮熟地杜仲菟絲牛膝山藥木瓜萸肉桑枝數十貼而起而血賴氣生表散過分則氣傷

内傷

勞力人陰分素虧。驟感風溼。兩膝刺痛。痠痺不能稍立。孟英以六味地黃湯加獨活。豆卷一劑。知二劑已。凡陰分素虧。風溼中於兩膝。法當以補陰治本。以輕者熱灼液也。大熱

西地
獨一
活兩
次山
入莧
三肉
錢二
大錢
豆淮
卷山
麻藥
黃四
水錢
炒雲
次荅
入一
三錢
錢五
陰分
虧粉
者丹
非皮
補二
陰錢
不生
能澤
作瀉
汗一
錢

錢

張養之妻飲食如常而肌膚消瘦汛事如期而紫淡不恆兩腓發熱而別處仍和面色

青黃而隱隱有黑氣儼似虛寒多藥不效孟英診之脈似虛細而沈分略形弦滑曰此

陽明有餘少陰不足仲景有急下存陰之法然彼外感也有餘之邪可以直瀉此內傷

也。無形之熱。宜以甘寒義雖同。而藥則異。贈以西洋參。生地。白芍。生石膏。知柏。苓。梔。

麥冬花粉棟實丹皮木通天冬諸品服至數斤黑氣退而肌漸充腓熱去而經亦調矣

紫微
淡白
如恒
血氣
有伏
熱熱
血脈
胃熱
賊汗
氣血
氣血
亦為
失熱
常氣
氣具
不血
充不
血氣
則脈
色華
淡白
以紫
則青
如紅
熱熱
脈脈
之氣
象象
也生
分兩
為肝
主為

熱邪阻滯
氣機不舒
肝氣鬱結
情志不舒
反胃不食
不能宣達
於外
浮腫
分生
石脈
青黃
先去其
煎不
木錢
通西
一洋
錢參
敷三
服錢
後酒
去炒
石知
膏母
泥二

白皮三錢
芍藥三錢
川椒一錢
通草一錢
知母一錢
母加一錢
大生一錢
生地一錢
八錢
錢
明錢
天冬一錢
冬切一錢
六錢
錢
粉一錢
丹皮一錢
四錢
錢
炒一錢
川黃一錢
黃柏一錢
一錢
錢
生一錢

此。元。帝。至。後。帝。曾。千。天。几。尊。季。重。聲。之。甫。宣。皮。上。去。皇。天。申。之。應。省。不。能。言。之。五。公。司。

姚氏婦產後昏譫汗厥肌膚浮腫醫投補虛破血祛祟安神之藥皆不能治孟英診詢

實白
芍三
先三
錢錢
川棟

惡露仍行。曰此證醫家必以為奇病。其實易愈也。昔金尚陶先生曾治一人。與此相似。

載於沈堯夫女科輯要中。方用石菖蒲。膽星。旋覆。茯苓。橘紅。半夏。麩。名蠲飲六神湯。凡

產後惡露行而昏譫者。多屬痰飲。不可誤投攻補。此湯最著神效。如方服之。良愈。汗昏譫

肌膚浮腫。病在氣分。惡露仍行。血分無病。則皆譫為氣分。痰飲病。可斷。石菖蒲。次

王炳華妻患舌瘡痛礙飲食。內治外敷。皆不效。曰此血虛火浮也。以產後發熱例施之。

用熟地當歸酒炒。白芍炙甘草。茯苓。炮薑。投之。其病如失。舌紅脈數。為陰中之陽。虛亦虛。炒熟

芍地。五錢。淨歸身三錢。炒甘草三錢。炮薑八分。一老人霍亂後。目閉呃忒。醫謂脫陷。在即。擬予桂附回陽。未服。孟英詢知溺赤。口乾。脈

情。與數改予肅清肺胃之劑。果得漸安。目為肝。呃忒。肝熱。逆冲。則目閉。呃忒。為動。象熱。傷肺

入三錢。中。花。粉。三錢。雲。茯苓。三錢。酒。炒。知。母。一。錢。五。分。薑。酒。炒。川。連。六。分。鮮。薑。根。八。錢。次

張鑑錄年踰花甲。中秋夜猝仆於地。孟英脈之。弦滑而大。曰痰氣食相併而逆於上也。

先以烏梅擦開牙關。橫一竹箸於口。灌以淡鹽薑湯。隨入鵝翎探之。太息一聲而甦。次

予調氣和中而愈。虛。病。無。虛。脈。弦。滑。為。痰。食。脈。大。為。氣。行。

姚樹庭古稀久瀉。羣醫不效。孟英曰。弦象獨見於右關。按之極弱。乃土虛木賊也。前方

皆主溫補。升陽理原。不背義則未盡。如薑附肉蔻骨脂之類。氣熱味辣。雖溫脾臟反助

肝陽。肝愈強。則脾愈受戕。且辛走氣。而性能通泄。與脫者收之之義。大相刺謬。鹿茸升

肝陽。肝愈強。則脾愈受戕。且辛走氣。而性能通泄。與脫者收之之義。大相刺謬。鹿茸升

泄吐

餘德糧寒和蔘服。藜取又其爲。瀉烏腸梅止木瀉瓜急白則芍治反標佐之之義品也。石脂

法今擬方博一噓高麗參乾薑五味石菖蒲酒炒薤白半夏橘皮紫苑桔梗甘草爲劑

之先必掛一降錢之古氣結未極有次不入能三降錢而炒能甘升羣者三也錢此五證味陽用氣得以極虛精而將不欲宣升

倪懷周妻。夏產數日。泄瀉自汗。嘔吐不納。專科謂犯三禁。不敢肩任。孟英診脈虛微欲

絕證極可虞宜急補之遲不及矣用東洋參耆朮龍牡酒炒白芍桑枝木瓜扁豆茯神

橘皮紫石英黑大豆投之四劑漸以向安
辨陽虛在脈不虛可微忽欲絕病案中數日幸及專誤科藥不

錢此
酒證
炒陽
白虛
芍微
一拈
錢陰
五虛
分於
酒方
炒中
桑用
枝龍
三牡
錢黑
陳大
木豆
瓜知
四之
錢高
炒麗
扁參
豆五
三錢
錢炒
雲西
扶莢
神五
三錢
錢炒
賴白
氏朮
橘三

錢紅
參一
茂錢
龍五
疾分
正紫
治石
陽英
虛五
龍錢
牡醋
石煨
英龍
重骨
鎮一
合錢
木醋
瓜煨
白牡
芍蠟
扁三
豆錢
之三
斂味
濟同
以杵
止先
泄炒
瀉黑
自大
汗豆
嘔杵
吐三

鎮中紅宣中桑枝通絡止汗神坐

張養之姪女汛愆飲食漸減于某予通經藥服之尤惡穀孟英診之脈緩滑曰此痰氣凝滯經隧不宣病由安坐不勞法應豁痰流氣勿投血藥經自流通及服孟英藥果漸吐痰而病遂愈

錢陳賴星徽服五分旋覆花芽四錢炒枳實九錢紫苑研次入一錢

毛允之戊年冬患感初治以溫散繼治以滋陰延至次春病日以劇鳳山僧補以升柴芪朮丁卯橋下以輕粉巴霜雜藥偏投形神日瘁孟英視之脈來澀數上溢呃忒口膩雖覺嗜飲而水難下咽頻吐涎沫便秘溺赤潮熱往來少腹如烙按之亦不堅滿此病原屬冬溫治以表散則津液傷而熱乃熾繼以滋填熱邪愈錮再施溫補氣機更窒升柴芪朮欲升其清而反助其逆巴霜輕粉欲降其濁而盡劫其陰病及三月發熱不是表邪便秘旬餘結滯非關積滯且脈澀為津液之已傷數是熱邪之留著溢乃氣機為熱邪所壅而不得下行豈非溫邪未去得補而膠固難除徒使其內燦真陰上熏清道以致一身之氣盡失肅清之令法當搜剔餘邪使熱去津存即是培元之道伸其治節得濁氣下趨乃為宣達之機以北沙參麥冬知母花粉蘭草石斛丹皮黃芩桑葉梔子黃連木通銀花橘皮竹茹蘆根橄欖枇杷葉地栗海蛇等出入為方服之各恙遞減糜粥漸加半月後始得大解而腹熱全消穀食亦安乃予滋陰善後而痊