

伤寒论表

傷寒
志

同治十年湖不
崇文書局開雕

傷寒審證表序



有熊氏作而醫學肇興含生育物疵
癘不作周秦而降和華倉扁之雄各
傳其術以奏神奇漢張機氏審經脈
和藥石集經方之大成舉世尊為醫
中至聖懿哉傷寒論一書亘萬古莫
能忒矣顧以年代貿遷章次陵雜潛

心搜討多所難通唐孫真人後迄無
解者

國朝醫學昌明得昌邑黃元御氏以
天挺才智著傷寒懸解以闡之於經
絡藏府陰陽順逆綜貫條理剖析靡
遺亦既燦若日星矣然而原文覲列
箋注闕富非攻醫力學之士仍苦粹

難辨晰涇邑包司馬誠良於醫以需
次鄂中來謁叩以黃氏學言之甚悉
并質其所為傷寒審證表均依黃氏
編第者一冊請付剞披閱一過證狀
畢呈如掌如貌不失銖寸厥功鉅哉
豈惟克章黃氏絕業其有裨於民生
日用之需至切也瀚章忝膺重寄冀

蘇蒸黎之凋瘵而躋之仁壽舉凡所
為輦邦本利元元者致治之術與良
醫治疾將無同因序是表輒惓惓於
懷而未能忘也同治九年歲在庚午
冬十有二月朔督楚使者合肥李瀚
章序



傷寒審症表序

傷寒論一書晉時已無善本王叔和蒐輯成之唐孫思邈著千金方尙未得見傷寒論晚乃見之故千金方中傷寒明方論缺畧後乃作千金翼方補之宋林億等所校仍王叔和編次之舊成無已作註亦未能將本文編正篇次既亂註故未明嗣後註家雖多襲訛承錯異說紛起無可執中迨我

聖朝醫學昌明山左昌邑黃氏坤載應運而生苦心孤詣作傷寒懸解一書於原文一百十三方分別六經剖析貫

串一一釐正註明本病經病府病藏病壞病及傳府傳藏
入陽入陰綱舉目張各歸各門於是傷寒一書條理井然
文義昭著是黃氏有功於仲景實非淺鮮卽謂中景原書
復出無不可也予少游山左隨張宛鄰先生學醫先生令
校讎黃氏諸書而于傷寒一書尤爲致力惟其文奧義精
最難記誦因作傷寒審症表一卷鈎元提要時時溫習以
備遺忘同志者見而好之謂可爲傷寒之一助慙慙付梓
閱者匡其不逮而惠教之幸甚繕成聊記數語以敘緣起
云同治九年七月望日涇縣包誠書于鄂省寓中

傷寒審症表序

傷寒論一書晉時已無善本王叔和蒐輯成之唐孫思邈著千金方尙未得見傷寒論晚乃見之故千金方中傷寒明方論缺畧後乃作千金翼方補之宋林億等所校仍王叔和編次之舊成無已作註亦未能將本文編正篇次旣亂註故未明嗣後註家雖多襲訛承錯異說紛起無可執中迨我

聖朝醫學昌明山左昌邑黃氏坤載應運而生苦心孤詣作傷寒懸解一書於原文一百十三方分別六經剖析貫

串一一釐正註明本病經病府病藏病壞病及傳府傳藏
入陽入陰綱舉目張各歸各門於是傷寒一書條理井然
文義昭著是黃氏有功於仲景實非淺鮮卽謂中景原書
復出無不可也予少游山左隨張宛鄰先生學醫先生令
校讎黃氏諸書而于傷寒一書尤爲致力惟其文奧義精
最難記誦因作傷寒審症表一卷鈎元提要時時溫習以
備遺忘同志者見而好之謂可爲傷寒之一助慙慙付梓
閱者匡其不逮而惠教之幸甚繕成聊記數語以敘緣起
云同治九年七月望日涇縣包誠書于鄂省寓中

太陽

欲救邪	故汗出	弱衛強	出此營	發熱汗	太陽病	嘔吐乾	鼻鳴乾	寒發熱	惡風惡	汗自出	陰弱者	熱自發	陽浮者	浮陰弱	中風陽	太陽病	証風桂	惡風桂	熱汗出	頭疼發	太陽病
復煩脈	半日許	汗宜解	傷寒發	汗麻黃	數可發	脈浮而	可發汗	病在表	脈浮者	証麻黃	汗而喘	惡寒無	節疼痛	腰痛骨	熱身疼	頭痛發	太陽病	傷寒名	俱陰陽	脈陰陽	疼嘔逆
者發熱	譴語弱	渴被火	弱必	弦緊而	寒脈不	形作傷	桂枝各	身必痒	小汗出	以不得	未解也	熱色有	色反有	吐也面	發汗下	不可更	陽俱虛	寒者陰	微而惡	愈也脈	者為欲
虎加人	證者白	水無表	湯欲飲	白虎湯	不可與	不解者	無汗表	浮發熱	傷寒脈	入陽明	表有寒	裏有熱	裏有熱	浮滑此	傷寒脈	明去路	熱也白	者裏有	滑而厥	傷寒脈	將人
心下悸	水多必	者以飲	小便利	太陽病	去陰少	小龍	或喘者	少腹滿	噫或利	噫或利	或利或	或或湯	發熱而	氣乾嘔	下有水	不解心	傷寒表	陰去少	証入龍	湯救之	以真武
在裏表	八日不	傷寒吐	証白虎	解脈洪	出後大	服桂枝	不証杏	杏甘石	喘無大	桂枝若	下後不	之亦喘	者必喘	發汗後	之麻石	麻杏甘	而喘無	行桂枝	發汗後	津証亡	得小便利
裏俱熱	不解熱	吐下後	証白虎	大者熱	煩渴不	湯大汗	証杏甘	湯主之	麻結死	而此名	更行陰	喘後作	以水灌	飲水多	証石甘	石湯主	大熱者	汗出者	不可更	白胎滑	自癒名
攻也結	者不可	上胎滑	反靜舌	熱其人	往來寒	陽證不	藏結無	証	結死藏	此名藏	陰筋者	少腹入	旁痛引	連在臍	病脇下	証難治	者難治	結舌上	一湯	桂枝二	越婢
麻黃桂	小青龍	石膏	薑杏仁	大棗生	枝甘草	麻黃桂	大青龍	杏仁	薑麻黃	大棗生	藥甘草	桂枝芍	一湯	桂枝二	石膏	薑麻黃	大棗生	藥甘草	桂枝芍	一湯	桂枝二

証

三

太陽

下欲解	解不可	外証未	太陽病	証汗解	弱當以	解脈浮	外証未	太陽病	証則愈	桂枝湯	府却與	風池風	解先刺	湯煩不	服桂枝	太陽病	証則愈	營衛和
目瞑劇	除發煩	藥已微	主之服	麻黃湯	日不解	痛八九	熱身疼	無汗發	証主之	麻黃湯	致汗者	發汗因	浮緊不	傷寒脈	証麻黃	無汗自	發熱身	
愈經傳	不傳則	明使經	鍼足陽	作經者	若欲再	經盡也	以行其	自愈者	証自愈	自和者	液陰陽	若亡津	吐若下	發汗若	証凡病	必解二	桂	
湯主之	也抵當	在裏故	經熱	太陽隨	乃愈以	者下血	便自利	鞭滿小	少腹當	在下焦	狂以熱	其人發	不結胸	而沈微	存脈微	表証猶	六七日	
服文蛤	不渴者	飲水反	粟起欲	煩肉上	不去益	熱被却	水噤灌	反以冷	病在陽	証五苓	草湯主	茯苓甘	不渴者	散主之	者五苓	出而渴	傷寒汗	
痛足心	大便已	數而反	大便鞭	失溲足	便不得	下不得	故其汗	利者為	煩必發	証日振	胃中水	大出汗	燥反熨	太陽病	虛陽俱	小便利	甚者至	
必熱穀	頭卓然	不數及	小便當	下惡風	反嘔欲	汗欲小	從腰以	欲解也	語十下	躁入	躁入	入	而	二日反	可治	衣摸床	大便久	
																	則吐名	
																	而還腹	
																	滿微喘	
																	或不	

芍藥甘草湯	甘草乾薑湯	麻黃杏仁湯	為丸	湯三之一	抵當丸	桃仁	大黃	抵當湯	確	大黃	芒	枝	甘草	桃仁	桂	桃核承氣湯	母	枳梗	貝	白散	文蛤散	甘草	枝	生薑
-------	-------	-------	----	------	-----	----	----	-----	---	----	---	---	----	----	---	-------	---	----	---	----	-----	----	---	----

外者桂者必衄風家表証抵當散若不氣下流也火熱
枝湯主衄乃解解而不太陽病差與五証
之証枝陽氣重了了者身黃脈芩散寒太陽病以火薰
脈浮大故也
但言便証麻黃
鞭設利
之為大
逆鞭為
實汗出
而解証桂枝
太陽病
未解脈
陰陽俱
停必先
振慄汗
出而解
但陽脈
微汗出
解但陰
脈微下
之解若
欲下之

愈經傳
傷寒二
三日陽
明少陽
証不見
者為不
傳也經
傷寒一
日太陽
受之脈
若靜者
為不傳
頗欲吐
若煩躁
脈急數
者為欲
傳也經
餘藥宜
愈經傳
傷寒二
三日陽
明少陽
証不見
者為不
傳也經
傷寒一
日太陽
受之脈
若靜者
為不傳
頗欲吐
若煩躁
脈急數
者為欲
傳也經
餘藥宜

傷筋血難復也
火氣內攻焦骨
逐實血散脈中
則為煩逆追虛
可灸因火為邪
微數之脈慎不
咽噪吐血火逆吐
虛治因火而動
脈浮熱甚反灸
之此為實實以
脈浮熱甚反灸
逆火逆助
以下重痺名火
出因火而盛腰
火灸之邪無從
脈浮宜汗解用
証
名為火邪火邪
經不解必清血
不得汗必躁到
太陽病以火薰
太陽病以火薰
証
氣下流也火熱

新加湯
桂枝 甘草
草 大棗
芍藥 生薑
薑 人參
于桂枝湯
內加芍藥
生薑各一
兩人參三
兩
葛根黃連黃
芩湯
葛根 黃
連 黃芩
甘草
桂枝去芍藥
桂枝 甘草
草 生薑
大棗
桂枝去芍藥
加附子湯

太陽

宜調胃
承氣湯
証桂枝
酒客病
不可與
桂枝湯
得湯則
嘔桂枝
服桂枝
湯吐者
其後必
吐膿血
桂枝証
桂枝本
為解肌
若其人
脈浮緊
發熱汗
不出者
不可與
也
枝証

抵當丸
証抵當

火邪內
攻証
太陽病發汗後
大汗出胃中乾
躁煩不得眠欲
飲水者少少與
之令胃氣和則
愈
小便不利熱微
消渴者五苓散
主之
發汗已脈浮數
煩渴者五苓散
傷寒脈浮自汗
小便數心煩微
惡寒脚攣急反
與桂枝湯得之
便厥咽乾躁煩
吐逆者作甘草
乾薑湯與之若
厥愈足溫者更
作芍藥甘草湯
與之若胃氣不

桂枝 甘草
生薑 附
子
桂枝加厚樸
杏子湯
桂枝 芍
藥 甘草
大棗 生
薑 厚樸
杏仁
桂枝去桂加
茯苓白朮湯
芍藥 甘草
生薑 大棗
茯苓 白朮
厚樸生薑甘
草半夏人參
湯
梔子厚樸湯
梔子 厚