

金匱要略淺註方論合編

金匱要略淺註方論合編卷七

渭南嚴嶽蓮輯鐫

男式誨校補

閩長樂陳念祖修園著

成都劉彝銘覆校

山陰祝宗懷參校

黃痺病證并治第十五

寸口脈浮而緩浮則為風緩則為痺痺

者風與溼合而不去非

若疼中風

所以然者風得溼而變四肢

不疼而苦煩脾

病者色必黃脾以痰之其所痰熱以外行則肢體面目盡黃矣

此以寸口脈而言黃瘰初時之病因也

跌陽脈緊而數數則為熱胃熱則消穀緊則為寒脾

遇食即為滿滿者必生溼是胃熱而脾溼為黃瘰之病源也○尺脈浮為風

傷於腎跌陽脈緊為寒傷於脾是腎得風生熱脾得寒生溼為黃瘰之病

源也○凡風熱與寒溼相搏其氣必歸脾胃脾胃脾食穀即助

熱而眩穀氣痰不消則胃中苦濁濁氣自下流若小

則濁隨溺則濁雖下流而小便不通不外出於是陰臟被其寒而

熱流入膀胱膀胱為太陽統主身體盡黃名曰穀癰

以病雖始於風寒而實成於穀氣也

此言跌陽脈以明胃熱脾寒鬱而成癰又言腎脈

浮跌陽脈緊為腎熱脾寒亦能鬱而成癰又歸於

膀胱之不化氣以膀胱主一身之肌表不化氣則

溼熱無去路而亦成癰其病雖有各經之不同而

總以脾胃為主故以穀癰結之

額上

心之部也腎邪重而水色見於火部故

黑

腎熱上行而通於心則

微汗出

手

金匱要略卷之五 黃癰篇 渭南嚴氏彙

名勞宮屬心足心名湧泉屬腎
腎虛不能配火水火未濟則
手足中熱西主腎腎
虛則其熱

薄暮即發膀胱為腎外府腎
病則外府必急腎虛不能
小便自利

此得之房勞過度熱從腎出故
名曰女勞瘵至腹滿如水狀
脾腎不

治

此為女勞瘵而另言其證也

脾雖黃色有因於酒者酒多溼而
性陽故傷在上焦心為酒所困則
心中懊懣而熱熱

蓄不能食熱上衝
則則時時欲吐酒氣熏心而味
歸脾胃而作黃名曰酒瘵

此言酒瘵之證也

瘴病屬實者多而陽明病實者脈必脈遲其胃弱可

屬虛亦復不少數今竟化穀胃中填塞上下俱

不速食難用飽飽則不暈火發煩阻清者阻於上升

則頭眩濁者阻於小便必難此因穀氣鬱而生熱而

勢欲作穀瘴雖下之腹滿如故所以然者以脈遲為

故也此言胃虛欲作穀瘴之證也

上言心中懊懣等證酒瘴之夫病酒黃瘴固屬上焦

證猶未備也今且歷陳之夫病酒黃瘴之病而實

不止於上焦也水出高必小便不利然其有確切不

原上焦溼熱既盛其下原上焦溼熱既盛其下

黃瘴篇二 澗南巖氏彙

候 曰 心中熱 從心熱來其小便不利自不通其 足下熱 又

等於女勞瘵之 是 其為酒瘵 證也 手足中熱也

酒黃瘵者 以心中熱或有熱去無熱則靖則言

了了 然亦有心中無熱 腸滿 為欲吐之 又 鼻燥則知其為

陽明證無疑夫腹滿宜下欲吐宜越因勢而利導之法也今既腹滿而且欲吐則可下而亦可吐必須審

其脈浮者 為邪近上而 先吐之 沉弦者為邪近下而 先下之 亦

乎臨證而消息也

上言無熱吐下 酒瘵心中熱 而且 欲吐 之意者 乘 機吐之

尚未可定也若

則愈

上言可下為無熱酒瘰而心中熱病下之則傷其下

而腹滿者言也若酒瘰在上而誤下之其陽明之

邪乘下之虛從支別入久久為黑瘰乙癸同源目青

少陰積漸而腎傷故

腎病而面黑然雖曰黑瘰而其心中熱氣如噉蒜齏狀

此於變證中露出酒瘰真面目也腎虛則陰火熬血而為瘀血瘀於裏則大便正黑榮於

則皮膚爪之不仁此絕類女勞瘰何以知其為酒瘰也然酒脈必浮此雖因下而弱要

辨其脈浮中帶弱色雖黑黑中仍帶微黃故知之

此四節言酒瘰之相因為病以補二條懊懣等證

所未備也

師曰病黃瘴

溼熱也溼淫於內則煩喘胸滿熱淫於內則發熱口燥今

發熱煩渴

胸滿口燥者以病發時

不用汗解之正法而以

火劫逼

其汗以熱

攻

兩熱相搏

所得然

使熱不與溼合必不作黃凡

黃家所得從溼得

之

原不可以一下盡其法也須審其

一身盡發熱而黃

而肚熱

視一身之

熱為尤甚是因火劫而令火

熱盡

在於裏

當下之

此槩言黃瘴有因誤火而得之證又辨其溼熱相

合者為瘴病之常獨熱在裏者為瘴病之變使人

分別論治也

瘰癧病將成未成必先見有一脈沉裏熱渴欲飲水飲

多小便不利者水無去路則鬱於裏而為皆可卜發

黃○脾之部位在腹脾之脈絡連舌本散舌下若腹滿舌痿黃是脾有溼而不行矣

又胃不和則躁不得睡是胃有熱而不和屬黃家

此二節言黃之將成欲人圖之於早不俟其既成

而藥之意含言外

黃者土之色也土無定位寄王於四季之末各十八日故黃瘰之病當以十八日

黃瘰篇渭南嚴氏彙

為期

蓋謂十八日脾氣至而虛者當復即實者亦當通也

治之

者當使其

十日以

上即瘥

不踰乎十八日之外乃妙也若踰十八日不瘥而

反劇為

土氣不能應期而王

難治

此言黃瘰之愈有定期欲醫者期前而速治也○

按沈目南云此取陽病陰和陰病陽和為大綱也

十八乃三六陰數之期也十日二五陽土之數也

黃瘰乃溼熱鬱蒸陽邪亢極脾陰大衰故治之須

候一六二六三六陰氣來復制火之期而為定期

若至十日以上土陰氣復則當瘥而反劇者乃脾陽亢極陰氣化滅故為難治此雖非正解亦互相

發明

痺病是鬱熱外蒸之象

痺而渴者

內熱更甚內外交病

其痺難治痺而不

渴者

熱從外宣內之正氣自運

其痺可治發於陰部

裏為陰裏氣之逆

其

人必嘔

發於

陽部

表為陽表邪之盛

其人振寒而發熱也

此以渴不渴別痺之難治可治以嘔與寒熱辨黃

之在表在裏也

今試為癰

病出其方

穀痺之病

其初多病寒熱其

寒熱作時不食寒熱止時

即或時食

食即熱上衝而

頭眩

內滯塞而心胸不安

溼癢熱久久身鬱不解面

發黃為穀痺

以茵陳蒿湯主之

此為穀痺證而出其方也

徐忠可云前第一段論穀痺不言寒熱而有小便

不通第二段論穀痺不言心胸不安而有小便必

難此獨不言及小便蓋穀痺證亦有微甚不同前

所云小便不通此勢之甚急者也所云陽明病脈

遲者小便必難乃既見陽明證而因脈遲挾虛以致不運此表病中之間有者也若此云寒熱則非二三日之病矣不食食卽頭眩則雖眩而食未嘗斷可知矣故曰久久發黃見遲之又久乃相因而爲病其勢漸而緩則小便亦未至不通耳然觀方下註云一宿腹減此亦必小便不快而腹微脹可知但不必專責之耳穀痺三證止出一方蓋陽明病一至發黃則久暫皆宜開鬱解熱故此方實爲

主方若陰黃則後人以附子合茵陳乃此方之變也按心胸不安與酒痺之心中懊懜亦不同彼因心中熱至有無可奈何之象此言不安僅微煩也即陽明脈遲證所謂發煩頭眩耳

茵陳蒿湯方

茵陳蒿 六兩 梔子 十四枚 大黃 二兩

右三味以水一斗先煮茵陳減六升內二味煮取三升去滓分溫三服小便當利尿如皂角汁狀色

正赤一宿腹減黃從小便去也

男元犀

按太陰溼土也陽明燥土也經云穀入於

胃游溢精氣其上輸下轉藉脾氣之能也穀瘴者
食穀入胃脾氣不輸溼與熱併久則薰蒸成黃黃
成則榮衛流行之機爲之阻而不利故有寒熱不
食之病經云食入於陰長氣於陽食卽頭眩心胸
不安者穀入於胃挾濁氣以上干也主以茵陳蒿
湯者茵陳稟冬令寒水之氣寒能勝熱佐以梔子

味苦瀉火色黃入胃挾大黃以滌胃腸之鬱熱使

之屈曲下行則穀瘴之邪悉從二便而解矣

凡發熱而不惡寒為陽明病若黃家當申酉之日晡所應其發熱而

反惡寒此非陽明熱證為女勞得之以女勞之病在腎腎

血注於膀胱酉時氣血急膀胱既少腹亦滿

注於腎也腎為熱逼則膀胱急則

一身雖盡黃而額上獨黑一身雖足下尤熱因

淫腎邪遍於周身不獨額上而身上俱然其中猶有可疑者腹

其腹脹非水如水狀大便必變黑而時澹此女勞之