

YI SHI ZI GE KAO SHI

最新版

医师资格考试

中西医结合执业助理医师资格考试

考前冲刺

《中西医结合执业助理医师资格考试考前冲刺》编委会 编

全国百佳图书出版单位
中国中医药出版社

中西医结合执业助理医师资格考试

考前冲刺

《中西医结合执业助理医师资格考试考前冲刺》编委会 编

中国中医药出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中西医结合执业助理医师资格考试考前冲刺/《中西医结合执业助理医师资格考试考前冲刺》编委会编. —北京：中国中医药出版社，2010. 7

ISBN 978 - 7 - 5132 - 0005 - 9

I. ①中… II. ①中… III. ①中西医结合 - 医师 - 资格考核 - 习题

IV. ①R2 - 031

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 095330 号

中国中医药出版社出版
北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层
邮政编码 100013
传真 010 64405750
北京泰锐印刷有限公司印刷
各地新华书店经销

*
开本 787 × 1092 1/16 印张 11.25 字数 279 千字

2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5132 - 0005 - 9

*

定价 29.00 元

网址 www.cptcm.com

如有印装质量问题请与本社出版部调换

版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

读者服务部电话 010 64065415 010 84042153

书店网址 csln.net/qksd/

中西医结合执业医师资格考试考试说明

一、医师资格考试简介

医师资格考试的性质是行业准入考试，由国家医学考试中心负责进行，是评价申请医师资格者是否具备从事医师工作所必需的专业知识与技能的考试。医师资格考试分实践技能考试和医学综合笔试两部分。

考试分为两级四类，即执业医师和执业助理医师两级；每级分为临床、中医、口腔、公共卫生四类。中医类包括中医、民族医和中西医结合，其中民族医又含蒙医、藏医和维医三类，其他民族医医师暂不开考。到目前为止，我国医师资格考试共有 24 种类别。

实践技能考试采用多站测试的方式，考区设有实践技能考试基地，根据考试内容设置若干考站，考生依次通过考站接受实践技能的测试。每位考生必须在同一考试基地的考站进行测试。

医师资格考试医学综合笔试于 9 月中旬举行，具体时间以卫生部医师资格考试委员会公告时间为准。执业医师考试时间为 2 天，分 4 个单元；执业助理医师考试时间为 1 天，分 2 个单元，每单元均为两个半小时。

医学综合笔试全部采用选择题形式。采用 A 型和 B 型题，共有 A1、A2、A3、A4、B1 五种题型。中西医结合采用 A1、A2 和 B1 型题。医师资格考试总题量约为 600 题，助理医师资格考试总题量为 300 题。

二、中西医结合执业医师资格考试题型示例

(一) A1 型题（单句型最佳选择题）

题型说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 阴阳的相互转化是

- | | | |
|--------|---------|--------|
| A. 绝对的 | B. 有条件的 | C. 必然的 |
| D. 偶然的 | E. 量变 | |

答案：B

(二) A2 型题（病例摘要型最佳选择题）

题型说明

每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。从中选择一个最佳答案。

1. 患儿，10 个月。近半个月不思乳食，脘腹胀满，疼痛拒按，呕吐酸馊，烦躁哭吵，大便较干，臭秽，舌淡苔白腻。其诊断是

- | | | |
|-------|-------|-------|
| A. 厥食 | B. 腹痛 | C. 痞证 |
|-------|-------|-------|

- D. 积滞 E. 呕吐

答案：D

(三) B1型题（标准配伍题）

题型说明

提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。从中选择一个与问题关系最密切的答案，某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。（1~2共用备选答案）

- A. 气能生血 B. 气能摄血 C. 气能行血
D. 血能载气 E. 血能生气

1. 治疗血虚，常配伍补气药，其根据是

答案：A

2. 气随血脱的生理基础是

答案：D

三、医师资格考试报名条件

根据《中华人民共和国执业医师法》及有关规定具有下列条件之一的，可以参加医师资格考试：

（一）具有高等学校医学专业本科以上学历，在执业医师指导下，在医疗、预防、保健机构中试用期满一年的。

（二）取得执业助理医师执业证书后，具有高等学校医学专科学历，在医疗、预防、保健机构中工作满二年；具有中等专业学校医学专业学历，在医疗、预防、保健机构中工作满五年的。

（三）具有高等学校医学专科学历或者中等专业学校医学专业学历，在执业医师指导下，在医疗、预防、保健机构中试用期满一年的，可以参加执业助理医师资格考试。

以师承方式学习传统医学满三年或者经多年实践医术确有专长的，经县级以上人民政府卫生行政部门确定的传统医学专业组织或者医疗、预防、保健机构考核合格并推荐，可以参加执业医师资格或者执业助理医师资格考试。考试的内容和办法由国务院卫生行政部门另行制定。

（四）符合《医师资格考试报名资格规定（2006）》。

注：台湾、香港、澳门居民报考医师资格考试，请参阅《关于取得内地医学专业学历的台湾香港澳门居民申请参加国家医师资格考试有关问题的通知》。

答 题 须 知

本书由六套仿真模拟试卷组成，适合考生在最后复习阶段进行冲刺训练及自我测试。全书对考点进行了缜密的分析和梳理，在模拟卷中，考生可以通过仿真化试题的自我测试来检验自己的复习效果，从而对自己的复习情况有一个比较直观的了解。

中西医结合执业医师助理资格考试（医学综合笔试部分）答题须知：

1. 考生答题前应先检查试卷封面标示的考试类别和每页页角所标出的考试类别是否与本人准考证上的报考类别一致。
2. 在开始答题前，请再次核对自己在答题卡上填写的姓名、准考证号、报考类别、考试单元等是否完整无误。
3. 在开始答题前，请考生检查试卷有无缺损、重印、错印，发现上述情况应立即报告监考员。
4. 答题卡上的考生信息和答案的所有信息点，必须使用 2B 铅笔按答题卡上“注意事项”栏中的要求填涂，如需要作修改，应用橡皮将原涂黑的地方擦净。
5. 答题卡上“考场记录”一栏由监考员负责填写，考生不得自行填写。
6. 答题卡将采用计算机阅卷，请考生注意保持答题卡平整、干净。
7. 考试开始后半小时内，考生不得交卷离开考场。
8. 考试结束时，请把试卷和答题卡分别翻放在桌上，不得带出考场。
9. 监考员验收试卷和答题卡后，经监考员允许，考生方可离开考场。
10. 考生如违反监考员宣读的“考场指令”和本“答题须知”，其一切后果由本人承担。

目 录

考前冲刺一	1
考前冲刺二	30
考前冲刺三	59
考前冲刺四	87
考前冲刺五	115
考前冲刺六	144

考前冲刺一

第一单元

A1型题（1~87题）

答题说明：

每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 中医学整体观念在诊断学上的具体体现为

- A. 四诊合参
- B. 审察内外
- C. 辨证
- D. 四诊合参与辨证
- E. 四诊合参、审察内外与辨证

2. 构成人体的基本物质是

- A. 天气
- B. 清气
- C. 阳气
- D. 水精
- E. 精气

3. “重阴必阳”所说明的阴阳关系是

- A. 阴阳交感
- B. 阴阳对立
- C. 阴阳互根
- D. 阴阳消长
- E. 阴阳转化

4. “无阴则阳无以化”说明的阴阳关系是

- A. 阴阳交感
- B. 阴阳对立
- C. 阴阳互根
- D. 阴阳消长
- E. 阴阳转化

5. 血虚病变多见的脏腑是

- A. 心肺
- B. 心脾
- C. 心肾
- D. 心肝
- E. 肝肾

6. 具有“化物”功能的腑是

- A. 胆
- B. 胃
- C. 小肠
- D. 大肠
- E. 膀胱

7. 下列选项属病变虚实变化内涵的是

- A. 邪气亢盛与否
- B. 正气旺盛与否
- C. 脏腑功能的盛衰
- D. 正邪力量的盛衰
- E. 气血旺盛与否

8. 疼痛兼有空虚感是因为

- A. 气机阻滞
- B. 湿邪困阻气机
- C. 风邪偏盛
- D. 气血阴精不足
- E. 瘀血阻滞

9. 舌红绛裂纹，苔焦黄干燥，属

- A. 脾虚湿热
B. 热极津伤
C. 食积胃肠
D. 瘀血内阻
E. 气分湿热
10. 咳声短促，连续不断，咳后有鸡鸣样回声称为
A. 顿咳
B. 肺痨
C. 肺痈
D. 肺痿
E. 白喉
11. 舌苔脱落处舌面不光滑，仍有新生苔质颗粒者称为
A. 花剥苔
B. 地图舌
C. 镜面舌
D. 光滑舌
E. 类剥苔
12. 瘀血内阻，气化不利，津液不能上承，可见到的是
A. 口干但不欲饮
B. 口渴饮水不多
C. 口渴喜热饮
D. 口干但欲漱水不欲咽
E. 口渴喜冷饮
13. 风邪袭表证候的脉象特点是
A. 浮滑
B. 浮紧
C. 浮数
D. 浮弦
E. 浮缓
14. 喘气频作响亮，喘后脘腹胀减，发作与情志相关，其病机是
A. 宿食内停
B. 胃阳亏虚
C. 寒邪犯胃
D. 肝气犯胃
E. 胃虚气逆
15. 以下各项，不是真寒假热证临床表现的是
A. 自觉发热反欲盖衣被
B. 面色浮红如妆
C. 口渴而喜饮
D. 咽痛而不红肿
E. 脉浮大按之无力
16. 出血反复不止，紫暗有块，大便黑如柏油，其证候是
A. 气滞证
B. 血寒证
C. 血热证
D. 血虚证
E. 血瘀证
17. 黄芪与茯苓配伍，茯苓能增强黄芪的补气利水作用，这种配伍关系是
A. 相须
B. 相使
C. 相反
D. 相恶
E. 相畏
18. 上以清肺，中以凉胃，下泻肾火的药物是
A. 黄柏
B. 桔子
C. 知母
D. 地骨皮
E. 生地黄
19. 既能活血调经，祛瘀止痛，又能凉血消痈，除烦安神的药物是
A. 丹参
B. 郁金
C. 牛膝
D. 红花
E. 桃仁
20. 既能消食和胃，又能发散风寒的药物是
A. 紫苏
B. 藿香

- C. 山楂
D. 神曲
E. 陈皮
21. 既能祛风解表，又能胜湿，止痛，止痉的药物是
 A. 荆芥
B. 防风
C. 香薷
D. 紫苏
E. 桂枝
22. 湿热所致的腹泻、痢疾，胃热所致的呕吐均可选用的药物是
 A. 黄芩
B. 黄连
C. 黄柏
D. 大黄
E. 龙胆
23. 理中丸和小建中汤两方组成中均含有
的药物是
 A. 附子
B. 桂枝
C. 生姜
D. 人参
E. 炙甘草
24. 由石膏、熟地、麦冬、知母、牛膝组成的方剂是
 A. 玉女煎
B. 泻白散
C. 白虎汤
D. 清胃散
E. 济川煎
25. 治疗五更泄泻的首选方剂是
 A. 吴茱萸汤
B. 理中丸
C. 真人养脏汤
D. 四神丸
E. 金匮肾气丸
26. 玉屏风散重用黄芪大补肺脾之气，
意在
 A. 实卫固表
B. 通行血脉
C. 化生营血
D. 行水消肿
E. 生肌敛疮
27. 苏子降气汤的功用是
 A. 温肺散寒，降气平喘
B. 祛痰散结，行气消痞
C. 通阳散结，散寒止痛
D. 降气平喘，祛痰止咳
E. 通阳散寒，祛痰下气
28. 大黄牡丹汤与桃核承气汤两方组成中
均含有的药物是
 A. 大黄、桃仁、甘草
B. 大黄、芒硝、甘草
C. 大黄、赤芍、甘草
D. 大黄、芒硝、桃仁
E. 大黄、芒硝、赤芍
29. 主动脉瓣关闭不全最不可能出现的体
征是
 A. 毛细血管搏动征
B. 主动脉瓣区第二心音亢进
C. 主动脉瓣第二听诊区叹气样舒张
期杂音
D. 枪击音和杜氏双重杂音
E. 心浊音界呈靴形
30. 血肌酐测定是反映
 A. 近端肾小管排泌功能
B. 远端肾小管排泌功能
C. 肾小球滤过功能
D. 肾脏浓缩稀释功能
E. 肾血流量
31. 许多疾病均可引起白细胞明显升高，
但除了
 A. 糖尿病酮症酸中毒
B. 异位妊娠破裂后
C. 系统性红斑狼疮
D. 肺炎
E. 肾脏移植出现排异反应

32. 甲状腺功能亢进检查时特征性的改变是
- A. 甲状腺质地较柔
 - B. 甲状腺可随吞咽上下移动
 - C. 甲状腺出现结节
 - D. 甲状腺有血管杂音
 - E. 甲状腺对称性肿大
33. 风心病二尖瓣狭窄时，心脏检查不可能发现的体征为
- A. 心尖区全收缩期杂音，向左腋下传导
 - B. 心尖区第一心音亢进
 - C. 肺动脉瓣区第二心音分裂
 - D. 肺动脉瓣区第二心音亢进
 - E. 心脏浊音界似梨形
34. 肝脏进行性肿大，质地坚硬如前额，多见于
- A. 肝炎
 - B. 肝脓肿
 - C. 肝癌
 - D. 脂肪肝
 - E. 血吸虫病
35. 下列哪个疾病胸水为漏出液
- A. 结核性胸膜炎
 - B. 胸腔
 - C. 细菌性胸膜炎
 - D. 心力衰竭
 - E. 胸膜肿瘤
36. 以下不引起颈静脉怒张的疾病是
- A. 左心功能不全
 - B. 右心功能不全
 - C. 缩窄性心包炎
 - D. 上腔静脉梗阻
 - E. 心包积液
37. 支气管呼吸音分布于
- A. 左锁骨上窝
 - B. 右锁骨上窝
 - C. 胸骨角周围
 - D. 胸骨上窝
38. 肺部叩诊实音不会出现于
- A. 肺不张
 - B. 肺空洞
 - C. 胸腔积液
 - D. 胸膜肥厚
 - E. 胸壁水肿
39. 尿中出现大量管型，说明病变部位在
- A. 肾实质
 - B. 输尿管
 - C. 前列腺
 - D. 膀胱
 - E. 尿道
40. 胸骨左缘第2肋间及其附近区域听到连续性杂音见于
- A. 二尖瓣狭窄
 - B. 二尖瓣关闭不全
 - C. 动脉导管未闭
 - D. 主动脉瓣狭窄
 - E. 主动脉瓣关闭不全
41. 剑突下出现心脏搏动，吸气时加强，提示
- A. 左心房扩大
 - B. 右心房扩大
 - C. 左心室扩大
 - D. 右心室扩大
 - E. 脉压增大
42. 一度房室传导阻滞时的心电图改变为
- A. QRS 增宽 >0.12 秒
 - B. P-R 间期 >0.12 秒
 - C. P-R 间期 <0.21 秒
 - D. P-R 间期 ≥ 0.21 秒
 - E. P-R 间期逐渐延长
43. X线显示食管受压向后移位表示
- A. 左心室增大
 - B. 右心室增大
 - C. 左心房增大
 - D. 右心房增大
 - E. 主动脉增宽

44. 重症肌无力病人应选用的药物是
 A. 毒扁豆碱
 B. 氯解磷定
 C. 新斯的明
 D. 阿托品
 E. 毛果芸香碱
45. 治疗青光眼应使用的药物是
 A. 毛果芸香碱
 B. 新斯的明
 C. 山梨醇
 D. 尿素
 E. 甘露醇
46. 阿托品对眼睛的作用是
 A. 散瞳、降低眼内压和调节麻痹
 B. 散瞳、升高眼内压和调节麻痹
 C. 散瞳、升高眼内压和调节痉挛
 D. 缩瞳、降低眼内压和调节痉挛
 E. 缩瞳、升高眼内压和调节痉挛
47. 下列有关氯丙嗪的药理作用，错误的是
 A. 抗胆碱作用
 B. 降压
 C. 降低体温
 D. 降眼内压
 E. 口干
48. 糖皮质激素诱发和加重感染的主要原因为
 A. 激素用量不足
 B. 病人对激素不敏感
 C. 激素能促使病原微生物生成繁殖
 D. 激素降低了机体对病原微生物的抵抗力
 E. 细菌对激素耐药
49. 下列关于苯二氮草类药物作用的叙述，错误的是
 A. 长期大量应用产生依赖性
 B. 有抗惊厥作用
 C. 有镇静催眠作用
 D. 大量使用产生锥体外系症状
- E. 中枢性骨骼肌松弛作用
50. 下列关于扑热息痛的叙述，错误的是
 A. 抗炎抗风湿作用较弱
 B. 有较强的解热镇痛作用
 C. 主要用于感冒发热
 D. 长期应用可致肾毒性
 E. 不良反应少，但能造成肝脏损害
51. 丙米嗪（米帕明）的临床应用是
 A. 精神分裂症
 B. 抑郁症
 C. 尿崩症
 D. 少尿症
 E. 躁狂症
52. 哌替啶不宜用于慢性钝痛的主要原因是
 A. 维持时间短
 B. 镇痛效果弱于吗啡
 C. 抑制呼吸
 D. 有成瘾性
 E. 引起低血压
53. 下列关于第三代头孢菌素的特点，错误的是
 A. 对肾脏基本无毒性
 B. 对各种 β -内酰胺酶高度稳定
 C. 对 G^- 菌的作用比第一、二代强
 D. 对铜绿假单胞菌的作用很强
 E. 对 G^+ 菌的作用也比第一、二代强
54. H_1 受体阻断药的临床应用是
 A. 皮肤黏膜过敏症状
 B. 支气管哮喘
 C. 过敏性休克
 D. 过敏性紫癜
 E. 血清病高热
55. 下列关于氢氯噻嗪的不良反应，错误的是
 A. 低镁血症
 B. 高尿酸血症
 C. 高糖血症
 D. 高脂血症

- E. 高钾血症
56. 构成感染过程三因素是指
- A. 传染源、传播途径、易感人群
 - B. 病原体、传播途径、易感人群
 - C. 病原体、社会因素、环境因素
 - D. 人体、病原体、外环境
 - E. 人体、病原体、社会因素
57. 熟悉传染病潜伏期的目的是为了
- A. 确定诊断
 - B. 确定检疫期
 - C. 预测流行趋势
 - D. 追踪传染来源
 - E. 有助于指导治疗
58. 急性病毒性肝炎的黄疸最早出现于
- A. 手掌脚掌皮肤
 - B. 四肢皮肤
 - C. 口腔黏膜
 - D. 面部皮肤
 - E. 巩膜
59. 有明显出血倾向的肝炎是
- A. 急性黄疸型肝炎
 - B. 急性无黄疸型肝炎
 - C. 淤胆型肝炎
 - D. 重型肝炎
 - E. 慢性肝炎
60. 有关流行性出血热的描述正确的是
- A. 病人为主要传染源
 - B. 热退后症状减轻
 - C. 血小板常减少
 - D. 外周血白细胞常减少
 - E. 临幊上都有五期经过
61. 有关典型艾滋病期的描述，下列哪项是错误的
- A. 出现各种致命性机会感染
 - B. 卡氏肺囊虫肺炎多见
 - C. 播散性分枝杆菌感染少见
 - D. 出现各种恶性肿瘤，如卡波济肉瘤等
 - E. 预后极差
62. 对于疑似 SARS 者正确的处理方法是
- A. 按正常诊疗程序就医
 - B. 安排家庭医学隔离观察，由 CDC 随访
 - C. 收入双人或多人观察室隔离观察
 - D. 收入单人观察室隔离观察
 - E. 安排家庭医学隔离观察，并随诊
63. 有关 SARS 的传播途径正确的是
- A. 患者的粪便一般没有传染性
 - B. 间接接触不易传播
 - C. 呼吸道症状显著的患者传染性低
 - D. 隐性感染者也是重要的传染源
 - E. 近距离呼吸道飞沫传播是最重要的传播途径
64. 普通型流脑的典型临床表现是
- A. 低热、头痛、皮肤黏膜瘀点
 - B. 高热、循环衰竭、皮肤黏膜大片瘀斑
 - C. 高热、皮肤黏膜瘀斑、昏迷、呼吸衰竭
 - D. 高热、头痛、皮肤黏膜瘀斑、脑膜刺激征
 - E. 间歇性发热、反复皮肤瘀点、血培养可阳性
65. 与流脑患者密切接触后的重要预防措施是
- A. 菌苗预防注射
 - B. 隔离观察
 - C. 注射青霉素
 - D. 口服磺胺药
 - E. 开窗通风
66. 霍乱病人静脉补液，下列哪项是不适宜的
- A. 早期，快速，足量
 - B. 先盐后糖
 - C. 先快后慢
 - D. 积极补钾
 - E. 及时补碱
67. 有关标准预防下列哪项是错误的

- A. 要防止血源性疾病的传播，也要防止非血源性疾病的传播
 B. 强调双向防护
 C. 所有的患者均被视为具有潜在感染者
 D. 要根据疾病的主要传播途径，采取相应的隔离措施
 E. 脱去手套后可以不洗手
68. 下列哪组经脉没有按照气血循行流注顺序排列
 A. 胆经、肝经、肺经
 B. 心经、小肠经、肾经
 C. 大肠经、胃经、脾经
 D. 肾经、心包经、三焦经
 E. 三焦经、胆经、肝经
69. 以下哪项不属于腧穴的近治作用
 A. 睛明治疗眼疾
 B. 中脘治疗胃痛
 C. 膝眼治疗膝痛
 D. 内关治疗心痛
 E. 肾俞治疗腰痛
70. 治疗咽喉肿痛的首选穴是
 A. 尺泽
 B. 列缺
 C. 合谷
 D. 太渊
 E. 少商
71. 在胸部，距前正中线4寸的经脉是
 A. 手太阴肺经
 B. 足少阴肾经
 C. 足阳明胃经
 D. 足太阴脾经
 E. 手厥阴心包经
72. 善治多种神志疾患的腧穴是
 A. 太溪
 B. 神门
 C. 悬钟
 D. 后溪
 E. 大椎
73. 下列哪组腧穴被称为“四关”穴
 A. 内关、外关
 B. 合谷、太冲
 C. 曲池、足三里
 D. 外关、阳陵泉
 E. 尺泽、委中
74. 下列哪项不是阳陵泉的主治病证
 A. 黄疸、胁痛
 B. 腹泻、水肿
 C. 呕吐、吞酸
 D. 小儿惊风
 E. 膝肿痛
75. 手太阴肺经的起始穴是
 A. 少商
 B. 中府
 C. 商阳
 D. 迎香
 E. 肺俞
76. 医学道德是一种职业道德，它不是
 A. 只存在于从事医生职业活动的人们中间
 B. 在内容上具有稳定性、连续性
 C. 在形式上比较具体、生动
 D. 医务人员容易理解、接受
 E. 人道主义精神的集中体现
77. 作为医学伦理学基本范畴的良心指的是
 A. 医学关系中的主体在道义上应享有的权力和利益
 B. 医学关系中的主体在道义上应履行的职责和使命
 C. 医学关系中的主体在道义上对周围人、事以及自身的内心体验和感受
 D. 医学关系中的主体在对自己应尽义务的自我认知和评价
 E. 医学关系中的主体在表现出行为前的周密思考和行为中的谨慎负责

78. 不属于我国社会主义医德基本原则内容的是
- A. 中西医并重
 - B. 防病治病
 - C. 救死扶伤
 - D. 实行社会主义人道主义
 - E. 全心全意为人民身心健康服务
79. 医学修养中所指的“慎独”是出自
- A. 《大医精诚》
 - B. 《礼记·中庸》
 - C. 《黄帝内经》
 - D. 《物理论》
 - E. 《本草纲目》
80. 人体试验根据道德价值和原则确定的类型中，不包括
- A. 有得无失
 - B. 得失不明
 - C. 有失无得
 - D. 得不偿失
 - E. 得失相当
81. 医德评价的标准是
- A. 疗效标准、社会标准、科学标准
 - B. 科学标准、实践标准、疗效标准
 - C. 疗效标准、医学标准、科学标准
 - D. 疗效标准、行为标准、科学标准
 - E. 经济标准、社会标准、科学标准
82. 近年来，全国医疗卫生行业作风建设的成果得到体现的情况是
- A. 医疗服务质量
 - B. 抗击“非典”的斗争
 - C. 防病治病效果
 - D. 控制医药费用
 - E. 改善服务态度
83. 县级以上人民政府卫生行政部门，具体负责组织突发公共卫生事件的
- A. 社会治安维护工作
 - B. 正常的社会经济运行
 - C. 调查、控制和医疗救治工作
 - D. 应急处理指挥部
- E. 统一领导工作
84. 药品作为特殊商品，其特殊性之一是具有两重性，而两重性主要体现在
- A. 药品质量
 - B. 用药后果
 - C. 诊断、治疗
 - D. 功能主治
 - E. 针对性
85. 第十届全国人大常委会第十一次会议通过修订的《中华人民共和国传染病防治法》正式施行日期是
- A. 2004年8月28日
 - B. 2004年12月1日
 - C. 2005年1月1日
 - D. 2005年10月1日
 - E. 1989年2月28日
86. 《医疗事故处理条例》将医疗事故分为四级，它们是根据
- A. 患者病情严重程度
 - B. 患者患病的病种情况
 - C. 医疗事故的定性
 - D. 医疗事故的责任
 - E. 对患者人身造成的损害程度
87. 我国广大卫生医务人员在工作岗位上应坚持放在第一位的是
- A. 医疗服务的经济效益
 - B. 经济效益与社会效益
 - C. 人民群众健康和生命安全
 - D. 社区卫生预防
 - E. 社区卫生服务

A2型题（88~90题）

答题说明：

每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

88. 某男，40岁。恶寒发热2天，恶寒重，发热轻，肢体酸楚，苔薄白，脉

- 浮紧。取大椎穴宜用哪种刺灸法
 A. 刺络出血
 B. 捻转补法
 C. 提插补法
 D. 温灸大椎
 E. 毫针平补平泻
89. 某女，24岁。经血不止15天，下血量多，色红，气味臭秽，口干喜饮，舌红苔黄，脉滑数。治疗取穴是
 A. 关元、公孙、三阴交、行间、阴陵泉
 B. 关元、公孙、足三里、隐白、太冲
 C. 关元、公孙、三阴交、隐白、血海
 D. 关元、公孙、足三里、隐白、内庭
 E. 气海、三阴交、足三里、然谷、太溪
90. 某女，53岁。2小时前突然发现右半身麻木，言语不利。现神志清，头晕目眩，苔白腻，脉弦滑。其诊断是
 A. 中经络、风痰阻络证
 B. 中经络、肝阳暴亢证
 C. 中经络、阴虚风动证
 D. 中脏腑、气虚血瘀证
 E. 中脏腑、阴虚风动证

B1型题（91~150题）

答题说明：

两道试题共用A、B、C、D、E五个备选答案，备选答案在上，题干在下。每题请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(91~92题共用备选答案)

A. 肝

- B. 心
 C. 脾
 D. 肺
 E. 肾

91. 面青，嗜酸，脉弦，其病位多在
 92. 面赤，口苦，脉数，其病位多在

(93~94题共用备选答案)

- A. 阴胜则寒
 B. 阴损及阳
 C. 阳虚则寒
 D. 阴盛格阳
 E. 阳盛格阴

93. 邪热内盛，逼阴于外，易致
 94. 阴寒内盛，逼阳于外，易致

(95~96题共用备选答案)

- A. 腐苔
 B. 黄腻苔
 C. 黄糙苔
 D. 积粉苔
 E. 滑苔

95. 水湿内停其舌苔是
 96. 湿热内阻其舌苔是

(97~98题共用备选答案)

- A. 青色、赤色
 B. 青色、黑色
 C. 白色、黑色
 D. 赤色、黑色
 E. 赤色、白色

97. 主血瘀证的面色有
 98. 主寒证的面色有

(99~100题共用备选答案)

- A. 短气
 B. 夺气
 C. 少气
 D. 喘

- E. 哮
99. 自觉呼吸短促而不相接续，气短不足以息的是
100. 呼吸急促困难，喉中痰鸣的是
- (101 ~ 102 题共用备选答案)
- A. 脉迟而时有一止，止无定数
 - B. 脉数而时有一止，止无定数
 - C. 脉来时有一止，止有定数
 - D. 脉短如豆，滑数有力
 - E. 脉来绷急，状如绳索
101. 结脉的脉象特征是
102. 动脉的脉象特征是
- (103 ~ 104 题共用备选答案)
- A. 动则汗出
 - B. 蒸蒸汗出
 - C. 半身汗出
 - D. 汗出如油
 - E. 睡时汗出
103. 实热证汗出特点是
104. 阴虚证汗出特点是
- (105 ~ 106 题共用备选答案)
- A. 风寒湿痹，外感风寒，喘咳
 - B. 风寒湿痹，外感风寒，胸痹
 - C. 风寒湿痹，外感风寒，鼻渊
 - D. 风寒湿痹，外感风寒，破伤风
 - E. 风寒湿痹，外感风寒，上半身疼痛
105. 白芷的主治病证是
106. 羌活的主治病证是
- (107 ~ 108 题共用备选答案)
- A. 峻下冷积，逐水退肿，祛痰利咽
 - B. 疏散风热，清肺利咽
 - C. 清热解毒，消痰利咽
 - D. 开宣肺气，祛痰利咽
 - E. 祛痰止咳，消肿利咽
107. 巴豆的功效是
108. 射干的功效是
- (109 ~ 110 题共用备选答案)
- A. 甘草、白术
 - B. 白术、防风
 - C. 防风、当归
 - D. 当归、桂枝
 - E. 桂枝、茯苓
109. 防己黄芪汤的组成药物中含有
110. 独活寄生汤的组成药物中含有
- (111 ~ 112 题共用备选答案)
- A. 2:1
 - B. 3:1
 - C. 5:1
 - D. 6:1
 - E. 7:1
111. 麦门冬汤原方中麦冬与半夏的比例是
112. 竹叶石膏汤原方中麦冬与半夏的比例是
- (113 ~ 114 题共用备选答案)
- A. 清热解毒，开窍醒神
 - B. 清热解毒，开窍安神
 - C. 安神定惊，化痰开窍
 - D. 清热解毒，化浊开窍
 - E. 辟秽解毒，化痰开窍
113. 安宫牛黄丸的功用是
114. 至宝丹的功用是
- (115 ~ 116 题共用备选答案)
- A. 窦性心动过速
 - B. 窦性心动过缓
 - C. 非阵发性房性心动过速
 - D. 室性逸搏心律
 - E. 正常窦性心律
115. 心率 100 次/分，律规整，最大可