

王氏醫案繹註

中冊

王氏醫案繹注卷四

海寧王士雄孟英醫案

江都石念祖蘭孫繹注

武進謝觀利恒校訂

筋不寒查加查所滯邪麴皮枯膝黃
抽加過麴白麴必阻下杵二芩當爲
痛海劑辛頭則至過行次錢一臍溼
肝蛇辛溫翁過去故外入西錢鞭體
主則溫佐息劑查當泄二砂五痛化
周熱失苓風傷麴脾腹錢仁分爲熱
身邪其連瀉陰砂鞭痛濟研酒疾手
之將佐揀熱加仁痛減銀沖炒食足
筋耗使苦赤白加得熱花和川結冷
此肺之寒芍頭白迭邪一服連於過
爲胃權以入翁頭次傷兩六八腹肘
肝之寒宣血赤翁苦陰草分分中膝
胃陰涼泄行芍赤辛氣決玄黑之此
之應不斯瘀海芍宣不明胡柵明證
陰加能時數蛇海泄隨三索皮證必誤
不酒瀝中脈者蛇邪津錢次三小誤
足炒穢焦爲病邪濁液手入錢洩補
去白反胃陰本濁漸流足一川瀉助
丹頭行腕虛赤漸減行漸錢棟少邪熱
皮翁冰不挾病減則則溫五核熱
滑一伏通熱熱熱熱邪爲分杵傷傷
芍錢胸若前邪邪邪不邪生先肺肺
恐亦中遷因已已仍盡減山三胃氣挾脈
涼芍此用邪得得返去氣查錢之氣陰滑
泄三際海濁宣宜還苦通杵西陰不虛數
傷錢苦蛇盤達達於退腳次滑肺外面而
肿淡退顧踞恐於氣而背入石胃達赤沈
加海而陰腹其氣分渴紅一包氣下爲爲
雞蛇渴則中耗分此熱腫錢先失行熱痰
橘先熱一方傷再溫邪起五五下故傷熱
運一乘派藉血用病前疮分錢行冷肺遇
脾兩得苦砂液砂病因爲生粉酒過氣伏
宜腿宣鹹仁故仁情痰熱神丹炒肘苦兼

珠小輝令媛驟患頤腫連及脣鼻乃至口不能開舌不能出溫毒也用射干山豆根馬同氣溫現兩先枇頭錢清用短補以熱五葉尾粉營義似大上清錢刷沖丹方取促傷諸營血包藥皮大苦知肺證後溢三溫二生甘母胃其血止錢服錢地化與之清分而鮮清生八陰麥陰氣之稀竹氣赤錢則冬重方熱沫茹方芍開不柿用中雖飭三西先水致帶知參減吐錢洋八泡口洋母用氣得乾參錢沖渴參烏洋分飲柿三酒去心石梅參之即帶錢炒渣仲斛木麥熱咽十花黃鮮瓜冬未口個麥柏茅白石除渴生冬三根芍斛且心大三錢五酸柿血仲白錢生錢苦帶分氣芍酒藉鮮泄者之短二炒汁竹肝必熱似兩知一茹卽前雖促先母大三以醫減者煎四酒錢清作餘原陳錢杯絲肺腎熱案木鮮沖瓜則虛仍氣瓜石童絡不水從實三斛便三致泛氣血錢杵兩錢得治分熱烏先酒地飲時上是梅一杯骨卽誤行氣肉兩煎皮嘔用故血杵鮮去五

珠小輝令媛驟患頤腫。連及脣鼻。乃至口不能開。舌不能出。溫毒也。用射干山豆根馬勃。欒羊薄荷銀花貝母花粉杏仁竹黃爲劑。并以紫雪搽於脣內。錫類散吹入咽喉外。
將橄欖核磨塗腫處。果吐勒涎而腫漸消。
薑炒射干三錢酒炒山豆根一錢馬勃一錢蘇荷尖次入八分濟銀錢
錢五分天竺黃母杵一兩。薑花粉三錢苦杏仁一錢另用紫雪三錢搽脣內。
男子患便血。醫投溫補。血雖止而反泄瀉浮腫。延及半年。脈數舌絳。此病原溼熱溫補。翻觴陰液與牛連翹芍桑葉丹皮銀花石斛陳實冬瓜皮釐甲雞金等藥旬餘而愈。
散脈

煅瓜	先舌	番
八皮	二絲	竹
旬三	錢均	同
鐘錢	整屬	江
炎血	大陰	身
雞籠	白虛	不
金甲	芍挾	造
研一	杵熱	木
三兩	先酒	刀
錢杵	八炒	三
.	先錢枯	莫
.	冬芩	其
.	桑一	大
.	葉錢	月
.	四五	金
.	錢分	石
.	丹酒	不
.	皮炒	角
.	二川	柏
.	錢連	管
.	濟六	少
.	銀分	月
.	花黑	醫
.	一梔	口
.	兩皮	樂
.	鮮一	全
.	石錢	合
.	斛五	藥
.	杵分	不
.	先川	會
.	一棟	可
.	兩核	正
.	冬杵	更

陸厚甫室產後經旬偶發腕痛專科予溫補藥。因寒熱氣逆。自汗不寐。登園不能解。而臥則稀水自流。口渴善嘔。杳不納穀。脈弦數而滑。本屬陰虧。肝陽侮胃。誤投溫補。澀滯之劑。氣機全不下降。以致諸證蠭起。予沙參竹茹棟實延胡梔連橘貝杏斛枇杷葉爲

肅肺以和肝胃法。覆杯卽安。但少腹隱隱作痛。於前方去杏貝竹茹。加知母花粉。蔻蓉。
白芍橘核海蠣。乃解宿垢而瘳。

次行隱少葉三
入加酒痛腹隱刷錢酒包炒川
一錢炒淡海蛇此元連
錢知母三先錢索錢粗
片殼根五而泥合陽胡一
八杵錢先連覆達薄之南七
明一兩皮花之橋苦右分
冬生草絹象紅寒沈沙
切豬薺包酒一惟行息
六石打三炒錢升爲
錢杵二錢知川泄淡
烏先兩四母貝之熱
梅八淡滑三母鮮結
肉錢海石錢杵蕊伏
杵血蛇先南四白氣
先鼈一煎花錢二分
一甲兩四粉薺淡苔
兩杵動錢三萎淡苔
先則鮮錢豆黃
欲石苦三豉不
喘斛杏錢三渴
前杵泥不錢洩
方先二惡黑如
去五錢寒蘇
橘錢賴反皮木
紅薺橘惡三汁
滑炒紅熟錢同
石杔一三薺爲肝頭
杔葉錢句炒伏陽痛
葉三五爲川熱心多
蘆錢分淡連故下屬

周子朝患寒頭痛發熱。酷似傷寒。而兼心下痛。脹脰右部。沉滑苔黃。不渴。洩如蘇木
汁。先以葱豉湯加梔連杏貝蔓橘爲方。服後微汗。而不惡寒。反惡熱。雖湯飲略溫。卽氣
逆。欲死。客邪解矣。清其痰熱可也。與知母花粉。杏貝旋滑斛橘。杷杷茅根蘆根地栗海
蜇等藥。果吐膠痰甚多。惟動則欲喘。於肅上之中。佐以滋下。爲善其後而瘥。

下爲善其後而瘥。

先痛薺川熱二
兩佐汁貝得錢以服
元生拌母清苦惹爲
參蛤蘆杵解杏政肝
片殼根五而泥合陽
八杵錢先連覆達薄
明一兩皮花之橋苦右
冬生草絹象紅寒沈
切豬薺包酒一惟行息
六石打三炒錢升爲
錢杵二錢知川泄淡
烏先兩四母貝之熱
梅八淡滑三母鮮結
肉錢海石錢杵蕊伏
杵血蛇先南四白氣
先鼈一煎花錢二分
一甲兩四粉薺淡苔
兩杵動錢三萎淡苔
先則鮮錢豆黃
欲石苦三豉不
喘斛杏錢三渴
前杵泥不錢洩
方先二惡黑如
去五錢寒蘇
橘錢賴反皮木
紅薺橘惡三汁
滑炒紅熟錢同
石杔一三薺爲肝頭
杔葉錢句炒伏陽痛
葉三五爲川熱心多
蘆錢分淡連故下屬

濮樹堂室懷妊五月。患春溫口渴。善嘔壯熱。無汗。孟英視之。見其煩躁譫語。苔黃不燥。曰。痰熱阻氣也。病不傳營。血藥禁用。按其胸次。果然堅痛而大解。仍行法當。開上用小陷胸加石膏枳實杏貝茹鬱梔翹等藥。蘆菔湯煎服。惟心腹如烙。嘔止不納。改投大

劑甘寒加烏梅頻啜漸康。秋間得子亦無恙。葛汁炒川連一錢分苦杏泥二錢川貝母一兩煮湯煎杵四錢蓋竹茹次入三錢黃芩八分。此因陰虛之體津液先黑桔皮五錢元參片一錢紫石英杵先生三地黃片一錢連皮淡不翹青蕊瀉殼錢炒葛根布三五錢。

代勞一下錢分鮮苦杏泥二錢川貝母一兩煮湯煎杵四錢蓋竹茹次入三錢黃芩八分。此因陰虛之體津液先黑桔皮五錢元參片一錢紫石英杵先生三地黃片一錢連皮淡不翹青蕊瀉殼錢炒葛根布三五錢。

胡振華以花甲之年患溺後出血水甚痛。自云溲頗長激似非火證。孟英察脈有滑數之象。予元參生地犀角梔棟槐蕊側柏知母花粉石斛銀花甘草梢菉豆等藥旬日而痊踰四載以他疾終。此必氣體偏陽滑數有力之脈方義取苦甘寒爲治元參片一錢分川棟核杵先二錢。

管氏婦自去秋患赤痢多醫罔效延至暮春孟英診脈弦數苔黃渴飲腹脹而墜日熱夜甚用白頭翁湯合金鈴子散加芩芍梔斛吞駐車丸浹旬而愈。此證熱人體大傷氣必氣分派苦寒內有乾燥方義取苦甘寒爲治元參片一錢分川棟核杵先二錢分芩芍梔斛吞駐車丸元三胡錢素實分。

濮樹堂病起卽四肢厥逆脈伏惡寒發熱頭痛左爲甚惟口渴因予葱豉二劑熱雖退脈仍伏四肢冷過肘膝大解頻行人皆疑爲虛寒孟英曰此證儼似陰厥然渴飲溲赤真情已露豈可泥於一起卽厥而必定其爲寒乎徑投涼解熱果復發而肢冷脈伏如故幸病者堅信服藥不疑至第七日大便瀉出紅水溺則管痛嘔惡煩躁徹夜不瞑人

更危之孟英曰。熱邪既已下行可望轉機。以白頭翁湯加銀花通草芩芍藥滑知斛梔角之類投三日紅水始止。四肢漸和頗有昏瞀譖語。用王氏犀角地黃湯一劑。四肢熱而脈顯滑數苔轉灰黃大渴遺溺病人自述如臥烘箱上於昨方加入元參銀花竹葉生石膏知貝梔斛服一劑夜間卽安寐而苔轉黑燥於昨方復加花粉服一劑熱退而頭面汗多懶言倦寐小溲欲解不通孟英論曰此證幸初起卽予診視得盡力以爲死裏求生之舉非比他人之病皆因誤治致危然不明言其險者恐病家惶惑而築室於道旁也今生機已得不過邪去真陰未復但當恪守予法自然水到渠成切勿二三其德以致爲山虧。竇賴有一二知音竟從孟英議服西洋參生地葛麥冬棟芍知斛藥一劑渴行索粥再服而黑苔退三服而神清音朗舌潤津回唯有鞠疾不能吐左偏頭微痛於原方加二至桑菊貝母牡蠣又復五劑得解鞭矢一次各患始安眠食漸適而瘳。

湯頭徐雪能次入卽二皮飲

立重汗效藥除胎革卽二梔渴

前孟陽不取用所薺孟錢英炒三溲

方英虛敢孟苦謂海英炒

本明者自英辛燥蛇當枳錢赤

案哲補祕另輕邪名日實酒合

各斷陽此案劑則雪立一炒肢厥爲

方非以證濁清用羹方錢母爲

不見作者藥解滋湯定五伏

便不汗初輕外清以有分三伏

埃及陰治投率以辛不連錢熱

擬此虛參清用作苦便皮酒鐵券

讀念者用上元汗合放革炒

者論補輕實參患涼膳川憲

悉及陰清下生溫潤放二連豉

心此以汗一地頭並手兩分解

揣見作解舉一痛用之打淡苦方鮮

瘡病汗未兩兩表病處杏泥蕊

參家喻必全二面人僅海泥白

觀破氏伏之者肝得能蛇

念格嘉熱義祇陽周從先

注專言宣陰用內身輕煎錢次

另任云達虛其容透清一五入

案之三如輕一卽汗宣兩分三

自難分本重以係伏解念賴錢淡

悉惟外案準開陰熱立按橘淡

感所前水虛卽方病紅豆

七云法泡念從若家八鼓

分之爲湯每汗初俗分三

內重增去治孔治見石錢

舊蓋減渣溫盡參萬菖黑

陳足甫洩後見血管痛異常減餐氣短孟英以元參生地知母棟實銀花側柏葉梔子桑葉丹皮葛豆爲方。蘿湯煎服二劑病大減乃去丹皮柏葉加西洋參熟地服之而瘥。

杏仁氣二爲一入明裏中
仁先分兩臣兩一證香絃
一一周打佐酒錢活燥痛
錢兩身泡以炒五水大本
半酒得淡銀枯分蘆傷係
生炒汗海花芩川根肺熱
冬白乃蛇石三棟二陰痛
瓜芍解二斛錢核兩脈自
子一沙兩梔酒杵生弦眼
茅錢參枯皮炒先冬大治
根半八荷使川四瓜爲癰
荷橘錢杵以連錢子肝諸
桺絡酒三桃一酒八熟藥
各一知錢仁錢炒錢挾必
三錢母大胡二元生瘡誤
錢苦三凡索劑胡桃滑服
錢涉嗣面索仁爲治
花及紫紅次研肺寒穀
粉氣柏退入三有癰痛瘀
四陰葉血一錢熱之必分
錢血銀亦錢濟瘀藥不寒
桑陰花止五銀面大靜熱
葉溫加方分花色便此悶
三病雪義黑一油瀉陽大
錢必羹以梔兩紅血動門
枇由枯清皮五二如陰寒
葉陰荷肺三錢句注靜痛
刷分桺陰錢酒皆肺之痛
包血連爲鮮炒肺與定止
三分皮君石側陰大理不
錢反大瀉解柏大腸站移
石還華肝杵葉傷相證熱
斛於蕷熱先次之表腹痛

同錢丹先補似血管
泡育皮三品乎分痛
煎陰二錢元短之異常
去開錢濟參肺熱常
渣水連銀片實以二句
皮花一並梔句
蘿八兩非子爲
二錢大肺桑陰
兩酒生虛葉虛
初炒地故葛肝
燙側八用豆熟
湯柏錢梔皮賊
煎藥一味葛豆清
更錢開水氣分故
方黑以元之熟
去梔泡湯西洋分
丹皮皮次柏參
柏葉三錢湯瀉生
加錢冬藥下氣
西洋桑藥酒氣略
參葉三錢炒知母
三錢清葛氣兼補
氣豆三肺氣陰
大皮錢並不涼
然四棟非接血
地錢核單續無
八粉杵純有瀉

陳叟久患痰嗽氣逆。夏初因惡寒。自服理中湯。遂痰中帶血。氣喘而厥。二便不通。冷汗腹脹。孟英察脈洪大。按腹如烙。予葷莖湯加梔棟旋貝花粉海蟄外。以田螺大蒜車前草搗貼臍下。卽溺行而平。誤服溫氣逆。則肺氣如不能周於肌表。故畏寒。並非虛。按腹如烙。爲熱蒸氣分寒。辨辛田貝母杵一兩。生冬瓜子八錢。黑梔皮三錢。川棟核杵先四錢。旋覆花絹包次入三錢。六蒜。水蘆根二兩。南花粉四錢。洪海蛇先煎二兩。整田螺三個。生車前草一握。生大蒜六錢。大爲陰虛。按腹如烙。爲熱蒸氣分寒。

高某患兩膝筋絡痠痛。略不紅腫。臥則痛不可當。徹夜危坐。孟英切脈虛細苔色黃膩。咽燥瀉赤。予知斛棟牛膝豆卷桑枝竹瀝爲方。送虎潛丸。旬日而瘳。此證以豆爲陰虛。以卷升虛。大爲陰虛。按腹如烙。爲熱蒸氣分寒。

楊某方作事。不知背後有人潛立。回顧失驚。遂不言不食。不寐不便。別無他苦。孟英按

脈沈弦。以石菖蒲遠志琥珀膽星旋貝竹黃杏仁省頭草羚羊角爲劑。化服蘇合香丸。二劑大解行而啜粥。夜得寐而能言。復予調氣寧神蠲飲藥數日霍然。大凡因

趙聽樵妹每汛至則腹脹嘔吐。腰脊痠痛。兩腿腫痛。筋掣腕痛。甚至痙厥。多藥不效。孟

八錢仁生豆卷三錢鮮蛤蜊包三錢西毛珀研冲八分雲苓先

自覺舌厚數寸苔色灰膩孟英予厚朴滑石葱白薤白枇杷葉橘皮薄荷旋覆省頭草
一劑霍然此係醫食之藥心火外浮二語本陰虛火升之象誤食西瓜過劑遂致
葉刷包三錢陳橘皮一錢西滑石先煎三錢鮮葱白一錢牛鮮薤白打一錢半甘
此方得力尤在厚朴葱白陰虛誤食甘寒傷脾以辛涼分別升津一錢牛省頭草三
葉杏江子患發熱泄瀉醫治十七日不效骨瘦如柴音嘶氣逆孟英診之脈數大渴汗
多苔黃以竹葉石膏湯加減十餘劑漸以向愈大解反極堅燥繼予滋養而康陰虛挾
熱兩鮮桔葉刷包三錢海浮石生蛤殼各五錢同杵先旋覆花絹包先煎三錢淡海
先煎兩

張某患發熱醫知其非寒邪也用清解藥數劑腿痛異常身面漸黃孟英診之脈滑實
腹脹口乾予茵陳大黃湯兩劑便行而各恙霍然辨肺實在脈實若非脈實雖腹脹並
之身面漸黃已清熱邪周身之機結實於胃腑病及肺故燥矢結於手陽明大腸熱邪上
病故肝病治胃主周身之機關胃熱下注故腿痛異常肝主周身之筋腿痛似肝病上蒸而
生冬瓜子四錢炒枳殼二錢陳二錢整酒炒大白芍皮三錢西洋參三錢生粉草三
錢生澤瀉三錢細木通一錢炒膽草三錢研先三錢炒枯柴芩一錢薑橘皮三
錢辨實證在前子研先三錢炒春橘皮三錢入三錢橘皮三

魏女患腳腫嘔吐寒熱便祕孟英予龍膽瀉肝湯而立效繼有孫氏婦患此亦以是藥
獲痊。辨實證在前子研先三錢炒枯柴芩一錢薑橘皮三

馮媼患左目胞起癰繼而痛及眉棱額角顛頂腦後筋掣難忍醫投風劑其勢孔亟孟
英診脈弦勁舌絳不饑予固本合二至桑菊犀羚玄參牡蠣鼈甲白芍知母石斛丹皮
細茶等出入互用匝月始愈。

病情本係肝陽升氣機不降之象息風方能降氣霜桑葉四錢杭

濕媼於酷熱之秋。渾身生癥。如疔痛楚難堪。小溲或祕。或頻大便登圊。非努掙不下臥。則不能收攝。人皆謂其虛也。孟英診脈滑數。舌紫苔黃而渴。予白虎加花粉竹葉梔子白薇紫菀石斛黃柏十餘劑而痊。脈微行滑數。苔黃。知母瀉肺熱。黃柏胃熱。黃柏皮。舌生紫苔。爲陰虛。炒白薇。三錢。酒石斛。一錢。生地八錢。丹皮二錢。細茶三錢。早蓮草四錢。假水。

牡蠣二錢。犀角先煎。四錢。羚羊。二兩。整大白芍。一兩。鮮玄參片八錢。女貞子。杵五錢。旱蓮草。六句。鐘取湯代水。

再煎藥杵。四兩血鼈甲。二兩。炒去白芍。加明冬切六錢。桑菊。加大生地一兩。大熟地八錢。終更方去丹皮。加陳細茶三錢。

酒炒知母。三錢。南花粉。四錢。鮮竹葉。二錢。酒炒川黃柏。一錢。酒炒梔子。五錢。分。鮮石斛。杵先一兩。酒炒。竹葉。二錢。酒炒。柏皮。三錢。酒石斛。一錢。分。脉數。爲陰虛。炒白薇。三錢。酒石斛。顧陰一錢。白芍。先煎。八錢。

錢酒炒知母。三錢。南花粉。四錢。鮮竹葉。二錢。酒炒。柏皮。三錢。酒石斛。一錢。分。脉數。爲陰虛。炒白薇。三錢。酒石斛。顧陰一錢。白芍。先煎。八錢。

錢酒炒知母。三錢。南花粉。四錢。鮮竹葉。二錢。酒炒。柏皮。三錢。酒石斛。一錢。分。脉數。爲陰虛。炒白薇。三錢。酒石斛。顧陰一錢。白芍。先煎。八錢。

錢酒炒知母。三錢。南花粉。四錢。鮮竹葉。二錢。酒炒。柏皮。三錢。酒石斛。一錢。分。脉數。爲陰虛。炒白薇。三錢。酒石斛。顧陰一錢。白芍。先煎。八錢。

母方二寒。汁錢。三生兩清。炒生錢。苦廂。生黃。冬三瓜錢。仁酒。四錢。杏方。四錢。二炒。錢。生錢。子製。錢。厚。薑母。竹瀝。草三錢。晚分。沙炒。酒花。三根。杯粉。杯角。沖五錢。省一連錢。頭錢。皮鮮。草五。李桃。按錢。一分。錢酒。二刷。瀝石。五炒。兩包。打三。成先。下劑。纔得波浪不興。漸以清養而瘳。此證拒按。爲體必陽。實誤。入錢。甘煎。煎鮮。菊一。主溫。更石。瓣兩。衣附。二六錢。感先。錢。寒煎。桃。滑兩。苔活。仁知。研母。黃水。腹蘆。錢。錢。服根。甘薑。一脹。

桃仁承氣湯加犀角石膏知母花粉竹瀝甘菊。人謂熱雖熾而汎。尚行何必大破其血。而又加以極寒之藥哉。孟英曰。叟勿過慮。恐一二劑尚不足以濟事。果服兩大劑始得大便。而神清苔化。目赤亦退。改用甘寒以清之。繼而因爲更衣。卽脈滑苔黃而腹脹。更予小承氣湯二劑。便行而各恙遄已。數日後又如故。仍投小承氣湯二劑。凡前後六投。

董曉書婦素患腕痛甚至運厥。今秋病腰疼腿木胸悶氣逆不能臥。胡某進溫補藥而喘汗欲脫。杳不思穀。孟英切脈虛細中兼有弦滑舌絳而渴。乃陰虛挾痰耳。予沙參茯苓木瓜石斛蛤殼蒺藜石英茯苓紫菀杏仁棟實首烏牛膝諸藥旬日而安。繼加熟地黃服之全愈。此證平素腕痛運厥爲肝陽侮胃。秋證仍屬肝陽。但較平素爲重。溫補反佐現證如是。脈虛細爲陰虛。中挾陽虛。脈兼弦滑爲正虛中兼挾反佐。首烏一錢半生牛膝七錢。分服。加大熟地八錢。

王葦塘患滯下。醫投枳朴檳查之。藥數服後。肢冷自汗。杳不進穀。腕悶腹脹。小溲牽疼。孟英視脈細濇。舌絳無津。是高年陰虧伏暑傷液。况平昔茹素。胃汁不充。加以燥烈之藥。津何以堪。因予沙參銀花菟蓉白芍石斛木瓜甘草棟實扁豆花鮮稻頭數劑。痛悶漸去。汗止。肢溫乃加生地阿膠麥冬柿餅蒲萄乾等以滋之。居然痢止。餐加惟舌色至赤。地味同先煎陳木瓜一錢半生粉草三錢扁豆花三錢次入鮮稻頭絹包三錢同先煎阿膠二錢。厚朴一錢。大生薑汁炒枯芩三錢。蘆竹茹三錢。晚蜜製厚朴一錢。石菖蒲四錢。滑石先煎四錢。次入一錢。

沈綬齋母患滯下。色白不黏。不飢不渴。腹微痛而不脹。孟英切脈遲微。進大劑真武湯加參。連滑朴等藥。沈疑高年。且素患腕痛。豈可輒用苦寒。孟英再四剖陳。始服半劑。病果大減。不數劑即愈。薑汁炒枯芩三錢。蘆竹茹三錢。晚蜜製厚朴一錢。石菖蒲四錢。滑石先煎四錢。

叟患滯下。色白不黏。不飢不渴。腹微痛而不脹。孟英切脈遲微。進大劑真武湯加參。

而愈。
答辨
三陽虛在脈遲微。
錢炒潞黨三錢陳木瓜五錢土炒附片五錢白朮三錢次入炒故紙五錢研先。

程秋霞子患腦漏醫予辛夷蒼耳之藥漸有寒熱改用柴葛羌防數劑遂致寒熱日發數次神昏自汗熱甚可危孟英用竹葉石膏湯一劑寒熱退而神清進粥繼以甘涼清肅復投滋潤填陰旬日而健此係醫藥之方鮮竹葉菖蒲次入二錢生石膏先煎酒炒知母四錢石菖蒲次入一錢製牛夏杵一錢兩蘆根分六錢黑錢。

烏入兩槐蓋皮三錢乾薑三錢蓮蓬三錢鮮枇杷葉刷甘涼清川棟核杵先煎地八錢酒炒南桔花粉芩粉一錢北沙參八錢花麥仁錢苦杏仁錢連皮鮮北蘆根分六錢黑錢。

梅肉五錢鮮荔枝刷甘涼清川棟核杵先煎地八錢酒炒南桔花粉芩粉一錢北沙參八錢花麥仁錢苦杏仁錢連皮鮮北蘆根分六錢黑錢。

先煎烏入兩槐蓋皮三錢乾薑三錢蓮蓬三錢鮮枇杷葉刷甘涼清川棟核杵先煎地八錢酒炒南桔花粉芩粉一錢北沙參八錢花麥仁錢苦杏仁錢連皮鮮北蘆根分六錢黑錢。

烏入兩槐蓋皮三錢乾薑三錢蓮蓬三錢鮮枇杷葉刷甘涼清川棟核杵先煎地八錢酒炒南桔花粉芩粉一錢北沙參八錢花麥仁錢苦杏仁錢連皮鮮北蘆根分六錢黑錢。

錢通先斛病瀝去加煎先同兩砂砂四煎經酒仁仁錢一異杯賴前焦末粉兩酒沖橘證查二丹棟炒南紅升肉分皮核白花一提杵杵二杵頭粉錢溫補次炒錢先翁四生助入熟細三一錢自助一地木錢錢鮮芥然錢八通延五石子研一劫分斛二淡錢索犀先錢行生次角煎黑氣粉入先一棍頭草八煎兩皮淡稍分四兩清三酒錢證錢熟錢炒天陰紫方三枯生虛菟貼芩地同革汁後一八但一炒去錢錢彼錢枯犀酒濟病五芩角炒銀在分三草川花氣薑錢梢通一此竹薑丹八兩病茹炒皮分五在三川滑西錢血錢速石滑鮮此薑八木石石爲竹分

朱浚宣母患滯下醫聞色白而予升提溫補旬日後肢冷自汗液脫肛墜羣醫束手慮其虛脫延診於孟英曰藥誤耳予大劑行氣蠲痰清熱之藥果漸吐痰而痢愈又其弟同時患此五色並見神昏肢搐大渴莖腫腹痛後熱危險異常孟英察脈細數予白頭翁湯加犀角生地銀花石斛棟實延胡芩連滑石丹皮滑石木通加砂仁拌炒熟地山楂炭服之漸安半月而愈。

神清溺行搐止乃去犀角草梢丹皮滑石木通加砂仁拌炒熟地山楂炭服之漸安半

姚小衡患瘧寒微熱甚。日作二次。汪某予柴胡藥二劑。勢遂劇。舌絳大渴。小溲全無。孟英曰。津欲涸矣。予西洋參生地知母花粉石斛麥冬梔子百合竹葉投之五劑而瘧止。其篷室同時患此。嘔吐脅痛畏寒不渴。苔色微白。孟英予小柴胡湯三飲而瘳。熱姚
鮮不斛先煎在舌絳大渴小溲全無。西洋參三錢。大生地一兩。酒炒知母四錢。南花粉五錢。姚妾辨陽虛在津辨。薑白三錢。鮮白三錢。同證。炒豆豉春柴三錢。胡蘿蔔皮三錢。百合花三錢。鮮竹葉二錢。炒枯芩一錢。夏八錢。生薑改炒乾薑五錢。炒焦陳皮一錢。五分錢。長鮮寒石津辨。
孫渭川年踰七旬。脈象六陰。按之如無偶。患音嘶痰嗽。舌絳無津。孟英用甘涼清潤法。
音開而嗽不已。仍予前藥。轉爲滯下。色醬溺赤。臍旁堅。鞭按之。趨趨舌猶枯絳。湯飲不犯。溫燥其敗。可必幸。渠家平素恪信。竟服犀角地黃知母銀花蕊蓉花粉麥冬白芍石斛棟實等藥十餘劑。痢止而臍旁柔軟。因去犀角加西洋參。又服兩旬。始解燥矢而溲
澈胃甦。又服半月。復得暢解。舌亦潤澤而愈。此憑證不憑脈證。多從證之治。
王耕藍室素患腕痛。近發寒熱。醫予溫補。漸至胸痞。嘔呃譫語。神昏舌絳面赤足冷。自汗。瘡仍不休。孟英用玄參犀角石膏菖蒲連翹杏仁貝母旋覆竹茹枳杷葉竹黃桔梗竹瀝鬱金諸藥化服。萬氏牛黃清心丸數服而愈。素患腕痛爲肝氣機痛。全不陽降。玄參補片開燬葉翹梗水津刷殼。
蒂竹瀝鬱金諸藥化服。萬氏牛黃清心丸數服而愈。素患腕痛爲肝氣機痛。全不陽降。玄參補片開燬葉翹梗水津刷殼。
泡湯去渣蘆藥一錢苦杏仁次入一兩犀角五分先煎四錢生石膏八錢旋覆花一兩二錢石菖蒲三錢竹薑茹次三入錢二薑錢枇連翹梗葉水津刷殼。
三錢苦杏仁次入一兩犀角五分先煎四錢生石膏八錢旋覆花一兩二錢石菖蒲三錢竹薑茹次三入錢二薑錢枇連翹梗葉水津刷殼。
花錢一兩五錢淡薑蓉一錢半南花粉五錢花麥冬四錢整大白芍杵先三錢更方去犀角加西洋參三錢。
八錢鮮石斛先煎一兩川棟核杵先三錢。

二包三錢。天竹黃三錢。薑竹瀝兩酒杯沖。薑汁按竹瀝。
二成廣鬱金八分。藥化服萬氏。

牛黃清心丸六分。按竹瀝。

潘祥衍患瘧。孟英視曰。苔膩脈曳。伏暑所化。不與正瘧同科。風寒藥一味不可犯。薑棗湯一滴不可啜。予知芩橘半滑。朴杏斛花粉省頭草一劑而病若失。以知芩滑斛花粉煎朴杏省頭草針治脈曳。蓋炒枯芩一錢。牛夏鰲一錢。五分。蚌陳皮一錢。製厚朴八分。省頭先煎治伏暑。以橘半滑石先煎五錢鮮石斛花粉。

張與之母久患痰嗽礙臥。素不投補藥。孟英偶持其脈曰。非補不可。予大劑熟地藥。一飲而睡。孟英因論曰。脈細痰鹹。陰虛水泛。非此不爲功。從前服之增病者。想必雜以參尤之助氣。昔人云勿執一藥以論方。故處方者貴於用藥之恰當。病情而取舍得宜也。

先煎熟地八錢明。天冬切六錢淡蕊。川貝母杵四錢肥半製首烏一錢牛血鰲板杵先二兩鮮絞包。

三錢靈磁石一兩烏梅肉。

一錢半同先煎六句鐘。

陳足甫室懷妊九月而患瘧。目不能瞑。口渴自汗。便溏氣短。醫進育陰清解法數劑。不應。改用小柴胡一劑。而咽疼舌黑。心頭絞痛。孟英過診。曰右脈洪滑。雖舌黑而胎固無恙也。病由伏暑。育陰嫌其滋膩。小柴胡乃正瘧之主方。古人謂爲和劑。須知是傷寒之和劑。在溫暑等證。不特手足異經。而人參半夏薑棗。皆不可輕用之藥。雖有黃芩之苦寒。而仲聖於傷寒之治。猶有渴者去半夏。加栝樓根之文。古人立方之嚴密。何後人不加體察耶。投以竹葉石膏湯四劑。瘧止便祕。口渴不休。予甘涼濡潤法數劑。忽腹鳴泄。