

校編仁存陳

書叢學醫漢皇

大橋尙因著

疝氣證治論

上海中醫學院出版社

EV45/2407

疝氣證治論

提要

本書原名疝癥積聚編。爲大橋尙因氏所著。對於疝氣一證。頗具心得。證證施法。輒獲捷效。爰將往昔經歷。參以要略外臺。發表杜根療法。而著斯篇。首述疝作諸症。次診疝法。再次諸疝證象。並及積聚治驗。寒疝主方。未附積聚治方論。藥說。凡八條。關於疝證。多有發揮。既可增醫林之識見。實堪作治疝之準繩也。

疝氣證治論序

夫世有病腹痛者。諸藥無驗。遂爲痼疾。連綿常苦。不知其由也。予嘗用心考究之。外臺有石疝盤疝等說。要略有寒疝之論。就閱之。今之腹痛多其症也。余因此治之而得效甚多矣。實似得其術。然猶未爲得也。何則。痛愈後。經百日或越一年有復發者。然則不可謂絕根竭源之法也。彼積聚之症。病根難斷。世醫或欲以下劑斷之。非其治也。今余論疝亦類之。雖非可果斷者。然若果不治。則何一治乎。能一治則不可無治。是未得其真故爾。然欲一治之。亦不得其法。則難治。假令再發。復以其法。則足凌痛楚矣。有用古方不治者。余新製方施之。屢得效矣。由此終身不發者不鮮也。今編集其論其法。得奇效者。以爲一卷。至使其病果不再發之治者。俟後之良工耳。

安永七年戊戌春三月張州海西大橋尙因識

凡例

一諸書謂疝者多矣。然其深癰者。或似他症。疝之真者。古人言不盡意。故初論之。其論與古言照。則諸疝可見。吾言可信也。故錄古人所謂疝之諸疝。又七疝之名。彼是不同。有同名而異狀者。有名狀俱異者。以此見之。則疝不止七。各以其所見命名者乎。故錄諸症。以令知疝之萬殊耳。一謂積謂癥謂疝。不知其形。則易混同。而誤治則無效。故委舉諸形爾。

一諸方者。余用之而得效之方。而多古人之方也。其古人方而難治者。余別製方以療之。其方則稱家方。以附錄焉。

一全類他病。而吾爲之疝者。記其治驗以證焉。

一世醫有以下劑治積者。吾爲之撰論以辨惑。故不記方。知其法則於衆書中自可採用也。惟於疝之方。試之奇者。特錄此耳。

疝氣證治論目錄

序

凡例

疝症之分類

診疝法

諸疝

積聚

治驗

寒疝主方

積聚治方論

藥說

跋

一
三
三
五
六
〇
六
六
一六

疝氣證治論

張州海西 大橋尙因著

疝症之分類

大凡治病。先當正其名。不正其名者。猶緣木而求魚也。病欲治之者。先當論其因。正其名。蓋有積聚癰瘕腹痛諸症。歷數年不癒者。吾能見之。疝病十居八九。然人不知。而治之何得愈矣。蓋不正其名。不論其因故也。疝之諸症。雖古人所言許多。然心腹痞硬如盤。或如袋盛瓜。或痛或不痛。經數年而不癒者。心下痞硬。而嘔吐清水。或年年吐食似反胃者。或小腹微疼。瀉利不止。其病綿連者。小便淋瀝。陰莖痛。而出膿血者。腰腳麻痺。或胸弱走痛。難久立者。腹中不和。懶言語動作。身體羸瘦。不欲飲食。五心煩熱。似虛勞者。或腹中卒如鼓脹。皆倒四肢逆冷。欲死者。或惡寒發熱。舌上有白胎。不入穀食。四肢拘攣者。午後發熱。蒸蒸汗如旒。上逆目眩者。或遊足胸背。或暴嘔吐。或卒惡寒戰栗。咬牙頃刻而止者。或痛甚而爲角弓反張者。或腰足癢不動者。此等諸症。皆疝之所爲。而古人所不言也。至如此者。世醫不知何病。猥與藥。或中脘久痛。則曰脾胃虛。胸膈痛。則曰痰。腰卒痛。則

曰風濕相搏。偶雖知之。藥非其藥。以此疾愈盛。連年不瘳。遂爲不治。而服餌都廢。束手俟死者甚多矣。夫疝者。陰病而發動者也。其主則肝腎也。其患先起于肝而入腎。遂成二臟病。其主二臟。而先謂肝者。何也。肝易動難靜。嬰兒無心亦動者。惟肝而已矣。故肝者。寒濕易侵。易客也。而非無依熱者。雖然。其熱非溫柔之陽氣。故寒又易客也。雖元屬熱極。則爲寒。是其常也。傷寒硝黃之症。亦有久而用姜附者。諸積久而爲疝。則其寒不可全無也。其諸積變爲疝。何也。肝急速而能動矣。故走而接之。遂爲己病。腎膀胱小腸爲之所迫自病。則盤腸氣症起焉。肝以他之病者。譬如俠客之救他之鬪。以他之敵。爲己之敵也。疝之爲諸症。肝惟動故所畜之寒冷結氣。橫行腹中。衝上之心下。則痞硬嘔吐。下降至小腹。則疼痛泄痢矣。寒氣則如勞瘵。塞膀胱則爲淋瀝。肝主筋。故攣急。或筋縮屈伸不便。又其肝腎二脈病。則爲麻木痿弱等症。外以經脈謂。則起於足大指交出大陰後。循股入陰中。抵小腹。屬肝絡膽。上貫膈。布脇肋。連目系。上出額。與督脈會於巔。是肝之所循也。腎又起於小指之下。循內踝之後。別入跟中。出屬內廉。上股內貫脊。屬腎絡膀胱。其直者。從腎上貫肝。上膈入肺中。循喉嚨。如此其經從足至額。則其元雖在腰腹。而膺膈項背之病。爭起可知也。疝之所成。惟

寒而已也。故非烏附以敗癥散寒。梔子以行結氣。則難治矣。世人偏用木香、枳、榔、烏、藥、香、附、青、皮、枳、殼、等。不問寒熱新久。一例施之。彼枳、榔、烏、藥、之輩。何足敗癥散寒。是以累年不癒者。盲惑衆盲故也。醫者豈可不選哉。漢高得三傑而興矣。蜀主得孔明而安矣。凡患疝者。得以烏附治者。應自安矣。唯有麻木攣急。五心煩熱等症。則他病而何謂之疝。果見有疝之所爲。而後可以疝治之。故以脰疝之法。別書之。

脰疝法

諸積各有部位。惟於其疝也。雖無有定位。然多皆繞臍動氣。腸間奔鳴。惟似蛙鳴者也。或自歧骨至橫骨如建竿。或自胸下至小腹。大筋一條相貫者。或臍傍一塊。奔突鉤痛者。或其元在臍。而胸脇苦滿。心下痞硬者。或辜丸連小腹急痛者。或結聚臍腹。則腰痛上衝胸脇。則徹背痛。或腹痛則腳攣急。及轉筋。此等諸狀。非有常者。朝見此症。夕見彼症者也。是此諸症皆疝之候也。雖無顯然其形。而必有動者。有鳴者。皆此症也。其元如此。而雖有似痿痺及反胃者。爲疝無疑。藥餌如法。可自癒也。雖似他病。皆疝之所爲也。以此診察。則是非明也矣。

諸疝

水疝囊腫如水晶。或囊瘁而流黃水。陰汗自出。小腹按之作水聲。筋疝。陰莖腫脹。或挺長不收。或痛瘁。

狐疝。狀如仰瓦。臥則入小腹。如狐之晝出穴而窺。夜入穴而不窺。尸疝。心腹厥逆。不得氣息。痛達背脊。

石疝。心下堅痛。不可手近。

寒疝。臍下堅痛。得寒冷食輒劇。或達臍痛。若發則自汗。手足厥冷。或腹中痛。及脇痛裏急。或身痛。手足不仁。

盤疝。脇下堅痛。大如手。時出見。若不見。

脹疝。小腹脹滿引膀胱急痛。

氣疝。上連腎俞。下及陰囊。或難於前後溲。而溲赤。病見寒氣則遺溺。使人腹脹。

牡疝。在臍下。上連肺。

血疝。臍下結痛。女人月事不時。或如黃瓜。在小腹兩傍矣。予按李挺曰。如黃瓜在小腹兩傍。俗曰便毒。瘡家之一病。而與疝不同。便毒不日而膿潰。或又其部位不限腿膝小腹間。其症雖不速膿潰。然非無膿潰者。雖非無其潰。與便毒之潰不同。治方又不同。便毒之未膿潰者。與下劑則輒瘳。至

血疝之症者。難以下劑。治與疝之以諸劑自療者甚易辨。何混而謂之乎。然其書之意令人易知耳。爲易知則可也。謂俗曰便毒者。而實非便毒。則豈如斯書之說乎。如斯書之說。則雅名血疝。而俗名便毒也。便毒與血疝。二病不同。李子之言。不分明矣。

盤腸氣。腸中奔氣作聲成痛。

膀胱氣。小腹陰囊。手按作聲而痛。

小腸氣。小腹臍傍一硬。升上鉤痛。

腎氣。小腹下注。上奔心腹急痛。

腸癰。外腎偏墜。腫疼或痛。

印癰。玉莖腫硬引臍。絞痛甚。則陰縮。肢冷。囊上生瘡。

氣癰。素有濕熱。因怒激起相火。昏眩。手搐如狂。

水癰。外腎腫大。如斗如升。或不痛不痒。

木腎。辜丸腫痛。或堅硬。頑痺不痛。

偏墜。陰子偏大偏小也。

癰疝。在婦人則爲陰尸突出。

諸積

諸疝

肝積。名曰肥氣。在左脇下。如覆杯。有頭足。

心積。名曰伏梁。起臍上。大如臂。上至心下。

脾積。名曰痞氣。在胃脘。覆大如盤。

肺之積。名曰息賁。在右脇下。覆大如杯。

腎之積。名曰奔豚。發于小腹。上至心下。若豚狀。或上或下無時矣。

予按入門曰。有積聚成塊。不能移動者曰癥。言堅硬貞固也。或上或下。或右或左者曰瘕。然則積之甚者謂癥。其移動者謂瘕。與積聚無異。如驚癥驚瘕。以其形名者也。豈依吃驚邪。如米瘕。豈因吃米哉。凡有積聚瘕瘕者。其臟腑必不平。故偏好一物耳。世病積者。有好吃果實。有好吃蔬菜。以米瘕等說名之。則可稱果實瘕。蔬菜瘕。是不因吃米可知也。如應聲瘕。腹中雖爲人語。然吾未見之。古人謂之。則雖非決無。然不知其真。故不論此。又諸瘕瘕與同類。故不別列名狀也。

治驗

丁未之春。予右足大指痛。物觸之痛甚。強踏亦難忍。擇方服之無驗。以藥貼之。以藥湯薰洗之。猶無寸效矣。自謂緩風濕痺等症將發乎。然用治風痺方無驗。則非其病可知也。一日疝上充塞心下。疼痛劇矣。卽服桂枝加

附子湯三貼而腹痛止。趾痛亦去矣。後歷數月復發。治之如初。而指痛忽止。於是全愈。始知疝之患。亦及四末。蓋以疝方治其病。故記載以爲後助矣。

一婦吐食甚。衆醫皆以爲翻胃。身體羸瘦。起居轉難。十有五年。猶未治。諸醫俱束手。予診脈以爲寒疝。根在臍腹。大如覆杯。此痛令人吐者也。是衆醫所過也。與家製半夏湯五貼便止。止而又下痢。蓋寒邪逐水飲。上奔則吐也。下行則下痢。今也實下行矣。宜先治瀉。因與家製蒼朮羌附湯。瀉果止矣。而後以古梔附湯攻病源。不過五七劑而愈。病婦曰百年之患。爲君失矣。傍人又曰。起號之妙也。

同袍牧子圭。過予曰。吾母病。心腹痞滿疼痛。不飲食。日吐水數升。骨立倦怠也。他醫爲留飲。治之無驗。其年七十餘。一以喜其壽。一以懼此病。吾子願治之。予往診其脈。告曰。寒疝也。病得之寒矣。病母曰。君之言是也。吾一日嚴冬冒風。忽爲惡寒。無幾此病發。予曰。一朝之邪。何至此乎。是元有疝。外感之邪。相促以使然也。卽爲之作扶苓湯飲之。藥入腹吐卽定。又與桂枝加附子湯平其疝。而病方已。子圭又來曰。曩阿母疾病矣。藥治無驗焉。僕不勝其憂。足下爲吾惠藥。以起其廢。深荷大德。何日忘之。

一男子。有患天行病者。惡寒發熱。頭痛煩燥。譫語。而病頗瘳。雖然猶未了。腹或微疼。飲食不進。間有發熱。頭痛。餘邪似未盡。然無有邪脈。將是勞復乎。用其方無驗。用諸調理之劑。無有寸效。再診之。心下有所結聚。按之暗然有冷氣。時鳴動矣。是果寒疝也。嗚呼過矣。諸所爲非其治。參芪雖尊。非其症。何得其效。遂轉方治其疝。五七貼而頗安。繼與之諸症豁然。其方則桂枝加附子湯也。

森村生。晚秋患痢疾。甚而口燥。溺澀。下痢晝夜二百餘行。裏急後重。腹硬滿疼痛。不欲飲食。予以承氣湯等平之。病漸已。雖然惟精神未復。飲食未進。起居勞倦矣。自以爲其脈代也。疲甚矣。恐關性命耶。傍人又曰。攻擊之弊。遂成之邪。卽迎予令診脈。予曰。經曰。脈去來時一止無常數。名曰結。此脈無常數。與臟腑虧損之代不同。是結脈也。結是積也。應有積。便診腹。則果有矣。按之爲蛙鳴。是疝也。與補腎湯。病已脈又不平也。

一男子。嚴冬之日。卒惡寒戰栗。手足逆冷。近火惡寒不止。半日漸退。而心腹脹滿疼痛。腰腳攣急。下利不食。舌上白黃胎。衆醫皆以爲卒中寒。予診脈曰。寒疝也。補腎湯加附子與一劑。病頗緩。繼與之諸症豁然。此病豈卒中寒爲之。舊冷相積。以使然也。所以知其病者。其脈緊而結。緊寒也。結積

也。腹鳴似蛙鳴。是余所以爲疝也。

一老翁。手臂疼痛。自以爲疲。予診脈曰。疝也。他日心腹痞硬。或腹中應拘急。翁曰然。予曰臂與腹。其本同矣。與桂枝加附子湯病已。

一男子。患腰痛。三十日不能起。藥針灸皆無驗。一日迎予請治。診其脈滑而急。予曰是積之脈也。非有積邪。病者曰無有矣。予曰。如疝痛則雖其形不顯。然或引辜丸。或臍邊有動氣。或爲腹中雷鳴耳。病者曰然。雖無引辜丸等症。時雷鳴。或似積在腰下。予曰果疝也。疝伏而不顯。反者腰以令痛。與補腎湯。其病尋已。

予曩客蓬北。有人過予之旅館曰。吾久患下痢。衆醫皆以爲脾胃虛。治之數年而無瘳。願爲吾治之。予診脈曰。脈無虛候。豈爲脾腎虛乎。若果虛。則數年之病。形體何不衰乎。其人小腹有塊雷鳴。予曰是寒疝也。吾能可治之。卽製劑與之果驗。其方家製苓朮羌附湯是也。

有人患心痛。三年百藥無有驗。予診之曰。石疝也。痛甚故痛及心也。痛者殆虛。不可攻擊。以建中湯養中焦。加附子以和疝。繼與蒼朮湯和心下。不過十貼全已。

一婦人病。衆醫爲鼓脹。治之無效。予診其脈曰。疝之濕症也。先與三白湯。

下如豆汁者數升。脹頗瘡。繼與桂枝加附子湯全愈。所以知其病者。鼓脹則無消長。今病緩則消焉。盛則脹焉。時腹鳴響。是所以爲疝也。

松山生者。患淋疾十餘年焉。一日大發。莖中疼痛。小便膿血。小腹有塊。牽引脇下。予診之曰。盤腸氣也。便血雖似血淋。有塊痛者。難爲血淋。設使爲血淋。亦當利腸氣。卽作四味茴香散與之。卒痛止。血淋全愈。

一男子。腹中遶臍有塊。爲鳴動。一日卒得腰腳痿弱不能動。予診其脈曰。寒疝也。此病寒邪。客肝腎二藏令然。其經亦爲寒邪所關。故爲此症耳。非烏頭以治疝。附子以行經。不可治。卽與烏頭煎一劑。瞑眩甚矣。病夫曰。藥增苦楚。不堪服。予曰。是將愈之候也。藥不瞑眩。其病不瘳是也。曲喻之強服之。病略愈。再與梔附湯加味豁然。

一婦人有病。接予診其脈。疝瘕也。與大黃附子細辛湯。下其寒。再與桂枝加附子湯。病已。予未往診。時以五心煩熱。心氣不樂。羸瘦倦怠。衆醫爲虛勞。予獨以爲疝瘕。何者。心下顯然有塊。按之有冷氣。而爲鳴動也。勞症之邪。在脾者。或雖似之。然勞之瘕塊。何有鳴動冷氣乎。疝亦從七情起。則心熱不樂。亦疝之候也。此人果勞。則治勞之劑。何不效乎。吾以爲疝。不亦宜乎。

一老翁小腹痛。腹鳴。血痢日數十行。自以爲痢尤甚者也。予診之曰。疝也。夫疝病屬肝。肝藏血。正邪相搏。傷其血。故下血也。邪傷血而利。則可與血利同治。雖然是病元自疝來。不治其本。不可也。卽與補腎湯病瘳。

一婦人患心痛五年。諸藥針灸無有效。予診脈曰。心下痞硬。正是積也。然非五積部位。雖殆如盤疝。然其位高。則難爲盤疝。極知疝客心脾。邪正相爭奔騰。故上衝心下而痛也。先與桂枝加附子湯和其疝。疝和而後以手法拈散餘邪。心脾痛全已。

一男子常苦疝癥。一日大發。腹硬滿疼痛。予診之。其脈沉緊而伏。旁人皆以爲死症。予曰。積聚癥瘕之病。不可卒死。何足恐哉。卽與神保丸十五丸。藥下咽病卒已。

寒疝主方

桂枝加附子湯。治寒疝心腹疼痛。手足逆冷。身體拘急方。

桂枝 芍藥 附子各六分 甘草 大棗 生姜各三分 水煎服。

補腎湯方家 治寒疝肚腹疼痛。泄瀉胸滿痞塞。或虛火上攻。舌胎不食方。

附子 人參 白朮 茯苓 黃芪 木瓜各五分 羌活 乾姜 沉

香各三分 紫蘇 川芎 甘草各二分 右水煎服

苓朮羌附湯

方家

治寒疝小腹疼痛泄瀉不止甚則交血利者方。

茯苓 白朮

羌活 附子 甘草 大棗 右水煎服

甘草乾姜湯

方家

治諸疝泄利者方。

甘草 乾姜

各五分

蜀椒

附子

各三分

右水煎

茯苓湯

方家

治諸疝嘔吐不止飲食不納方。

茯苓 陳皮

附子

白朮

各二分

半夏

吳茱萸

各一分

水煎臨服入姜汁

一匙溫服

生姜半夏湯

方家

治同前方

生姜 半夏

吳茱萸

附子

各三分

右水煎

姜椒湯

外臺方

治胸中積疝嘔吐飲食不納方。

半夏 茯苓

各三分

桔梗

陳皮

各二分

桂枝

附子

蜀椒

甘草

各一分

右

水煎臨服入姜汁一匙溫服

烏椒湯 治心胃時痛時止經年月不止

烏頭 蜀椒

各六分

乾薑

桂枝

各四分

大棗

一枚

右水煎服

半夏乾姜湯 治心胃痛不可忍方。

乾姜 桂枝

半夏

蒼朮

生姜

各等分

右水煎服